

บทที่ 9

การสืบพันธุ์

(Reproduction)

การสืบพันธุ์ หมายถึง การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ให้มากขึ้น โดยหน่วยที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีรูป่างลักษณะและการดำเนินชีวิตเหมือนกับบรรพบุรุษ

โดยทั่ว ๆ ไป การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมักมี 2 แบบ ใหญ่ ๆ คือการสืบพันธุ์ชนิดไม่ออาศัยเพศ (ASEXUAL reproduction) และการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศ (SEXUAL reproduction) การสืบพันธุ์ชนิดไม่ออาศัยเพศนั้นเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเพียงหน่วยเดียวทำการทวีจำนวนโดยวิธี fission, budding, sporulation หรือ fragmentation วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วหน่วยใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับหน่วยเดิมทุกประการ ส่วนการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศนั้น เกิดจากการที่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศผู้ (sperm) มาผสมหรือปฏิสนธิ (fertilization) กับเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศเมีย (egg) ได้เป็นไซโ哥ต (zygote) ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่มีครบทั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน (monoecious) ในการสืบพันธุ์ชนิดอาศัยเพศนี้หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นจะรวมเอาลักษณะของพ่อและแม่มาไว้ด้วยกัน

9.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis)

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) เป็นการทวีจำนวนเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การแบ่งเซลล์แบบนี้พบในสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ (multicellular organism)

ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นี้ได้มีการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1841 โดยนักชีวิทยาชื่อ โรเบิร์ต รีมัค (Robert Remak) ได้เสนอความคิดเห็นว่าเซลล์ทั้งหลายเกิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่เดิม ในปี ค.ศ. 1844 นักชีวิทยาชื่อ คาร์ล เนเกล (Karl Nageli) ได้ทำการทดลองสนับสนุนต่อมาอีกประมาณ ปี ค.ศ. 1865 ออสการ์ เฮิร์ทวิก (Oskar Hertwig) ได้ค้นพบกลุ่มเส้นใยภายในนิวเคลียสชื่อ วิลไฮล์ม พอน วาลเดเยอร์ (Wilhelm von Waldeyer) ตั้งชื่อว่าโครโนโซม (chromosome) ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1888 ต่อมาในปี ค.ศ. 1910 มอร์แกน (T.H. Morgan) และผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครโนโซม และต่อมาพบว่าโครโนโซมประกอบขึ้นด้วยหน่วยเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่าเจนส์ (Genes) ซึ่งในปัจจุบันพบว่าคือสาร DNA

ในปี ค.ศ. 1953 เจมส์ วัตสัน (James Watson) กับ คริก (F.H.C. Crick) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA และในที่สุดสามารถสร้างหุ่นจำลองโครงสร้างของ DNA สำเร็จดัง


ที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทดัน ๆ

ขบวนการแบ่งเซลล์นั้นประกอบด้วยขบวนการย่อย ๆ ส่องระยะคือ ระยะแรก โครโนโซมภายในนิวเคลียสจะทวีจำนวนขึ้นเป็นสองเท่า (duplication) ระยะนี้เรียกว่าระยะไมโทซิส (mitosis) ส่วนระยะที่สองซึ่งเรียกว่าระยะไซโตไกโนซิส (cytokinesis) นั้น เป็นระยะที่ไซโตพลาสม์จะแบ่งตัวออกเป็นสองส่วน แต่ละส่วนจะมีจำนวนโครโนโซมเท่ากัน เมื่อขบวนการหั้งสองระยะนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะได้เซลล์ใหม่เป็นสองเซลล์

ลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะมีรายละเอียดโดยสังเขปต่อไปนี้
ระยะไมโทซิส (mitosis)

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะไมโทซิสจะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากนักแต่ก็อาจแยกออกเป็นขั้นต่าง ๆ ตามความแตกต่างได้เป็นสี่ขั้น คือ โปรเฟส (prophase) เมตาเฟส (metaphase) อนาเฟส (anaphase) และทีโลเฟส (telophase) แต่ก่อนที่นิวเคลียสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นทั้งสี่ขั้นนี้ จะอยู่ในระยะที่เรียกว่าอินเตอร์เฟส (interphase) หรือระยะเมตาโบลิก (metabolic stage) หรือที่นักศึกษาเคยเรียนมาในชั้นต้น ๆ ว่าระยะพัก (resting stage) นั้นเอง ขั้น Interphase

ลักษณะของเซลล์ในระยะนี้ จะพบว่าในนิวเคลียสอยู่ในบริเวณกลางเซลล์ล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane) ซึ่งเป็นผนังสองชั้น ภายในบรรจุด้วยสารเหลวที่ใสแต่หนืดข้น ซึ่งเรียกวานิวคลีโอพลาสม์ (nucleoplasm) หรือนิวเคลียร์แซป (nuclear sap) และมีท่อนโครโนโซม ลอยอยู่ทั่วไปในจำนวนที่เป็นลักษณะเฉพาะชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ โครโนโซมแต่ละท่อนภายในจะมีเส้นใยยาวชุดอยู่สองเส้น แต่ละเส้นเรียกว่าโครโนเมมา (chromonema) ดังแสดงในภาพ 9-1



ภาพ 9-1 โครโนโซม

โครโนโซมแต่ละห่อในนิวเคลียส จะมีคู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอีกห่อนหนึ่ง โครโนโซมที่มาเป็นคู่กันได้นี้ แต่ละห่อนเรียกว่า ไซโนไซด์ โครโนโซม (*homologous chromosome*) เป็นโครโนโซมที่นำลักษณะของพ่อ (paternal chromosome) ห่อนหนึ่งและนำลักษณะของแม่ (maternal chromosome) อีกห่อนหนึ่ง เชลล์ที่มีจำนวนโครโนโซมครบถ้วน เรียกจำนวน โครโนโซมในเชลล์นั้นว่า จำนวนดิพโลอยด์ (diploid number - 2N) ถ้าจำนวนโครโนโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม เรียกว่า โครโนโซมชุดนั้นมีจำนวนแฮปโลอยด์ (haploid number - N) ซึ่งจะพบได้ในเชลล์สืบพันธุ์ทั่ว ๆ ไป

ขั้น Prophase

ในขั้นนี้ โครโนโซมแต่ละห่อนจะ duplicate ตัวเองเป็นสองห่อน แต่ละห่อนเรียกว่า โครมาติด (chromatid) ซึ่งจะยึดติดกันอยู่ที่บริเวณหนึ่งที่เรียกว่า เชนไตรเมียร์ (centromere) หรือ ไคเนต็อกอร์ (Kinetochore) ต่อจากนั้น โครโนโซมจะหดตัวสั้นเข้าหากันให้เห็นเด่นชัดขึ้น ในขณะเดียวกัน เชนทริโอล (centriole) จะ duplicate ตัวเองออกเป็นสองอันแล้วเคลื่อนตัวแยกออกจากกันไปอยู่ฟากเชลล์ตรงกันข้าม พร้อมกันนั้น ไซโตพลาสม์ที่อยู่ล้อมรอบเชนทริโอลจะขันขึ้น เราเรียก องค์ประกอบนี้ว่า เชนไตรโซม (centrosome) รอบ ๆ เชนไตรโซมนี้จะมีแนวของไซโตพลาสม์ กระจายออกโดยรอบ แนวที่อยู่ด้านล่างระหว่างเชนไตรโซมกับแนวกลางเชลล์เรียกว่า สปินเดิล-ไฟเบอร์ (spindle fiber) ส่วนแนวอื่น ๆ เรียกว่า แอสตรัล รีด (astral ray)

เมื่อถึงระยะนี้ เยื่อหุ้มนิวเคลียส นิวคลีโอเลสและนิวคลีโอพลาสม์จะสลายตัวไปดังนี้ภายในเชลล์จึงปราศจากให้เห็นเพียง โครโนโซมและไซโตพลาสม์เท่านั้น โดยที่ โครโนโซมเริ่มเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณตอนกลางเชลล์ (equatorial plane)

ขั้น Metaphase

เป็นระยะที่ โครโนโซมเคลื่อนเข้ามาอยู่บริเวณกลางเชลล์แล้ว พร้อมกันนั้น โครมาติดของ โครโนโซมแต่ละห่อนจะแยกออกจากกันและเตรียมเคลื่อนห่างไปสู่ฟากเชลล์ของตนเองต่อไป

ขั้น Anaphase

ในระยะนี้ โครมาติดซึ่งแยกออกจากกันแล้ว เรียกว่า *daughter chromosome* จะเคลื่อนห่างออกจากกันเข้าไปสู่เชนไตรโซม โดยบริเวณที่เป็นเชนไตรเมียร์จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้รูปร่างของ โครโนโซมในระยะนี้จึงมีรูปคล้ายตัว V หรือ J การเคลื่อนที่ของ โครโนโซมนี้เกิดจากการหดตัวของเส้นสปินเดิล ไฟเบอร์ซึ่งจะนำเอา โครโนโซมเข้ามาร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน

ขั้น Telophase


เมื่อโครโนซมเข้ามาร่วมกันที่บริเวณเซนโตรโซมแล้วจะยึดขยายออกและเชื่อมประสานกันพร้อมกันนั้น สปินเดล ไฟเบอร์ แอสตรัล เรย์ และเซนโตรโซมจะถอยตัวไปด้วย และจะเกิดมิวนิคลิโอลัส นิวเคลียโพลาสม์ กับเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นล้อมรอบกลุ่มของโครโนซมนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขณะนี้จะมีนิวเคลียสปรากฏอยู่ในเซลล์นั้น 2 อัน

ระยะไซโตไคโนซิส (Cytokinesis)

ระยะไซโตไคโนซิสเป็นระยะที่ไซโตพลาสม์แบ่งแยกออกจากกันเป็นสองส่วน การแบ่งนี้เกิดขึ้นในตอนปลายของขั้นอนาเพส โดยถ้าเป็นเซลล์สัตว์ บริเวณกลางเซลล์จะคัดเข้ามากกัน (furrowing) เรื่อย ๆ จนในที่สุดจะขาดออกจากกันเมื่อถึงปลายขั้นที่โลเพส ได้เป็นสองเซลล์อิสระแต่ถ้าเป็นเซลล์พืช การแบ่งจะเกิดขึ้นโดยที่จะมีสารประภากเซลล์ถูโอลส (cellulose) มาสะสมกันอยู่ในบริเวณตอนกลางเซลล์ แนวสะสมนี้เรียกว่าเซลล์เพลท (cell plate) จากนั้นแนวเซลล์เพลทนี้จะขยายตัวออกเรื่อย ๆ จนไปจรดผนังเซลล์เดิม และเรียกชื่อใหม่ผิดเดิม ลามมาคลา (middle lamella) ทำให้เกิดเซลล์ใหม่สองเซลล์โดยสมบูรณ์

ในเซลล์บางประเภท เช่นเซลล์ของกล้ามเนื้อ หรือเซลล์ของพืชชั้นต่ำพวกเชื้อร้า เมื่อ尼วเคลียสแบ่งออกจากกันแล้ว ไม่มีการแบ่งไซโตพลาสม์ตามมา จึงทำให้เห็นว่าภายในเซลล์นั้นมีนิวเคลียสอยู่ร่วมกันหลายนิวเคลียสเซลล์ในลักษณะเช่นนี้ถ้าเป็นเซลล์สัตว์เรียกว่า ชันไชเกียน (syncytium) ถ้าเป็นเซลล์พืชเรียกว่าชีโนไซท์ (coenocyte)

แผนภาพแสดงการแบ่งเซลล์ในระยะและขั้นต่างแสดงได้ดังนี้



ภาพ 9-2 แสดงระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโครชีส


9.2 การแบ่งเซลล์แบบไม่โอดิส (Meiosis)

การแบ่งเซลล์แบบไม่โอดิส (meiosis) เป็นการแบ่งของเซลล์เพื่อให้เซลล์นั้นไปทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ (gamete) ในสิ่งมีชีวิตขั้นสูงนี้แ-gen มีทหรือเซลล์สืบพันธุ์มักมีลักษณะและขนาดแตกต่างกัน เรียกว่า เอเทอโรแ-gen มีท (heterogamete) เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียซึ่งเรียกว่าไข่ หรือโอวัม (egg หรือ ovum) มักจะมีขนาดใหญ่ไม่เคลื่อนที่และมักมีอาหารสะสมอยู่ภายใน อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนี้คือ รังไข่ (ovary) เซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เรียกว่า สเปอร์ม (sperm) มักมีขนาดเล็ก และเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วของไว อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เพศชนิดนี้คือ อณฑะ (testis) ซึ่งมีชีวิตบางชนิดมีความสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เพียงชนิดเดียว (dioecious) แต่บางชนิดสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ทั้งสองชนิด (monoecious หรือ hermaphrodite) เซลล์สืบพันธุ์แต่ละชนิดนั้น จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ในเซลล์ทั่วไป (haploid number) ซึ่งนั้นเป็นลักษณะสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไม่โอดิส ขบวนการไม่โอดิสที่เกิดขึ้นในรังไข่ เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศเมียนั้นเรียกว่า ไอโอดิเจนชิส (oogenesis) ส่วนขบวนการไม่โอดิสที่เกิดขึ้นในอณฑะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั้น เรียกว่า สเปอโรโนมาโทเจนชิส (spermatogenesis)


ขบวนการไม่โอดิสประกอบด้วยระยะของความเปลี่ยนแปลง 2 ระยะคือ first meiotic division และ second meiotic division ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบนี้จะทำให้ได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้น 4 เซลล์ จากเซลล์เดิม 1 เซลล์ และแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเป็น haploid ในการแบ่งเซลล์แต่ละระยะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นโปรเฟส เมตาเฟส อนาเฟส และทีโลเฟส เมื่ອอกันกับใน การแบ่งเซลล์แบบไม่โอดิส

ในระยะ first meiotic division นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากการแบ่งไม่โอดิส คือ หลังจากที่โครโนมโอม แต่ละท่อน duplicate ตัวเองแล้วท่อนที่เป็นคู่ของกัน (homologous chromosome) จะมาเข้าคู่ขานกัน และโกรมาติดบางส่วนจะไขว้กัน (cross over) และแยกส่วนของโกรมาติดจากโครโนมที่มาเข้าคู่กันนั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า synapsis จากนั้นโครโนมต่างจะหดสั้นและหนาขึ้น ดังนั้น homologous chromosome แต่ละคู่จะเห็นเป็นสีโกรมาติดด้วยกัน เรียกว่า tetrad ความเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นในขั้นโปรเฟสของ first meiotic division ในขั้นต่อมา ก็มีการเปลี่ยนแปลงคล้าย ๆ กับของไม่โอดิส เว้นแต่เพียงว่า ท่อนโครโนมที่มาเข้าคู่กันนั้นจะแยกออกจากกันไปสู่ฝ่ายเซลล์ตรงกันข้ามแล้วเกิดการแบ่งเซลล์

FIRST MEIOTIC DIVISION



SECOND MEIOTIC DIVISION




ภาพที่ 9-3 แสดงระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโครซิส

เซลล์ที่ได้ในขณะนี้จะมีโครโนมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม แต่ว่าโครโนมแต่ละห้องจะประกอบด้วย 2 โครมาติด

ในระยะ second meiotic division ขั้นโปร์เฟส โครโนมจะไม่ duplicate ตัวเองอีก จะผ่านเข้าสู่ขั้นเมตาเฟสและอนาคตเพื่อย่างรวดเร็ว ในขั้นอนาคตี้ โครมาติดของโครโนมแต่ละห้องจะแยกออกจากกันไปอยู่ฝากรเซลล์ตรงกันข้าม และเข้าไปอยู่ร่วมกันเป็นโครโนมชุดใหม่และปรับสภาพเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสต่อไปในระยะที่โลเฟส

เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวผู้ (spermatozoa) นั้นสร้างมาจากเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ซึ่งบุญญุ่ตามผนังของท่อผลิตเซลล์เพศ ส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียสร้างมาจากเนื้อเยื่อฟอลลิเคิล (follicle) ของรังไข่ เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในระยะ first meiotic division ซึ่งได้สองเซลล์นั้น เซลล์หนึ่งจะมีขนาดใหญ่ และอีกเซลล์หนึ่งมีขนาดเล็ก เซลล์ขนาดใหญ่เรียกว่า primary oocyte ส่วนเซลล์เล็กเรียกว่า first polar body เมื่อเซลล์หักสองแบ่งตัวอีกครั้งหนึ่งจะได้เซลล์ขนาดใหญ่ 1 เซลล์เรียกว่า secondary oocyte หรือ ovum ส่วนอีก 3 เซลล์จะมีขนาดเล็กเรียกว่า second polar body ในเวลาต่อมา polar body เหล่านี้จะสลายตัวไป เหลือแต่เพียง ovum เท่านั้น


โครโนมที่ปรากฏอยู่ในเซลล์ของสัมภีวิตทั่ว ๆ ไปนั้น จะมีอยู่คู่หนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมลักษณะเพศ โครโนมคุณเรียกว่า โครโนมไซน์เพส (sex chromosome) โครโนมที่กำหนดเพศชายจะมีลักษณะแตกต่างจากโครโนมที่กำหนดเพศหญิงบ้างเล็กน้อยโดยที่โครโนมเพสชาย (ซึ่งนิยมสมมติเรียกว่า Y chromosome) จะสั้นกว่าโครโนมเพสหญิง (ซึ่งนิยมสมมติเรียกว่า X chromosome) อยู่เล็กน้อย ในเพศหญิงโครโนมจะปรากฏเป็น XX ส่วนในเพศชาย โครโนมเพสจะปรากฏเป็น XY โครโนมคุณอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่โครโนมเพส แต่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป รวมเรียกว่าอโตโซม (autosome) ดังนั้นถ้าเรายกตัวอย่างมนุษย์ ซึ่งปกติมีจำนวนโครโนม 46 ห้อง หรือ 23 คู่จะเป็นอโตโซมเสีย 44 ห้องหรือ 22 คู่ เป็นโครโนมเพส 2 ห้อง หรือ 1 คู่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่แน่นอนว่า นอกจากอโตโซม 22 ห้องแล้ว ไปจะต้องมี X chromosome ส่วนสเปอร์มจะมี X chromosome หรือ Y chromosome ก็ได้ และเมื่อไข่กับสเปอร์มผสมกัน (fertilize) และ จะได้ลูกเป็นเพศหญิง หรือเพศชายแล้วแต่โอกาสการเข้าผสมของสเปอร์มชนิดนั้น ๆ ดังภาพ



ภาพ 9-4 แสดงโอกาสการผสานกันของเชื้อเพลิง

ในพืชและสัตว์บางชนิด เมว่าจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แต่ในบางกรณี เซลล์สืบพันธุ์ เพศเมียสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องได้รับการผสมจากเซลล์เพศ ตัวผู้ ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า *parthenogenesis* นับได้ว่าเป็นการผสมพันธุ์แบบไม่ออาศัยเพศอีก แบบหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้มีหลายอย่าง ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ตัวอย่างที่พบเห็นเป็นประจำได้แก่ มด ผึ้ง ปลวก อุฐุน กล้วย เป็นต้น

สิ่งมีชีวิตจำพวกพืช เม้าจะมีอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่ในการดำรงชีวิตก็ยังอาจแบ่งช่วงชีวิต ออกได้เป็นสองช่วง คือช่วงที่ทำหน้าที่สร้างสปอร์ ซึ่งเรียกว่าช่วงสปอรอโฟร์ (sporophyte) เป็นช่วงที่เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น diploid number ($2N$) กับ ช่วงกามีโตไฟต์ (gametophyte) เป็นช่วงที่เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น haploid number (N) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์เพศ ช่วงชีวิตทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นสลับกันไป เรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า การสืบพันธุ์แบบสลับ (*alternation of generation*) ถ้าเกิดในสัตว์เรียกว่า metamogenesis สำหรับในพืชนั้นยังเป็นพืชที่มีความเจริญมากขึ้นเท่าได้ก็จะมีช่วงสปอรอโฟร์ ยาวกว่าช่วงกามีโตไฟต์มากขึ้น




ภาพ 9-5 แสดงการสืบพันธุ์แบบสลับ

9.3 การสืบพันธุ์ในมนุษย์ (Reproduction in Man)

การสืบพันธุ์ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั้น เป็นการรวมกันของเซลล์เพศหญิง หรือไข่ กับเซลล์เพศชาย หรือสเปอร์ม ทำให้ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมา

9.3.1 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (The Male Reproductive System)

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วยอัณฑะ (testes) คู่ซึ่งเดิมเจริญอยู่ภายในช่องท้อง แล้วเคลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะ (scrotal sac) ที่ด้านหน้าต่อนล่างภายนอกช่องท้อง ภายในต่อม อัณฑะแต่ละข้างจะมีท่อ เชมินิเฟอรัส ทิวบูล (seminiferous tubules) ขนาดรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น ระหว่างกลุ่มของท่อคันเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายชนิดเทสโถสเตโรน (testosterone) กับกลุ่มเซลล์ซึ่งทำหน้าที่สร้างเซลล์เพศชาย ปลายด้านหนึ่งของท่อเชมินิเฟอรัสเป็นหลอดขนาดเล็ก เรียกว่า วัส เอฟเฟอร์เอนส์ (vas efferens) ซึ่งจะเข้าไปรวมกันอยู่ในท่อที่เรียกว่า เอพิดิไดมิส (epididymis) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักชั่วคราวของเซลล์เพศชาย ถัดจากเอพิดิไดมิสไปเป็นท่อนำ เซ็มเพค (sperm duct หรือ vas deferens) ซึ่งจะผ่าน เข้าช่องท้องไปบรรจบกับท่อปัสสาวะ




ภาพ 9-6 ระบบสืบพันธุ์เพศชายของมนุษย์

เซลล์เพศชาย (spermatozoa หรือ sperm) ซึ่งเกิดจากการแบ่งแบบไม้โคนิสจะว่ายอยู่ใน ของเหลวซึ่งเป็นน้ำเลี้ยง ของเหลวนี้เรียกว่าซีเมน (semen) สร้างโดยต่อมในระบบสืบพันธุ์ 3 คู่ คือเชมินัล เวสติเคิล (seminal vesicle) ต่อมโปรดสเตท (prostate) และต่อมความเปอร์ (Cowper's

gland) น้ำเลี้ยงเชื้อเพลนี่จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อเพลนได้รับอันตรายจากฤทธิ์ความเป็นกรด ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสะสมอาหารประเทาน้ำตาลกรูโคสและน้ำตาลฟรุคโตสให้แก่เชื้อเพลน ทั้งยังเป็นตัวนำที่จะให้เชื้อเพลนชายว่ายเข้าไปผสมกับเชื้อเพลนหญิงได้สะดวกยิ่งขึ้น


เชื้อเพลนออกจากร่างกายโดยทางท่อปัสสาวะ (Urethra) ซึ่งผ่านอยู่ในองคชาต (penis) การหลั่งเซลล์เพลนเกิดขึ้นเมื่อจิตใจได้รับการกระตุ้นทางอารมณ์เพลนถึงจุดสูงสุดทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติบังคับให้ห่องน้ำเชื้อเพลน ท่อปัสสาวะ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องหดตัวไปผลัดเชื้อเพลนออก เรียกว่ากระบวนการนี้ว่า ejaculation

ภาพ 9-7 ภาพแสดงภาคตัดขวางของ



(a) อัณฑะ


ภาพ 9-7 ภาพแสดงภาคตัดขวางของ



(b) เซื้อเพศ

9.3.2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (The Female Reproductive System)

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วยรังไข่ (Ovary) อัญมณี 2 ข้างในช่องท้อง ทำหน้าที่ผลิตไข่ และขอร์โมนเพศหญิง pragtid เลี้วรังไข่จะสร้างไข่ขึ้นมาเดือนละ 1 ใบโดยแต่ละข้างทำหน้าที่สลับกัน ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการตกไข่ (ovulation) ไข่จะหลุดออกจากรังไข่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อนำไข่ (oviduct หรือ Fallopian tube) เข้าไปสู่มดลูก (uterus) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายผล蔗พุ่คิ่ว ประกอบด้วยรับการผสมกับเชื้อเพศชาย เมดลูกนี้จะอยู่บริเวณทึ่งกลางด้านล่างของช่องท้อง ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ใหญ่ประกอบด้วยผนังกล้ามเนื้อเรียบ ภายในมีเยื่ออ่อนบุ้ย มีเส้นเลือดฝอยมากล่อเลี้ยงอยู่มากน้ำ ปากมดลูกจะเป็นช่องแคบ (cervix) ติดต่อกับช่องคลอด (vagina) จากนั้นจะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนนอก ซึ่งรวมเรียกว่ารักษา (vulva) ประกอบไปด้วยกลีบเนื้อชั้นนอก (labia major) และกลีบเนื้อชั้นใน (labia minor) อยู่ติดกันและคลุมช่องคลอดอยู่ ที่จุดพบต้อนบนของกลีบเนื้อหั้งสองชั้นนี้จะมีอวัยวะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันของคชาตในเพศชาย เรียกว่าคลิตอริส (clitoris) ถัดจากนั้นขึ้นไปจะเป็นท่อปัสสาวะ ซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายปัสสาวะโดยเฉพาะ



ภาพ 9-8 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของมนุษย์

วงจรการสืบพันธุ์ในเพศหญิง (The Female Reproductive Cycle)

ในสัตว์ตัวเมียโดยทั่วไป ความสามารถในการสืบพันธุ์ได้แสดงออกโดยการแสดงความต้องการทางเพศ ความต้องการนี้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาต่างๆ พฤติกรรมเช่นนี้ในสัตว์เรียกว่า “เป็นสัด” หรือ “ติดสัด” (estrus) สัตว์บางชนิด เช่น สัตว์ป่า จะมีพฤติกรรมนี้เพียงปีละครั้ง (monestrus) บางชนิดมีปีละหลายครั้ง (polyestrous) สุนัข และแมว มีปีละ 2 ครั้ง แต่หมูมีในทุก 3-4 วัน


พฤติกรรมการเป็นสัดนี้เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่มีอยู่ในช่องคลอดและมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมดลูกจะหลังฮอร์โมนอ่อน化ในปริมาณสูงสุดหลังจากการตกไข่แล้ว เล็กน้อย

ในมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงนั้น ความสามารถที่จะให้กำเนิดลูก แสดงโดยมีเลือดประจำเดือน (menstruation) ซึ่งมักมีมาในทุกรอบ 28 วัน และจะมีอยู่ประมาณ 4-5 วัน เลือดประจำเดือนเกิดจากการหลุดออกของผนังด้านมดลูกทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นขาด ภายหลังจากการมีเลือดประจำเดือนแล้ว เนื้อเยื่อฟอลลิคูลในรังไข่ซึ่งภายในมีเซลล์ไข่อยู่ จะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมน follicle stimulating hormone (FSH) ที่สร้างโดยต่อมใต้สมอง ให้เจริญเติบโต ในขณะที่ฟอลลิคูลเติบโตนั้นจะสร้างฮอร์โมนเอสตราดิโอล (estradiol) ไปกระตุ้นให้ผนังมดลูกเพิ่มความหนาและสะสมเลือดและอาหารไว้เตรียมรับไข่


ไข่ซึ่งหลุดจากฟอลลิคูลโดยการกระตุ้นของฮอร์โมนชื่อ luteinizing hormone (LH) จากต่อมใต้สมอง จะเคลื่อนออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ประมาณวันที่ 14-15 ของรอบประจำเดือน แล้วมารอการผสมที่ท่อนำไข่ ส่วนฟอลลิคูลจะแปรสภาพไปเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองอ่อนเรียกว่า คอร์ปัสลิวเตียม (corpus luteum) และสร้างฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอร์โрон (progesterone) ไปช่วยควบคุมการเตรียมตัวของผนังมดลูกให้รับการตั้งท้องและไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เจริญเติบโต

ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมจากเชื้อเพศชาย เยื่อคอร์ปัสลิวเตียม จะฝ่อลายไปประมาณวันที่ 27 ของรอบประจำเดือน ทำให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรมหดไป ผนังมดลูกจะหลุดออกและทำให้เกิดเลือดประจำเดือน

ถ้าไข่ได้รับการผสม ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ เยื่อคอร์ปัสลิวเตียมจะยังคงอยู่และสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรมต่อไปตลอดระยะเวลาการมีครรภ์ ฮอร์โมนนี้จะช่วยป้องกันการตกไข่ เพื่อมิให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้อน



ภาพ ๙-๙ ลำดับขั้นของการอวัยของไข่ภายในรังไข่



ภาพ 9-10 วงจรรอบประจำเดือนในสตรี

9.3.3 การปฏิสนธิ (Fertilization)


ในการกินเพศหญิงที่มีอายุได้ 4-5 เดือนจะมีเซลล์ไข่อยู่ในรังไข่นับเป็นจำนวนหมื่นเซลล์ แต่เซลล์ที่เจริญเติบโตต่อมาหนึ่งจำนวนประมาณ 400-500 เซลล์เท่านั้น การตกไข่จะเริ่มมีเมื่ออายุปีกว่าเดือน (puberty) และจะไปสิ้นสุดเมื่อวัยหมดประจำเดือน (menopause) ช่วงระยะเวลาหนึ่งจะนานประมาณ 30 ปี

ในการร่วมเพศครั้งหนึ่ง ๆ ฝ่ายชายจะปล่อยเชื้อเพศเข้าสู่ช่องคลอดนับเป็นล้าน ๆ ตัว (จะมีเชื้อเพศชายประมาณ 300,000,000 ตัวในน้ำเชื้อ 3-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร) เชื้อเพศชายหรือสเปอร์มเหล่านี้จะหาทางว่ายเคลื่อนที่เข้าไปสู่มดลูกโดยกำลังตัวเองและกำลังหดตัวและการดูดของมดลูก สเปอร์มนบางตัวที่มีกำลังมากจะว่ายไปจนเข้าสู่ท่อนำไข่แต่ปกติแล้วการผสมมักเกิดในบริเวณปีกมดลูก สเปอร์มจะมีอายุอยู่ในช่องคลอดหรือมดลูกได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไข่ที่รอรับการผสมจะมีเยื่อบาง ๆ หุ้มตัวอยู่โดยรอบเยื่อบาง ๆ นี้เรียกว่าโคโรนาเรดิอาตา (corona radiata) จะมีสารอินทรีย์ประเทกกรด ชื่อกรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) ประกอบอยู่ สารนี้จะถูกทำลายโดยอินไซม์ ไฮยาลูโรนิดase (hyaluronidase) ซึ่งมีอยู่ในสเปอร์มเพียงเล็กน้อย เมื่อสเปอร์มจำนวนมากไปรุ่มล้อมไข่อยู่จะทำให้เยื่อบางนั้นบางมากขึ้นอีกจนเกิดช่องทางให้สเปอร์มที่แข็งแรงที่สุดด้วยว่าจะหลงเข้าไปผสมกับไข่ได้ เมื่อผสมแล้วจะเกิดเยื่อบางเรียก fertilization membrane มาหุ้มไข่ที่ถูกผสมแล้วนั้น เพื่อบังกันไม่ให้สเปอร์มตัวอื่นเข้ามาผสมซ้อนอีก สเปอร์มตัวอื่นที่เข้าผสมไม่ได้จะตายในเวลาต่อมาและถูกทำลายหรือกินโดยเม็ดโลหิตขาว ส่วนไข่ที่ถูกผสมแล้วจะกลายเป็นไข่โภค และเจริญเติบโตต่อไป

การเกิดแฝด (Twining)

มีสัตว์เลี้ยงถูกด้วยน้ำนมบางชนิดสามารถมีถูกได้ครั้งละหลายตัว แต่บางชนิดก็มีได้ครั้งละตัวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่สัตว์ประเทกนี้มีถูกได้ครั้งละเกินหนึ่งตัวซึ่งเรียกว่า ฝาแฝด (twining) สำหรับในมนุษย์นั้นพบว่าประมาณ 75 เปอร์เซนต์ของฝาแฝด เป็นแบบที่เรียกว่า fraternal twins ซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ลักษณะหน้าตาและอุปนิสัยอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้ ฝาแฝดอีกชนิดหนึ่งเกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมใบเดียว แต่มีการแบ่งตัวในระยะแรกออกจากกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่ละส่วนก็เจริญเติบโตต่อไป ฝาแฝดแบบนี้เรียกว่า identical twins จะต้องมีเพศ รูปร่างลักษณะและนิสัยคล้ายคลึงกันมาก ในบางครั้งการแยกตัวของฝาแฝดแบบนี้เกิดไม่สมบูรณ์ ทำให้ร่างกายติดกันตลอดเรียกฝาแฝดแบบนี้ว่าฝาแฝดไทย (Siamese twins) ตัวอย่างเช่น ฝาแฝด อิน-จัน หรือฝาแฝด นาก-ปริศนา



ภาพ 9-11 แสดงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

9.3.4 พัฒนาการของทารกในครรภ์ (Fetal Development)

หลังจากการปฏิสนธิได้ไซโ哥ตแล้วไซโ哥ตนี้จะเจริญเป็นตัวอ่อนหรือ คัพกะ (embryo) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 ตัวอ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เริ่มเกิด สมองและไขสันหลัง เมื่ออายุได้ 1 เดือนจะมีขนาดยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 5 เริ่ม เกิดระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และอวัยวะรยางค์ (appendage) เช่น แขน ขา ในสัปดาห์ที่ 8 เริ่มแยกเพศได้ชัดเจนขึ้น ขณะนี้ตัวอ่อนมีขนาดประมาณ 25 มิลลิเมตร และเกิด ตา หู จมูก ในปลายเดือนที่ 3 การจะมีขนาดประมาณ 75 มิลลิเมตร เดือนที่ 5 มีขนาด ยาว 250 มิลลิเมตร ระยะนี้จะมีรูปร่างเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว ในเดือนที่ 9 จะมีขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร และเริ่มมีไขมันสะสมใต้ผิวนังพร้อมกันนั้นเริ่มรับแรงด้านหน้าซึ่งถ่ายทอดไป จากแม่

การจะอยู่ในครรภ์มารดาประมาณ 280 วัน ในระยะที่การจะคลอด ผนังมดลูกซึ่งเป็น เนื้อเยื่อเรียบจะเริ่มหดตัว ถุงน้ำคร่า ซึ่งหุ้มล้อมรอบทารกเพื่อกันการกระแทกอุบัติเหตุ การถูกบังคับให้เคลื่อนลงมาที่ช่องคลอด โดยจะคว่ำหน้าลง เมื่อการคลอดออกมาน้ำแล้วสักครู่ รากและเยื่อหุ้มจะถูกบีบตามอุกมา เมื่อถึงระยะนี้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของเด็กจะเริ่มทำงานอย่าง