

บทที่ 8

กลศาสตร์ควอนตัม

(Quantum Mechanics)

การที่ยอมรับว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค ลักษณะอันเป็นสองซึ่งขัดแย้งกัน (dual character) ของแสงนี้น่าจะเป็นเพียงอย่างหนึ่งของบรรดาลักษณะอันเป็นสองซึ่งขัดแย้งกันอีกหลายอย่างในธรรมชาติ ดังนั้นถ้าคิดว่าอิเล็กตรอนซึ่งเดิมที่เดวิดคิดว่าเป็นอนุภาคนั้นประพฤติตัวเป็นคลื่นได้ด้วย และจะต้องคิดว่าหลักความเป็นคู่ (duality principle) นี้ไม่ขัดแย้งกันแต่มันมีลักษณะที่เสริมกันหรือสมมาตรกัน กรณีเช่นนี้ผู้เสนอขึ้นเป็นคนแรกคือ หลุยส์ เดอ บรอย (Louis de Broglie) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส และหลังจากที่เดอ บรอยได้นึกถึงภาพของ “คลื่นสสาร” (matter waves) นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ชื่อ โชร์ดิงเจอร์ (Schrodinger) ก็ได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์ควอนตัมโดยวิธีใหม่ ซึ่งอาศัยความคิด “คลื่นสสาร” และสร้างรากฐานขึ้นจากคณิตศาสตร์คือ ใช้คลื่นบรรยายเรื่องของโปรตอนและอิเล็กตรอนเรียกชื่อใหม่ว่า กลศาสตร์ควอนตัมหรือกลศาสตร์คลื่น (wave mechanics) หรือ ทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) ซึ่งได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ นับจาก โชร์ดิงเจอร์ ไฮเซนเบิร์ก บอร์น เพาลี ดิแรกและท่านอื่น ๆ ความคิดของกลศาสตร์คลาสสิกถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง ความแตกต่างขั้นมูลฐานระหว่างกลศาสตร์คลาสสิกกับกลศาสตร์ควอนตัมก็คือ กลศาสตร์คลาสสิกเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายใต้อิทธิพลของแรงกระทำ และถือว่าปริมาณต่าง ๆ เช่น มวล ตำแหน่ง ความเร็ว ของอนุภาคสามารถวัดค่าได้แน่นอน ส่วนกลศาสตร์ควอนตัมนั้นประกอบด้วยปริมาณต่าง ๆ เช่นกัน แต่ปริมาณที่สังเกตได้จะวัดได้แม่นยำในขณะเดียวกัน 2 ปริมาณไม่ได้ เรื่องนี้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อปรัชญาของวิทยาศาสตร์ที่ว่า ไม่มีเหตุผลที่จะไปห้วงสมบัติของอิเล็กตรอนตัวหนึ่ง ๆ แต่ควรจะสนใจพฤติกรรมของอิเล็กตรอนทั้งกลุ่มหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสนใจสถิติและความน่าจะเป็นหรือโอกาสของอิเล็กตรอนทั้งกลุ่มมากกว่า

8.1) คลื่นเดอ บรอย (de Broglie waves)

ในปี 1924 หลุยส์ เดอ บรอย ได้สังเกตเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติล้วนแต่มีสภาพคู่ เช่นสสารและพลังงานที่ไอน์สไตน์เป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ของสภาพคู่ โดยที่สสารและพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ตามสมการ

$$E = mc^2 \quad \dots (8.1)$$

และจากทฤษฎีควอนตัมของพลังค์แสดงให้เห็นว่า รั้งสีเป็นอนุภาคได้ มีลักษณะเป็นควอนตัม มีพลังงาน

$$E = h\nu \quad \dots (8.2)$$

เดอ บรอย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมการ (8.1) และ (8.2) ได้เป็น

$$mc^2 = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

เพราะฉะนั้น

$$\lambda = \frac{h}{mc} = \frac{h}{p} \quad \dots (8.3)$$

โดยที่ p เป็นโมเมนตัมของโฟตอน


เดอ บรอย ได้เสนอว่าเมื่อธรรมชาติมีสภาพคู่ เช่น แสงเป็นคลื่นและอนุภาคได้ เพราะฉะนั้นสสารทั้งหลายก็น่าจะเป็นทั้งอนุภาคและคลื่นได้. และเรียกคลื่นนี้ว่า "คลื่นสสาร" (matter waves) หรือคลื่นเดอบรอย (de Broglie waves) สมการ (8.3) นำมาใช้กับคลื่นสสารได้เป็น

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p} \quad \dots (8.4)$$

เมื่อ v เป็นความเร็วของอนุภาค p เป็นโมเมนตัมของอนุภาค m เป็นมวลของอนุภาค และ λ เป็นความยาวคลื่นเดอบรอย จะเห็นว่าถ้ามวลมากจะได้ความยาวคลื่นสั้นมากจนไม่สามารถวัดได้จึงไม่มีความหมายในกรณีวัตถุใหญ่ ๆ แต่ถ้ามวลน้อยมากเช่นอิเล็กตรอนจะมีความยาวคลื่นพอที่จะวัดได้

เมื่อเดอบรอยเสนอสมมติฐานของเขาในครั้งแรกไม่ค่อยมีผู้สนใจมากนัก เพราะยังไม่มี การทดลองยืนยัน จนกระทั่งปี 1927 เดวิสสัน (Davisson) กับเจอร์เมอร์ (Germer) ชาวสหรัฐ และทอมป์สัน (Thompson) ชาวอังกฤษ ได้ทดลองคล้าย ๆ กับการทดลองที่แสดงว่ารั้งสีเอ็กซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเขาทดลองพบในเวลาใกล้เคียงกันว่า อิเล็กตรอนแสดงสมบัติของคลื่นได้คือมีการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนโดยอาศัยผลึกโลหะเป็นตัวเลี้ยวเบน ดังนั้นสมมติฐานของเดอบรอยจึงเป็นที่ยอมรับมาจนกระทั่งปัจจุบันและสมการที่ (8.4) จึงเป็นสมการที่ถูกต้อง

พิจารณาอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ นิวเคลียสในวงโคจรหนึ่ง ๆ เส้นรอบวงของวงโคจรจะต้องเท่ากับเลขลงตัวคูณกับความยาวคลื่น เพราะว่าถ้ามันเคลื่อนที่แบบคลื่นจะต้องไม่มีการหักรั้งกันในวงโคจร มิฉะนั้นจะไม่เสถียร ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นคลื่นนิ่งตามรูปที่ 8.1 (เส้นประแสดงการแทรกสอดชนิดหักรั้งเมื่อความยาวคลื่นไม่เป็นจำนวนเต็มพอดีในเส้นรอบวง)



รูปที่ 8.1 แสดงคลื่นนิ่งของอิเล็กตรอน (เส้นทึบ)

นั่นคือ
$$2\pi r = n\lambda \quad \dots\dots(8.5)$$

n จะต้องเป็นเลขลงตัว ถ้าแทนค่า $\lambda = \frac{h}{mv}$ จากสมการ (8.4) ลงในสมการ (8.5) จะได้

$$2\pi r = \frac{nh}{mv}$$

$$mvr = \frac{nh}{2\pi} \quad \dots\dots(8.6)$$

สมการ (8.6) จะไปตรงกับสมการ (7.50) ซึ่งเป็นสมมติฐานของบอร์ จะเห็นได้ว่าสมมติฐานของเดออบรอยเกี่ยวกับคุณสมบัติของอิเล็กตรอนที่เป็นคลื่น นำไปอธิบายทฤษฎีของบอร์ซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์มาเป็นเวลาประมาณ 10 ปีได้ผลดี

8.2) ฟังก์ชันคลื่น (Wave function)

เมื่อแสดงว่าอนุภาคเป็นคลื่นได้ อนุภาคนั้นก็ต้องมีความยาวคลื่นประจำตัว และจะศึกษาด้วยฟังก์ชันคลื่น, ψ (Psi อ่านว่า พีไซ) เป็นคลื่นสสารที่ใช้แทนอนุภาค ค่าของฟังก์ชันคลื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ ณ. จุด x, y, z ในเทศะ (space) จุดหนึ่ง ณ. เวลาหนึ่งจะสัมพันธ์กับโอกาสของการพบวัตถุ ณ. จุดนั้นที่เวลานั้น แต่โดยที่ค่าของฟังก์ชันคลื่นนี้อธิบายให้เห็นภาพพจน์ไม่ได้ เพราะแปลความหมายในเทอมของการทดลองไม่ได้ มัคซ์ บอร์น (Max Born) จึงได้พยายามแปลความหมายในลักษณะของความน่าจะเป็นในปี 1926 พิจารณา

$$\psi = a + ib$$

a และ b เป็นจำนวนจริง i เท่ากับ $\sqrt{-1}$

สังยุคเชิงซ้อน (complex conjugate) ของ ψ เขียนได้เป็น


$$\psi^* = a - ib$$

เพราะฉะนั้น $\psi\psi^* = a^2 + b^2$ เป็นจำนวนจริงเสมอ

ดังนั้น $\psi\psi^* = \psi^2$ (เมื่อ ψ เป็นค่าจริง $\psi = \psi^*$) จะเป็นจำนวนจริงเสมอ อาจเขียนเป็น $|\psi|^2$ คือ กำลังสองของค่าสัมบูรณ์ของฟังก์ชันคลื่น และเรียกว่าความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ซึ่งก็เป็นสัดส่วนกับโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในช่วงที่กำหนดให้ ถ้า $|\psi|^2$ ไม่เป็นศูนย์ แสดงว่ามีโอกาสที่พบอนุภาคนั้นบ้างแม้ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตาม และโอกาสที่จะพบทั้งหมดในเทสะ (space) จะมีค่าจำกัดคือเท่ากับ 1 หมายความว่าอนุภาคนั้นจะต้องอยู่ ณ. ที่ใดที่หนึ่งในเทสะนั้น เมื่อรวมโอกาสที่จะพบ ณ. ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งหมดจะมีค่า = 1


8.3) หลักความไม่แน่นอน (The Uncertainty Principle)

เมื่อคิดว่าอิเล็กตรอนประพฤติตัวเป็นคลื่นได้ ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในตำแหน่งและโมเมนตัม เนื่องจากในวัฏจักรรวมความยาวคลื่นแคบรายน้อยมากจนตัดทิ้งได้ เพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนก็ไม่ต้องคิดถึง แต่กรณีของวัตถุเล็ก ๆ เช่น อิเล็กตรอน ความยาวคลื่นมีค่ามากพอสมควรจะตัดทิ้งไปไม่ได้ต้องคิดความไม่แน่นอนด้วย เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) ได้เสนอหลักความไม่แน่นอนไว้ในปี 1927 ว่า ปกติการวัดทุกอย่างจะมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวเกินกว่าผู้วัดจะควบคุมได้ เช่น การวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของวัตถุจะกระทำพร้อมกันด้วยความแน่นอนย่อมไม่ได้ ผลคูณแห่งความไม่แน่นอนของการวัดค่าทั้งสองนี้จะมีค่าไม่น้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่ง พิจารณารูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 แสดงกลุ่มคลื่นที่มีขนาดกว้างต่าง ๆ กัน

จากรูปที่ 8.2 จะพิจารณาเห็นว่ารูป ก. แสดงกลุ่มคลื่นแคบรอยซึ่งอนุภาคอาจจะอยู่ที่ใด ๆ ก็ได้ ภายในกลุ่มคลื่นนี้ การหาตำแหน่งของอนุภาคหาได้ยาก แต่การวัดความยาวคลื่นค่อนข้างง่าย ในขณะที่รูป ข. กลุ่มคลื่นแคบลงมา แต่ก็ยังหาตำแหน่งอนุภาคได้ยากอยู่แต่ง่ายกว่ารูป ก. สำหรับรูป ค. กลุ่มคลื่นแคบมากมีเพียงคลื่นครึ่งลูก โอกาสจะหาตำแหน่งอนุภาคจะง่ายและแน่นอนว่าอยู่ในช่วงสั้น ๆ ของคลื่นนี้ ง่ายกว่ารูป ก. และ ข. แต่การวัดความยาวคลื่นจะวัดยาก นั่นก็คือ การวัดตำแหน่งของอนุภาคพร้อม ๆ กับโมเมนตัมจะมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ความไม่แน่นอนของตำแหน่งแทนด้วย Δx และความไม่แน่นอนของโมเมนตัมแทนด้วย Δp ความสัมพันธ์ระหว่าง Δx กับ Δp หาได้โดยการพิจารณารูปที่ 8.3



รูปที่ 8.3 กลุ่มคลื่นที่มีการแทรกสอดของขบวนคลื่นที่มีแอมพลิจูดเท่ากัน แต่ความถี่ต่างกัน

จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มจะมีความกว้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น λ_m ของคลื่นที่มากล้ากัน (modulation) และอาจคิดได้ว่าความกว้างนี้จะมีขนาดเดียวกับความไม่แน่นอนในตำแหน่ง Δx ที่วัดตำแหน่งของอนุภาคในกลุ่มคลื่นนั้น เพราะฉะนั้น

$$\Delta x \approx \frac{1}{2} \lambda_m \quad \dots (8.7)$$

λ_m สัมพันธ์กับค่าคงที่ของการแผ่ k_m (propagation constant) คือ $k_m = \frac{2\pi}{\lambda_m}$

เพราะฉะนั้น
$$\lambda_m = \frac{2\pi}{k_m} \quad \dots (8.8)$$

พิจารณากลุ่มคลื่น 2 กลุ่ม ที่มีความถี่เชิงมุม ω และค่าคงที่ของการแผ่ k ที่ต่างกันเล็กน้อย

น้อย

$$\psi_1 = A \cos (\omega t - kx)$$

$$\psi_2 = A \cos [(\omega + \Delta\omega)t - (k + \Delta k)x]$$

คลื่น 2 คลื่นนี้รวมกันได้คลื่นลัพธ์ เป็น

$$\begin{aligned}\Psi &= \Psi_1 + \Psi_2 \\ &= 2 A \cos(\omega t - kx) \cos\left(\frac{\Delta\omega t}{2} - \frac{\Delta k}{2} x\right) \dots\dots(8.9)\end{aligned}$$

พิจารณาสมการ (8.9) จะเห็นได้ว่า ค่าคงที่ของการแผ่ของการกล้าคือ

$$k_m = \frac{1}{2} \Delta k$$

แทนค่า k_m ในสมการ (8.8) จะได้

$$\lambda_m = \frac{4 \pi}{\Delta k}$$

แทนค่า λ_m นี้ในสมการ (8.7) จะได้

$$\dots Ax \approx \frac{2\pi}{\Delta k} \dots\dots(8.10)$$

ความยาวคลื่นเดอบรอยของอนุภาคที่มีโมเมนตัม p คือ $\lambda = \frac{h}{p}$ จะสอดคล้องกับค่า k เมื่อแทนค่า $\lambda = \frac{h}{p}$ ในสมการ (8.8)

$$\frac{h}{p} = \frac{2\pi}{k}$$

เพราะฉะนั้น

$$k = \frac{2\pi p}{h}$$

ความไม่แน่นอนของการวัด Δk จะเป็น

$$\Delta k = \frac{2\pi \Delta p}{h}$$

แทนค่า Δk ที่ได้นี้ในสมการ (8.10) จะได้

$$\Delta x \approx \frac{h}{\Delta p}$$

นั่นคือ

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h \dots\dots(8.11)$$

จากสมการ (8.11) จะเห็นว่าผลคูณของความไม่แน่นอนของตำแหน่งกับโมเมนตัมจะมีค่าไม่น้อยกว่าค่าคงที่ของพลังค์

นอกจากนี้ยังมีหลักความไม่แน่นอนในรูปอื่น ๆ ที่นิยมใช้กัน เมื่อต้องการวัดพลังงาน E ในช่วงเวลา Δt ผลคูณของความไม่แน่นอนจะเป็น

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq h \quad \dots\dots(8.12)$$

สมการ (8.11) กับ (8.12) เป็นสมการทั่ว ๆ ไป ถ้าจะให้ละเอียดจริง ๆ จะต้องไม่พิจารณาเพียงแค่อิเล็กตรอน 2 กลุ่ม แต่จะต้องพิจารณาจำนวนคลื่นมากมายที่มีความถี่และค่าคงที่ของการแผ่ต่างกันไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ของฟูรีเยร์ (Fourier) สมการ (8.10) จะได้เป็น

$$\Delta x \approx \frac{1}{\Delta k}$$

เมื่อ $\Delta k = \frac{2\pi \Delta p}{h}$ แทนค่าเข้าไปจะได้

$$\Delta x \approx \frac{h}{2\pi \Delta p}$$

นั่นคือ $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2\pi}$

หรือ $\Delta x \cdot \Delta p \geq h \quad \dots\dots(8.13)$

และ $\Delta E \cdot \Delta t \geq h \quad \dots\dots(8.14)$

8.4) สมการคลื่นชโรดิงเจอร์ (The Schrodinger wave equation)

ในปี 1926 กลศาสตร์ควอนตัมได้วิวัฒนาการขึ้นมาโดย ไฮเซนเบิร์ก เขาได้ใช้วิธีการคณิตศาสตร์แบบใหม่ คือ แมตริก (matrix) มาแก้ปัญหาต่าง ๆ เรียก กลศาสตร์แมตริก (matrix mechanics) แต่เนื่องจากใช้ภาษาคณิตศาสตร์ที่นักฟิสิกส์ไม่ค่อยคุ้นเคย จึงยากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของทฤษฎี ในขณะที่เดียวกันมีผู้ค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมอีกลักษณะหนึ่งโดยอาศัยกลศาสตร์คลื่น (wave mechanics) คือ ชโรดิงเจอร์ เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะมีลักษณะเหมือนคลื่น เขาจึงใช้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นมาใช้ในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลักษณะคลื่นนิ่ง (standing waves) ทฤษฎีของทั้ง 2 คนให้ผลตรงกันทุกอย่างเพียงแต่วิธีการแตกต่างกันเท่านั้น

๗๖ อนุกรม ๒๖/๒๖

เราจะพิจารณาสมการของชโรดิงเจอร์ โดยมาดูสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นสมการดั้งเดิมก่อนคือ

$$\Psi = A \cdot \exp[2\pi i (\frac{x}{\lambda} - \nu t)] \quad \dots\dots(8.15)$$

เมื่อ Ψ เป็นแอมพลิจูดของคลื่นที่จุด x และเวลา t , λ เป็นความยาวคลื่น, ν เป็นความถี่ และ A เป็นแอมพลิจูดสูงสุด (maximum amplitude) และเนื่องจาก

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x \quad \dots\dots(8.16)$$

เพราะฉะนั้นสมการ (8.15) จะเขียนได้ใหม่เป็น

$$\Psi = A \{ \cos[2\pi(\frac{x}{\lambda} - \nu t)] + i \sin[2\pi(\frac{x}{\lambda} - \nu t)] \} \dots\dots(8.17)$$

จะเห็นว่าสมการ (8.17) Ψ เป็นปริมาณเชิงซ้อน มีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ (real part และ imaginary part) ในกรณีของคลื่นจะใช้เฉพาะส่วนจริงเท่านั้น

กรณีของคลื่นนิ่ง ซึ่งแอมพลิจูดของมันที่จุด x จะไม่เป็นฟังก์ชันกับเวลา พิจารณาสมการ (8.15) แยกเขียนเป็น 2 ส่วนได้คือ

$$\Psi = A e^{2\pi i x / \lambda} \cdot e^{-2\pi i \nu t} \quad \dots\dots(8.18)$$

จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นฟังก์ชันเทศะ (space function) เพราะฉะนั้น

$$\Psi = A e^{2\pi i x / \lambda} \quad \dots\dots(8.19)$$

สมการ (8.19) ดิฟเฟอเรนติเอตสองครั้งสัมพันธ์กับ x จะได้

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} = \frac{-4\pi^2}{\lambda^2} \Psi$$

หรือ

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \Psi = 0 \quad \dots\dots(8.20)$$

จากสมการ (8.20) นี้ โชร์ดิงเจอร์ได้นำสมการคลื่นเดอบรอยจากสมการ (8.4) มาใช้และสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาซึ่งสำคัญและใช้กันมากในฟิสิกส์ยุคใหม่ หรืออาจจะเรียกควอนตัมยุคใหม่ซึ่งเชื่อมโยงทฤษฎีควอนตัม กับ กลศาสตร์คลื่นเข้าด้วยกัน

เนื่องจากพลังงานทั้งหมดของระบบเท่ากับผลบวกของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ นั่นคือ

$$\begin{aligned} E &= T+V &= \frac{1}{2} m v^2 + V \\ & &= \frac{p^2}{2m} + V \quad \dots(8.21) \end{aligned}$$

และ $p^2 = 2m(E-V) \quad \dots(8.22)$

จากสมการ (8.4) คลื่นเดอบรอย $\lambda = \frac{h}{p}$ หรือ $p = \frac{h}{\lambda}$
แทนค่า p ในสมการ (8.22)

$$\begin{aligned} \frac{h^2}{\lambda^2} &= 2m(E-V) \\ \text{และ} \quad \frac{h^2}{\lambda^2} &= \frac{h^2}{2m(E-V)} \quad \dots(8.23) \end{aligned}$$

แทนค่า λ^2 จากสมการ (8.23) ลงในสมการ (8.20) จะได้

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E-V) \Psi = 0 \quad \dots(8.24)$$

สมการ (8.24) เรียกว่า สมการโชร์ดิงเจอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลา (time-independent Schrödinger equation) 1 มิติ ถ้าใน 3 มิติจะเขียนได้เป็น

$$\nabla^2 \Psi_{xyz} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E-V) \Psi_{xyz} = 0 \quad \dots(8.25)$$

เมื่อ ∇^2 เป็นตัวดำเนินการลาปลาเซียน (Laplacian operator) โดยที่

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

เขียนในเทอมโคออร์ดิเนตคาร์ทีเซียน

สมการ (8.25) อาจจัดรูปเสียใหม่เป็น

$$\left[-\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V \right] \psi = E\psi \quad \dots (8.26)$$

หรือเขียนง่าย ๆ เป็น $H\psi = E\psi \quad \dots (8.27)$

เมื่อ $H = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V$

เรียกว่าตัวดำเนินการฮามิลโตเนียน

กรณีสมการ (8.27) นี้ E เรียกว่าค่าไอเกน (eigenvalues) และ ψ เป็นฟังก์ชันไอเกน (eigenfunctions)

สำหรับสมการชโรดิงเจอร์แบบขึ้นกับเวลา (time dependent Schrödinger equation)

อาจหาได้จากสมการ (8.15) โดยแทนค่า $E = \hbar\nu$ และ $\lambda = \frac{h}{p}$ จะได้

$$\psi = A \exp \left[\frac{2\pi i}{h} (px - Et) \right] \quad \dots (8.28)$$

ดิฟเฟอเรนเชียลสมการ (8.28) 2 ครั้งสัมพันธ์กับ x จะได้

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{4\pi^2 p^2}{h^2} \psi$$

จัดรูปใหม่เป็น $p^2 \psi = -\frac{h^2}{4\pi^2} \frac{d^2 \psi}{dx^2} \quad \dots (8.29)$

และดิฟเฟอเรนเชียลสมการ (8.28) 1 ครั้ง สัมพันธ์กับ t จะได้

$$\frac{d\psi}{dt} = -\frac{2\pi i E}{h} \psi$$

จัดรูปใหม่เป็น $E\psi = -\frac{h}{2\pi i} \frac{d\psi}{dt} \quad \dots (8.30)$

จากสมการ (8.21) $E = \frac{p^2}{2m} + V$

คุณสมบัติทั้งสองข้างด้วยฟังก์ชันคลื่น Ψ เพราะฉะนั้นจะได้

$$E\Psi = \frac{p^2}{2m}\Psi + V\Psi \quad \dots\dots (8.31)$$

แทนค่า $p^2 \Psi$ จากสมการ (8.29) และ $E\Psi$ จากสมการ (8.30) ลงในสมการ (8.31)

$$-\frac{\hbar}{2\pi i} \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2\Psi}{dx^2} + V\Psi$$

ถ้า $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ เพราะฉะนั้น

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi}{dx^2} + V\Psi \quad \dots\dots (8.32)$$

สมการ (8.32) คือสมการชโรดิงเจอร์แบบขึ้นกับเวลาใน 1 มิติ ถ้าใน 3 มิติ จะเป็น

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} \right) + V\Psi \quad \dots\dots (8.33)$$

8.5) ตัวดำเนินการ (Operators)

ปัจจุบันกลศาสตร์ควอนตัมได้วิวัฒนาการออกไปมากมายหลายแบบ ลองมาพิจารณาสมการชโรดิงเจอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาใน 1 มิติ

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V \right] \Psi = E\Psi \quad \dots\dots (8.34)$$

เทอมในวงเล็บเรียกว่าตัวดำเนินการฮามิลโตเนียน ซึ่งกรณีนี้บอกให้รู้ว่าเป็นตัวดำเนินการพลังงานกระทำ (operate) บนฟังก์ชันคลื่น แล้วให้ฟังก์ชันคลื่นเดิมกลับคืนมาอีกพร้อมทั้งคูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่ได้ ลองมาพิจารณาว่าตัวดำเนินการคืออะไร

ตัวดำเนินการ คือ ตัวที่บอกให้เรากระทำบางสิ่งแก่ตัวที่ตามหลังมาซึ่งเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ แล้วจะได้ค่าที่ต้องการออกมามีลักษณะสมนัย (correspond) กับฟังก์ชันเดิม เช่น $\sqrt{2}$ ตัว $\sqrt{\quad}$ คือตัวดำเนินการกระทำบนฟังก์ชัน 2 คือให้ถอดรากที่ 2 ของฟังก์ชัน 2 จะได้ค่าที่ต้องการออกมาและสมนัยกับฟังก์ชัน 2

หรือ $\frac{d}{dx} (x^2+5x+1)$ $\frac{d}{dx}$ ก็เป็นตัวดำเนินการบอกให้กระทำการดิฟเฟอเรนติเอตบนฟังก์ชัน (x^2+5x+1) สัมพันธ์กับ x

กรณีผลบวกของตัวดำเนินการ 2 ตัว เช่น \hat{A} กับ \hat{B} จะเขียนได้ดังสมการ

$$(\hat{A}+\hat{B})f(x) = \hat{A}f(x) + \hat{B}f(x) \quad \dots(8.35)$$

ตัวอย่างเช่น ให้ \hat{D} เป็น $\frac{d}{dx}$

$$\begin{aligned} (\hat{D} + 3)(x^2 + 3e^x) &= (2x+3e^x) + (3x^2+9e^x) \\ &= 2x+3x^2+12e^x \end{aligned}$$

กรณีผลคูณของตัวดำเนินการ 2 ตัว เช่น \hat{A} กับ \hat{B} จะเขียนได้ดังสมการ

$$\hat{A}\hat{B}f(x) = \hat{A}[\hat{B}f(x)]$$

จะต้องระวังว่า ต้องกระทำการบน $f(x)$ ด้วยตัวดำเนินการขวามือก่อน คือ \hat{B} แล้วจึงกระทำการด้วยตัวดำเนินการ \hat{A} ตามมา ตัวอย่างเช่น

$$3\hat{D}f(x) = 3[\hat{D}f(x)] = 3f'(x) = 3f'(x)$$

กรณีนี้จะทำให้ได้ผลสุดท้ายออกมาถูกต้อง เนื่องจากเราไม่แน่ใจว่า $\hat{A}\hat{B}$ กับ $\hat{B}\hat{A}$ จะมีผลเหมือนกันหรือเปล่า ตัวอย่างข้างบนอาจจะเหมือนกันแต่พิจารณาตัวอย่างข้างล่างนี้ใหม่

$$\hat{D}\hat{x}f(x) = \frac{d}{dx}[xf(x)] = f(x) + xf'(x) = (1 + \hat{x}\hat{D})f(x) \dots(8.36)$$

$$\text{ถ้าสลับที่เป็น } \hat{x}\hat{D}f(x) = \hat{x}[\frac{d}{dx}f(x)] = xf'(x)$$

จะเห็นว่า $\hat{A}\hat{B}$ กับ $\hat{B}\hat{A}$ ให้ผลแตกต่างกันในกรณีนี้ เพราะฉะนั้นถ้า $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ เราเรียกว่า \hat{A} และ \hat{B} คอมมิว (commute) กัน แต่ถ้า $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ คือ ให้ผลแตกต่างกันอย่างนี้เรียกว่า \hat{A} และ \hat{B} ไม่คอมมิวกัน กรณีคอมมิวกันผลแตกต่างก็จะมีคือเป็นศูนย์ เช่น

$$[\hat{3}, \frac{d}{dx}] = \hat{3}\frac{d}{dx} - \frac{d}{dx}\hat{3} = 0$$

แต่ถ้าไม่คอมมิวกัน จะมีผลแตกต่าง พิจารณาจากสมการ (8.36)

$$\hat{D}\hat{x} = [\frac{d}{dx}, \hat{x}] = \hat{D}\hat{x} - \hat{x}\hat{D} = 1$$

กรณีกำลังสองของตัวดำเนินการ กำหนดให้เป็นผลคูณของตัวดำเนินการนั้น ๆ ด้วยตัวของมันเอง เช่น $\hat{A}^2 = \hat{A}\hat{A}$

สำหรับตัวดำเนินการในกลศาสตร์ควอนตัม มักจะใช้ตัวดำเนินการเชิงเส้น (linear operator) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น

$$\hat{p}[f(x)+g(x)] = \hat{p}f(x) + \hat{p}g(x) \quad \dots\dots(8.37)$$

หรือ $\hat{p}[cf(x)] = c\hat{p}f(x)$ เมื่อ $c =$ ค่าคงที่ $\dots\dots(8.38)$

ตัวอย่างเช่น x^2 , $\frac{d}{dx}$ และ $\frac{d^2}{dx^2}$ เป็นตัวดำเนินการเชิงเส้น แต่ $\sqrt{\quad}$ ไม่ใช่

8.6) ฟังก์ชันไอเกนและค่าไอเกน (Eigenfunction and Eigenvalues)

ถ้ามีการกระทำบนฟังก์ชัน $f(x)$ ด้วยตัวดำเนินการ \hat{A} แล้วได้ฟังก์ชัน $f(x)$ กลับคืนมา คูณกับค่าคงที่ตัวหนึ่งให้เป็น k เรียกฟังก์ชัน $f(x)$ นี้ว่าเป็นฟังก์ชันไอเกน และเรียก k ซึ่งเป็นค่าคงที่นั้นว่า ค่าไอเกน เช่น

$$\hat{A}f(x) = kf(x) \quad \dots\dots(8.39)$$

ตัวอย่างเช่น e^{2x} เป็นฟังก์ชันไอเกน ถ้าทำการดิฟเฟอเรนเชียลด้วยตัวดำเนินการ $\frac{d}{dx}$ จะได้ค่าคงที่ 2 คูณกับ ฟังก์ชันเดิม คือ e^{2x}

$$\frac{d(e^{2x})}{dx} = 2e^{2x}$$

จากสมการ (8.39) จะหาฟังก์ชันไอเกนและค่าไอเกน

$$\frac{df(x)}{dx} = k f(x)$$

จัดรูปใหม่ $\frac{df(x)}{f(x)} = k dx$


อินทิเกรต จะได้ $\ln f(x) = kx + \text{ค่าคงที่}$
 $f(x) = e^{kx + \text{ค่าคงที่}} = e^{kx} \cdot e^{\text{ค่าคงที่}}$
 $= c \cdot e^{kx}$

เพราะฉะนั้น $c \cdot e^{kx}$ คือฟังก์ชันไอเกน k คือค่าไอเกน และจะเห็นได้ว่า $\frac{d}{dx}$ เป็นตัวดำเนินการเชิงเส้นตามคุณสมบัติสมการ (8.38)

$$\frac{d}{dx} [c \cdot e^{kx}] = c \frac{de^{kx}}{dx} = ck \cdot e^{kx} = k(c \cdot e^{kx}) \dots\dots(8.40)$$


8.7) เวกเตอร์ (Vectors)

ในการแก้ปัญหาค่าไอเกนสำหรับโมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) ซึ่งเป็นสมบัติของเวกเตอร์ จำเป็นที่เราต้องทบทวนเรื่องเวกเตอร์บ้างพอสมควร โดยที่ทราบว่าสมบัติทางกายภาพของสเกลลาร์นั้นมีแต่ขนาด เช่น มวล ความยาว พลังงาน แต่ถ้าเป็นเวกเตอร์แล้ว จะมีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว โมเมนตัม เป็นต้น ถ้าจะหาผลบวกของ 2 เวกเตอร์ A และ B จากรูปที่ 8.4 โดยนำหัวเวกเตอร์ B ไปต่อกับหางเวกเตอร์ A แล้วลากเวกเตอร์จากหางเวกเตอร์ B ไปที่หัวเวกเตอร์ A จะได้เวกเตอร์ C เป็นผลบวกของ 2 เวกเตอร์คือ A กับ B



รูปที่ 8.4 ผลบวกของเวกเตอร์

เพื่อจะเขียนเวกเตอร์ในรูปของโคออร์ดิเนตคาร์ทีเซียน พิจารณารูปที่ 8.5



รูปที่ 8.5 แสดงส่วนประกอบย่อย ๆ ของเวกเตอร์ A

ตามรูป 8.5 จะได้

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

ถ้าเป็นเวกเตอร์ B จะได้ $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$

เพราะฉะนั้น $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x) \vec{i} + (A_y + B_y) \vec{j} + (A_z + B_z) \vec{k}$

ในกรณีขนาดของเวกเตอร์ A ก็คือ ความยาวนั่นเอง จะใช้สัญลักษณ์ $|A|$ แทนขนาดของ A

สำหรับผลคูณของเวกเตอร์ มี 2 แบบ คือ ผลคูณสเกลลาร์ หรือ จุด (scalar or dot product) จะได้ผลลัพธ์เป็น

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A| |B| \cos \theta$$


θ เป็นมุมระหว่าง \vec{A} และ \vec{B} และจะน้อยกว่า 180° เสมอ ถ้า $\theta = 90^\circ$ $\cos \theta$ จะเท่ากับศูนย์ \vec{A} ตั้งฉากกับ \vec{B} เรียกว่า ออร์โธโกนอล (orthogonal) กัน

พิจารณา

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}) \cdot (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) \\ &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \end{aligned}$$

เนื่องจาก

$$\begin{aligned} \vec{i} \cdot \vec{i} &= \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = \cos(0) = 1 \\ \vec{i} \cdot \vec{j} &= \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{aligned}$$



รูปที่ 8.6 ผลคูณครอสของ 2 เวกเตอร์ A และ B

ผลคูณอีกแบบหนึ่งของเวกเตอร์ คือ ผลคูณครอส (cross product) ขนาดของมันจะเป็น

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |A| |B| \sin \theta$$

พิจารณารูปที่ 8.6 จะเห็นว่าเวกเตอร์ลัพธ์จะลากตั้งฉากกับเวกเตอร์ A และ B และทิศทางจะต้องเป็นไปตามกฎมือขวา โดยเอามือขวาวางบน \vec{A} นิ้วทั้งสี่ชี้ไปทาง \vec{B} และเวกเตอร์ลัพธ์จะชี้ไปทางนิ้วหัวแม่มือ กรณีนี้ทำให้

$$\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$

เรียกว่า \vec{A} และ \vec{B} ไม่คอมมิว (commute) กัน

ถ้าเขียนในเทอมของเวกเตอร์ย่อย

$$\begin{aligned} (\vec{A} \times \vec{B}) &= (A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}) \times (B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}) \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k} \end{aligned}$$

อาจแยกให้เห็นชัดในรูปของดีเทอร์มิแนนท์ (determinant)

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix}$$

เครื่องหมายข้างหน้าเวกเตอร์ย่อย คิดจาก $(-1)^{i+j}$ เมื่อ $i =$ แถว (row)

และ $j =$ คอลัมน์ (column)

เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นตัวดำเนินการเวกเตอร์ ∇ จะเขียนได้เป็น

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad \dots \dots (8.41)$$

พิจารณานูนาคมมวล m มีโมเมนต์เชิงเส้น p ในระบบโคออร์ดิเนตคาร์ทีเซียน ให้ $r =$ เวกเตอร์จากจุดออริจิน (origin) ถึงนูนาค

$$\begin{aligned} r &= Tx + \vec{j}y + \vec{k}z \\ \vec{p} &= \vec{i}p_x + \vec{j}p_y + \vec{k}p_z \end{aligned}$$

โมเมนตัมเชิงมุม (L) ของอนุภาคจะเป็น

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$$

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \dots (8.42)$$

8.8) สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม (The Postulates of Quantum Mechanics)

ในตอนเริ่มแรกกลศาสตร์ควอนตัมแยกเป็น 2 ทางที่แตกต่างกัน โดยไฮร์ดิงเจอร์ได้ อาศัยกลศาสตร์คลาสสิกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น มาพิจารณาในการเคลื่อนที่ของอนุภาคเล็ก ๆ ขนาดอิเล็กตรอนและโมเลกุล โดยมองว่าเป็นลักษณะของคลื่นหนึ่ง ในขณะที่ไฮเซนเบอร์กใช้คุณสมบัติของเมตริก (matrix) มาคำนวณ ซึ่งก็ให้ผลตรงกับของไฮร์ดิงเจอร์ บอร์น (Born) และจอร์แดน (Jordan) เป็นผู้แสดงให้เห็นว่าตรงกันทุกอย่างแม้ว่าวิธีการจะต่างกันก็ตาม หลังจากนั้นต่อมากลศาสตร์ควอนตัมก็ได้พัฒนาเรื่อย ๆ มาโดย ดิแรก (Dirac) และ นิวมานน์ (Neumann) ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นว่าการนิยามของไฮร์ดิงเจอร์กับไฮเซนเบอร์กนั้นเป็นกรณีเฉพาะของทฤษฎีทั่ว ๆ ไป

ในทางเคมีแล้วจะพบว่าวิธีการแตกต่างกันมากในการแก้ปัญหา โดยปกติแล้วสมการไฮร์ดิงเจอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาจะใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุลมากโดยละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะรู้ไป เช่น อาจจะไม่สนใจและต้องการรู้ที่มาของสมการไฮร์ดิงเจอร์ซึ่งมาจากสมการคลื่น จำเป็นต้องศึกษาเรื่องคลื่นด้วย สงสัยว่าทำไมคำตอบที่ได้ออกมาเป็นระดับพลังงานในอะตอมและโมเลกุลได้ ยิ่งกว่านั้นความยุ่งยากในสมการคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานะต่าง ๆ ในอะตอมและโมเลกุลกับคลื่นนิ่งและคลื่นที่เคลื่อนที่อยู่ ซึ่งนักศึกษาวิชาเคมีมีพื้นฐานทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นไม่มากนัก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการตั้งกฎทางกลศาสตร์ควอนตัมให้อยู่ในวิธีการเดียวกับไฮร์ดิงเจอร์ซึ่งสามารถใช้ในการนำทาง ความคิดนี้ก็ทำโดยการตั้งเป็นสัจพจน์ขึ้นแล้วนำมาใช้ ผลที่ได้ตรงกับทดลอง สัจพจน์นั้นก็เป็นที่ยอมรับได้ ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกับทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎทั้ง 3 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ ก็คือ สัจพจน์นั่นเอง ซึ่งนำไปใช้แล้วให้ผลตรงกับทดลองทุกประการ

สัจพจน์ที่ 1 สถานะของระบบอธิบายได้โดยฟังก์ชันคลื่นของโคออร์ดิเนตและเวลา ใช้สัญลักษณ์ Ψ อาจเรียกฟังก์ชันสถานะ (state function) ก็ได้ ฟังก์ชันนี้จะบรรจุข้อมูลที่

สามารถหาได้เกี่ยวกับระบบ และฟังก์ชันนี้จะต้องเป็นค่าเดียว (single-valued) เป็นค่าต่อเนื่อง (continuous) ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งหมายถึงอนุพันธ์ (derivative) ลำดับที่ 1 และ 2 จะต้องเป็นค่าต่อเนื่องด้วย และฟังก์ชันนี้จะต้องมีค่าจำกัด (finite) หมายถึง Ψ จะเข้าใกล้ศูนย์ที่ $\pm\infty$ Ψ เป็นตัวแปรพลวัต จึงไม่ควรมีค่าเป็นอนันต์หรือกระโดดไปกระโดดมาอย่างไม่ต่อเนื่อง จะพบว่าระดับพลังงานจะเป็นควอนตัมได้ต่อเมื่อ Ψ มีค่าจำกัด ต่อเนื่องและมีค่าเดียว

กรณี Ψ^2 นั้นยอมรับว่ามีความหมายของโอกาส เราก็เลือก Ψ ซึ่งอาจเป็น Ψ^* (เชิงซ้อน) เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของโอกาสก็เป็น $\Psi\Psi^*$ ปริมาณ $\Psi\Psi^* d\tau$ จะเป็นโอกาสที่จะพบอนุภาคในปริมาตรน้อย ๆ $d\tau$ ดังนั้นจึงต้องกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาว่า โอกาสที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในเทศะ (space) ทั้งหมด จะต้องจำกัด เราจะได้

$$\int_0 \Psi\Psi^* d\tau = 1$$

เมื่อกรณีนี้เป็นจริง เรียกว่า Ψ ถูกทำให้เป็นปกติ (normalized) เรียก ฟังก์ชันคลื่นปกติ (normalized wave function) แสดงว่ามีโอกาสพบอนุภาคหนึ่งในเทศะทั้งหมด = 1

สัจพจน์ที่ 2 ค่าที่สังเกตได้ทางกายภาพทุก ๆ ค่าจะต้องมีลักษณะสมนัยกับตัวดำเนินการเฮอร์มิเตียนเชิงเส้น (linear Hermitian operator) คุณสมบัติทางกายภาพของตัวดำเนินการแสดงให้เห็นได้โดยใช้คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของตัวดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน

ตัวดำเนินการเฮอร์มิเตียนมีลักษณะดังนี้คือ

$$\int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau = \int \Psi (\hat{A} \Psi)^* d\tau \quad \dots\dots(8.43)$$

Ψ^* และ Ψ เป็นฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชันใด ๆ ที่มีสมบัติเป็นที่ยอมรับตามสัจพจน์ที่กล่าวมาแล้ว และ \hat{A} เป็นตัวดำเนินการเชิงเส้นที่เราสนใจ ค่าเฉลี่ยของปริมาณทางกายภาพจะต้องเป็นค่าจริง เราจึงได้สมการ (8.43) มา หมายความว่าค่าไอเกนของตัวดำเนินการเฮอร์มิเตียนจะต้องเป็นค่าจริง ลองพิจารณาว่า ถ้าเรามีฟังก์ชันไอเกน Ψ และตัวดำเนินการเฮอร์มิเตียน \hat{A} เพราะฉะนั้น

$$\hat{A} \Psi = a \Psi \quad \dots\dots(8.44)$$

สังยุคเชิงซ้อน (complex conjugate) ของสมการ (8.44) คือ

$$\hat{A}^* \Psi^* = a^* \Psi^* \quad \dots\dots(8.45)$$

คูณสมการ (8.44) ด้วย Ψ^* และสมการ (8.45) ด้วย Ψ แล้วอินทิเกรตจะได้

$$\int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau = a \int \Psi^* \Psi d\tau \quad \dots\dots(8.46)$$

และ $\int \Psi \hat{A}^* \Psi^* d\tau = a^* \int \Psi \Psi^* d\tau \quad \dots\dots(8.47)$

แต่จากสมการ (8.43) $\int \Psi^* \hat{A} \Psi d\tau = \int \Psi (\hat{A} \Psi)^* d\tau$ เพราะฉะนั้นสมการ (8.46) เท่ากับสมการ (8.47)

$$a \int \Psi^* \Psi d\tau = a^* \int \Psi \Psi^* d\tau \quad \dots\dots(8.48)$$

แต่ Ψ^* และ Ψ เป็นฟังก์ชันไม่ใช่ตัวดำเนินการ เพราะฉะนั้น $\Psi^* \Psi = \Psi \Psi^*$ นั่นคือ $a = a^*$

เพราะฉะนั้น a ซึ่งเป็นค่าไอเกนจะต้องเป็นค่าจริง เนื่องจากมีค่าเท่ากับสังยุคเชิงซ้อนของมัน
ตัวดำเนินการทางกลศาสตร์ควอนตัมจะหาได้อย่างไร วิธีหาที่โดยเขียนสมการของกลศาสตร์คลาสสิกของตัวแปรพลวัตที่ต้องการในทอมของโคออร์ดิเนต โมเมนตัม และ เวลา ก่อนแล้วจากนั้นก็ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก) เวลาและโคออร์ดิเนต ปล่อยให้อยู่ในรูปเดิม (เช่น x ก็เป็น x อย่างเดิม)
- ข) สำหรับโมเมนตัมในโคออร์ดิเนตคาร์ทีเซียน p_x ก็ให้เปลี่ยนเป็น ตัวดำเนินการ $-\frac{i\hbar}{\partial x}$ ตัวอย่างจะสร้างตัวดำเนินการสำหรับพลังงานจลน์ (T) สมการของกลศาสตร์คลาสสิกในโคออร์ดิเนตคาร์ทีเซียน เขียนได้เป็น

$$T = \frac{1}{2m} (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) \quad \dots\dots(8.49)$$

เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นตัวดำเนินการ จะได้

$$\hat{T} = \frac{1}{2m} [(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) + (-i\hbar \frac{\partial}{\partial y})(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}) + (-i\hbar \frac{\partial}{\partial z})(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z})] \quad \dots\dots(8.50)$$

หรือ $\hat{T} = \frac{-\hbar^2}{2m} (\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad \dots\dots(8.51)$

พิจารณาตัวดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดของระบบ คือ

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

เพราะฉะนั้น แทน \hat{H} จากสมการ (8.51)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V \quad \dots\dots(8.52)$$

สมการ (8.52) ก็คือตัวดำเนินการฮามิลโตเนียนที่เราทราบมาแล้วจากสมการ (8.27) นั้นเอง

ข้อพจน์ที่ 3 ค่าที่เป็นไปได้ที่สามารถได้จากการวัดค่าที่สังเกตได้ทางกายภาพ G ก็คือค่าไอเกน g_i ของสมการ

$$\hat{G}\psi_i = g_i \psi_i \quad \dots\dots(8.53)$$

เมื่อ \hat{G} เป็นตัวดำเนินการที่มีลักษณะสมนัยกับ G, ψ_i เป็นฟังก์ชันไอเกนซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นระดับพลังงานในอะตอมและโมเลกุล ค่าไอเกนที่ได้จึงต้องได้จากตัวดำเนินการพลังงาน ก็คือ ตัวดำเนินการฮามิลโตเนียน \hat{H} นั้นเอง นั่นคือ

$$\hat{H}\psi_i = E\psi_i$$

ก็เป็นสมการไชร่ดิงเจอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลานั้นเอง

ถ้าต้องการหาคคุณสมบัติอื่น ๆ ของระบบที่ไม่ใช่พลังงาน เช่น โมเมนตัมเชิงมุมก็จำเป็นต้องหาตัวดำเนินการใหม่ซึ่งไม่ใช่ตัวดำเนินการฮามิลโตเนียน

ข้อพจน์ที่ 4 กำหนดตัวดำเนินการ \hat{G} และกลุ่มของระบบที่เหมือน ๆ กัน 1 กลุ่มให้เป็น ψ_s ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันไอเกนของ \hat{G} เพราะฉะนั้น $\hat{G}\psi_s \neq a\psi_s$ การวัดคุณสมบัติของระบบด้วยตัวดำเนินการ \hat{G} จะให้ผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบ จึงจำเป็นต้องหาค่าเฉลี่ย คือ

$$\langle \hat{G} \rangle = \frac{\int \psi_s^* \hat{G} \psi_s d\tau}{\int \psi_s^* \psi_s d\tau}$$

ถ้า ψ ถูกทำให้ปกติแล้ว (normalized) ค่าเฉลี่ยจะเป็น

$$\langle \hat{G} \rangle = \int \psi_s^* \hat{G} \psi_s d\tau \quad \dots\dots(8.54)$$

ใช้เครื่องหมาย $\langle \rangle$ สำหรับค่าเฉลี่ย (mean value) ถ้า ψ_s เป็นฟังก์ชันไอเกนแล้วค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะเป็นค่าเดียวกับค่าไอเกนนั่นเอง

สมการ (8.55) สถานะของระบบที่เกี่ยวข้องกับเวลา กำหนดให้โดยสมการชโรดิงเงอร์แบบขึ้นกับเวลา คือ

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad \dots (8.55)$$

\hat{H} คือ ตัวดำเนินการแฮมิลโทเนียน (คือพลังงาน) ของระบบ ตัวดำเนินการนี้ได้มาจาก

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x, t)$$

จากสมการ (8.55) เปลี่ยน p_x เป็น $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ จะได้

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t)$$

แทนลงในสมการ (8.55) เพราะฉะนั้น

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V \Psi \quad \dots (8.56)$$

สมการ (8.56) เหมือนกับสมการ (8.32) ทุกประการ สมการ (8.56) นี้ใช้กับพหุคูณที่ขึ้นกับเวลา เนื่องจากการวิจัยยุคใหม่ ๆ ของเคมีควอนตัมและสเปกโตรสโกปีมักจะมีการเกี่ยวข้องกันด้วย

แบบฝึกหัดบทที่ 8

1. จากสมการของเดอบรอย $\lambda = \frac{h}{mv}$ จงคำนวณความยาวคลื่นของ ก) อิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลน์ 1 eV., 100 eV. ข) โปรตอนที่มีพลังงานจลน์ 1 eV. ค) โมเลกุล UF_6 ที่มีพลังงานจลน์ 1 eV. และ ง) ลูกบอลที่มีมวล 0.14 kg. และมีความเร็ว 44.7 m.s.^{-1}
2. ถ้าต้องการวัดตำแหน่งของอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10^3 nm . มวล 6.62×10^{-13} กรัม โดยใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป ที่มีกำลังขยาย 1.0 nm. จงคำนวณหาความไม่แน่นอนในตำแหน่ง หลังจาก 1 วินาทีผ่านไป คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค
3. จงแสดงว่า ce^{ax} เป็นฟังก์ชันไอเกน ของตัวดำเนินการ $\frac{d}{dx}$ และหาค่าไอเกนด้วย
4. จงแสดงว่า $(\sin ax)(\cos by)(\sin cz)$ เป็นฟังก์ชันไอเกน ของตัวดำเนินการลาปลาเชียน ∇^2 และหาค่าไอเกนด้วย
5. ถ้า $\psi = N \cdot e^{-ikt}$ จงแสดงว่า $\psi\psi^*$ จะเป็นค่าจริง
6. คำนวณหาค่าคงที่ความปกติ (normalisation constant) N. ของฟังก์ชันคลื่น

$$\psi = N \cdot r \cdot e^{-ar} \quad 0 \leq r \leq \infty$$

กำหนดให้
$$\int_0^{\infty} x^n \cdot e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

7. จากสมการเฮล์มฮอลทซ์ $\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \psi = 0$ จงแสดงให้ได้มาซึ่งสมการของไซร์ดิงเจอร์ โดยอาศัยสมมติฐานของเดอบรอย
8. จงแสดงว่าค่าไอเกน ของตัวดำเนินการเฮอร์มิเทียนเป็นค่าจริง
9. จงแสดงว่า ตัวดำเนินการ $\hat{p}_x = i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ เป็นตัวดำเนินการเฮอร์มิเทียน กรณีที่ตัวดำเนินการเฮอร์มิเทียนมีสมบัติเป็น

$$\int \psi_n^* \hat{R} \psi_m d\tau = \int \psi_m (\hat{R} \psi_n)^* d\tau$$

10. พิจารณาตัวดำเนินการ $\hat{R} = -\frac{d^2}{dx^2}$ และสมการฟังก์ชันไอเกน $\hat{R}u = \lambda u$

จงเขียนฟังก์ชันไอเกนที่เป็นไปได้

11. ตัวดำเนินการเชิงเส้น R มีสมบัติดังนี้

$$\hat{R}(u+v) = \hat{R}u + \hat{R}v$$

$$\hat{R}(cu) = c\hat{R}u$$

โดยที่ c เป็นเลขเชิงซ้อน (complex number) จงหาว่าตัวดำเนินการต่อไปนี้ ตัวไหนเป็นเชิงเส้น

ก) $\hat{A}u = \lambda u$ เมื่อ $\lambda =$ ค่าคงที่

ข) $\hat{B}u = u^*$

ค) $\hat{C}u = u^2$

ง) $\hat{D}u = \frac{du}{dx}$

จ) $\hat{E}u = \frac{1}{u}$

12. ถ้าอิเล็กตรอนถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ 1000 V.

ก) จงคำนวณหาความยาวคลื่นโคบรอย ข) จงคำนวณหาความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดจากอิเล็กตรอนนี้ไปกระทบของแข็ง
