

## บทที่ 2 ความสัมพันธ์ (Relations)

- 2.1 ความสัมพันธ์แบบทวิภาค (Binary Relation)
- 2.2 ความสัมพันธ์บนเซต (Relation on a Set)
- 2.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์ (Properties of Relations)
- 2.4 การรวมความสัมพันธ์ (Combining Relations)
- 2.5 การแทนที่ความสัมพันธ์ (Representing Relation)
- 2.6 ฟังก์ชัน (Functions)

## 2.1 ความสัมพันธ์แบบทวิภาค (Binary Relation)

วิธี ซึ่งตรงมากที่สุด ในการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ของ สองเซต คือการใช้ คู่อันดับ ประกอบขึ้น จาก สมาชิกสองตัวที่มีความสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุผลนี้ เซตของคู่อันดับ จึงเรียกว่า ความสัมพันธ์ ทวิภาค

บทนิยาม ให้  $A$  และ  $B$  เป็นเซต ความสัมพันธ์ทวิภาค จาก  $A$  ไป  $B$  หมายถึงเซตย่อย ของ  $A \times B$

(Let  $A$  and  $B$  be sets. A **binary relation** from  $A$  to  $B$  is a subset of  $A \times B$ .)

ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $A$  ไป  $B$  จะได้  $R \subseteq A \times B$

พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ทวิภาค จาก  $A$  ไป  $B$  หมายถึง เซตของคู่อันดับ ซึ่งสมาชิกตัวแรก ของ คู่อันดับ แต่ละชุด มาจากเซต  $A$  และ สมาชิกตัวที่สอง มาจากเซต  $B$  เราใช้สัญลักษณ์  $aRb$  เพื่อแสดงว่า  $(a, b) \in R$  และใช้  $a \not R b$  เพื่อแสดงว่า  $(a, b) \notin R$  นอกจากนี้แล้ว เมื่อ  $(a, b)$  อยู่ใน  $R$  เรียกว่า  $a$  เกี่ยวข้องกับ  $b$  ด้วย ความสัมพันธ์  $R$  ( $a$  is said to be related to  $b$  by  $R$ )

ตัวอย่าง ให้  $A$  เป็น เซตของนักศึกษา ใน ชั้นเรียน แห่งหนึ่ง และ  $B$  เป็นเซตของ ภาควิชา ที่เปิดสอน ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่อันดับ  $(a, b)$  เมื่อ  $a$  เป็นนักศึกษา ซึ่งลงทะเบียน วิชา  $b$


ความสัมพันธ์ อาจแทน ด้วยตารางข้างล่างนี้

นักศึกษา	ภาควิชา
มาลี	CT 203
มาลี	MA 111
อนันต์	CT 105
สุขสันต์	MA 111
สุขสันต์	PS 110
สมศรี	IT 105
อนันต์	CT 203

หรือ แสดงด้วย เซต ของ คู่อันดับ ดังนี้

$$R = \{(\text{มาลี}, \text{CT 203}), (\text{มาลี}, \text{MA 111}), (\text{อนันต์}, \text{CT 105}), (\text{สุขสันต์}, \text{MA 111}), (\text{สุขสันต์}, \text{PS 110}), (\text{สมศรี}, \text{IT 105}), (\text{อนันต์}, \text{CT 203})\}$$

หรือแทนด้วย รูปภาพดังนี้




ตัวอย่าง ให้  $A = \{0, 1, 2\}$ ,  $B = \{a, b\}$

$R$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $A$  ไป  $B$

$$R = \{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$$

จะเห็นว่า  $0Ra$  แต่  $\cancel{Rb}$

ความสัมพันธ์ อาจแทนด้วย กราฟ โดยใช้ลูกศร เพื่อแทนคู่อันดับ



หรือแทน ความสัมพันธ์ โดยการ ใช้ ตาราง

R	a	b
0	x	x
1	x	
2		x

โดเมน (Domain) ของ R ใช้สัญลักษณ์  $\text{Dom}(R)$  หมายถึง เซตของสมาชิก ในเซต A ซึ่งสัมพันธ์ กับสมาชิก บางตัว ใน B พุคอีกอย่างหนึ่งคือ  $\text{Dom}(R)$  เป็นเซตย่อยของ A นั่นคือ เป็นเซตของสมาชิกตัวแรกทั้งหมด ในคู่อันดับ ซึ่งเกิดขึ้น ใน R ดังนั้น

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A \mid (a, b) \in R \text{ for some } b \in B\}$$

พิสัย (Range) ของ R ใช้สัญลักษณ์  $\text{Ran}(R)$  หมายถึง เซตของสมาชิก ใน B ซึ่งเป็นสมาชิก ตัวที่สอง ในคู่อันดับต่างๆ ใน R นั่นคือ สมาชิกทั้งหมด ใน B ซึ่งสัมพันธ์ กับสมาชิกบางตัว ใน A หรือ พิสัยของ R เป็นเซตย่อยของ B

$$\text{Ran}(R) = \{b \in B \mid (a, b) \in R \text{ for some } a \in A\}$$

ถ้า ความสัมพันธ์ แทนด้วยตาราง โดเมนของ R จะประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด ใน สดมภ์แรก และพิสัยของ R จะประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด ใน สดมภ์ที่สอง

ตัวอย่าง ให้  $A = \{2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

ถ้าเรานิยามความสัมพันธ์ R จาก A ไป B ดังนี้

$(a, b) \in R$  ถ้า a หาร b ลงตัว

R	3	4	5	6	7
2		x		x	
3	x			x	
4		x			

เพราะฉะนั้น

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

$$\text{Dom}(R) = \{2, 3, 4\}$$

$$\text{Ran}(R) = \{3, 4, 6\}$$

## 2.2 ความสัมพันธ์บนเซต (Relations on a Set)

ความสัมพันธ์ จากเซต A ไปยังตัวมันเอง หรือ ความสัมพันธ์ของสมาชิก ซึ่งอยู่ในเซตเดียวกัน

บทนิยาม ความสัมพันธ์ บนเซต A หมายถึงความสัมพันธ์ จาก A ไป A

(A relation on the set A is a relation from A to A.)

หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ความสัมพันธ์บนเซต A หมายถึง เซตย่อยของ  $A \times A$

ตัวอย่าง ให้  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  จงหาความสัมพันธ์ทั้งหมด ในความสัมพันธ์

$$R = \{(a, b) \mid a \text{ divides } b\}$$


ผลเฉลย

R	1	2	3	4
1	x	x	x	x
2		x		x
3			x	
4				x

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$$


และ  $\text{Dom}(R) = \text{Ran}(R) = A$

อีกวิธีหนึ่ง ในการแทน ความสัมพันธ์ บนเซต คือ วาดรูป ไดกราฟ (digraph) ของความสัมพันธ์ โดยกำหนดให้ จุด (vertices) หรือ วงกลม (circles) แทนสมาชิกของเซต A ถ้าสมาชิก  $(a, b)$  อยู่ในความสัมพันธ์ R ให้ลากลูกศร เรียกว่า เส้นมีทิศทาง (directed edge) จาก a ไป b จากตัวอย่างข้างต้น รูปไดกราฟ เป็นดังนี้



โปรดสังเกตว่า สมาชิก ในรูปแบบ  $(a, a)$  ในความสัมพันธ์ สมนัยกับ เส้นมีทิศทางหนึ่งเส้น จาก a ไป a เส้นลักษณะนี้ เรียกว่า รูปบ่วง (loop)

ตัวอย่าง ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ บนเซต  $X = \{a, b, c, d\}$  กำหนดโดย โดกราฟ ข้างล่างนี้  
จงเขียนรายการคู่อันดับ ซึ่งเป็นสมาชิกของ  $R$



จะได้  $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$

ตัวอย่าง จงพิจารณา ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ บนเซตของจำนวนเต็ม

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$$

$$R_2 = \{(a, b) \mid a > b\}$$

$$R_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ or } a = -b\}$$

$$R_4 = \{(a, b) \mid a = b\}$$

$$R_5 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$$

$$R_6 = \{(a, b) \mid a = b \leq 3\}$$

ความสัมพันธ์ ชุดใดบ้าง ซึ่ง ประกอบด้วย แต่ละชุดของ คู่อันดับ  $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, -1)$   
และ  $(2, 2)$

ผลเฉลย

คู่อันดับ  $(1, 1)$  อยู่ในความสัมพันธ์  $R_1, R_3, R_4, R_6$

คู่อันดับ  $(1, 2)$  อยู่ในความสัมพันธ์  $R_1$  และ  $R_6$

คู่อันดับ  $(2, 1)$  อยู่ในความสัมพันธ์  $R_2, R_5$  และ  $R_6$

คู่อันดับ  $(1, -1)$  อยู่ในความสัมพันธ์  $R_2, R_3$  และ  $R_6$

สุดท้าย คู่อันดับ  $(2, 2)$  อยู่ในความสัมพันธ์  $R_1, R_3$  และ  $R_4$

ตัวอย่าง จงคำนวณหา จำนวนของ ความสัมพันธ์ บนเซต ที่มีสมาชิก  $n$  ตัว (How many relations are there on a set with  $n$  elements?)

ผลเฉลย ความสัมพันธ์ บนเซต  $A$  หมายถึง เซตย่อยของ  $A \times A$

เนื่องจาก  $A \times A$  มีสมาชิก  $n \cdot n = n^2$  ตัว

และเซตที่มีสมาชิก  $n$  ตัว จะมีเซตย่อย  $2^n$  ชุด  
 เพราะฉะนั้น  $A \times A$  จะมีเซตย่อย  $2^{(n^2)}$  ชุด  
 ดังนั้น เซตที่มีสมาชิก  $n$  ตัว จะมีจำนวนของ ความสัมพันธ์ได้เท่ากับ  $2^n$  ชุด

### 2.3 คุณสมบัติของความสัมพันธ์

(Properties of Relations)

มีคุณสมบัติ หลายอย่าง ที่ใช้ในการจำแนก ความสัมพันธ์ บนเซต สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ ใน ความสัมพันธ์บางอย่าง สมาชิกปกติจะ สัมพันธ์ กับ ตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น ให้  $R$  เป็น ความสัมพันธ์ บนเซต ของ ผู้คนทั้งหมด ประกอบด้วยคู่อันดับ  $(x, y)$  เมื่อ  $x$  และ  $y$  มี พ่อคน เดียวกัน และมีแม่คนเดียวกัน ดังนั้น  $xRx$  สำหรับ มนุษย์  $x$  ทุกคน

**บทนิยาม** ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  จะเรียกว่า การสะท้อน ถ้าคู่อันดับ  $(a, a) \in R$  สำหรับสมาชิกทุกตัว  $a \in A$

(A relation  $R$  on a set  $A$  is called **reflexive** if  $(a, a) \in R$  for every element  $a \in A$ .)

ความสัมพันธ์ บนเซต  $A$  จะเป็นการสะท้อน ถ้า สมาชิกทุกตัว ของ  $A$  มีความสัมพันธ์ กับ ตัวมันเอง

ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  จะเรียกว่า การไม่สะท้อน ถ้าไม่มีสมาชิกใดๆ ในเซต  $A$  มีความสัมพันธ์ กับ ตัวมันเอง

(A relation  $R$  on the set  $A$  is **irreflexive** if every  $a \in A$ ,  $(a, a) \notin R$ .)

ตัวอย่าง 2.3.1 จงพิจารณา ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ บนเซต  $\{1, 2, 3, 4\}$

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$$

$$R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)\}$$

$$R_4 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

$$R_5 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$$

$$R_6 = \{(3, 4)\}$$

ความสัมพันธ์ ชุดใด เป็น การสะท้อน และชุดใดบ้าง เป็น การไม่สะท้อน

ผลเฉลย ความสัมพันธ์  $R_3$  และ  $R_5$  เป็นการสะท้อน เพราะว่า ทั้งคู่ มี คู่อันดับทั้งหมด ในรูปแบบ  $(a, a)$  ได้แก่  $(1, 1)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(3, 3)$  และ  $(4, 4)$  ส่วนความสัมพันธ์  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_4$  และ  $R_6$  ไม่ใช่การสะท้อน (is not reflexive) ความสัมพันธ์  $R_4$ ,  $R_6$  เป็นการไม่สะท้อน (irreflexive) ความสัมพันธ์  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_5$  ไม่ใช่ การไม่สะท้อน (is not irreflexive) จะเห็นว่า  $R_1$  และ  $R_2$  ไม่ใช่การสะท้อน และไม่ใช่การไม่สะท้อนด้วย

ตัวอย่าง จงคำนวณหา จำนวนของ ความสัมพันธ์การสะท้อน บน เซต ที่มีสมาชิก  $n$  ตัว (How many reflexive relations are there on a set with  $n$  elements?)

ผลเฉลย ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  คือ เซตย่อยของ  $A \times A$  ดังนั้น ความสัมพันธ์คำนวณจาก คู่อันดับใดบ้าง ของ คู่อันดับทั้งหมด  $n^2$  คู่ ใน  $A \times A$

อย่างไรก็ตาม ถ้า  $R$  เป็นการสะท้อน คู่อันดับแต่ละชุด  $(a, a)$  จำนวน  $n$  คู่ สำหรับ  $(a, a) \in A$  ต้องอยู่ใน  $R$  คู่อันดับแต่ละคู่อื่นๆ จำนวน  $n(n - 1)$  คู่ ในรูปแบบ  $(a, b)$  เมื่อ  $a \neq b$  อาจอยู่ใน  $R$  หรือ อาจจะไม่อยู่ใน  $R$

ดังนั้น จากกฎผลคูณ ของการนับจำนวน จะมีความสัมพันธ์การสะท้อน จำนวน  $2^{n(n-1)}$  ชุด (หมายถึง จำนวนวิธีในการเลือกว่า สมาชิก  $(a, b)$  แต่ละคู่ ซึ่ง  $a \neq b$  อยู่ใน  $R$  หรือไม่)



ความสัมพันธ์บางอย่าง สมาชิกตัวหนึ่ง จะสัมพันธ์กับ สมาชิกตัวที่สอง ก็ต่อเมื่อ สมาชิกตัวที่สอง สัมพันธ์กับ สมาชิกตัวที่หนึ่งด้วย ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย คู่อันดับ  $(x, y)$  เมื่อ  $x$  และ  $y$  เป็น นักศึกษา ใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีคุณสมบัติว่าเคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาเดียวกัน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งวิชา

ความสัมพันธ์อีกชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติว่า ถ้าสมาชิกตัวที่หนึ่ง สัมพันธ์กับ สมาชิกตัวที่สอง แล้ว สมาชิกตัวที่สอง จะต้องไม่สัมพันธ์กับ สมาชิกตัวที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยคู่อันดับ  $(x, y)$  เมื่อ  $x$  และ  $y$  เป็น นักศึกษา ใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  $x$  มีเกรดเฉลี่ย สูงกว่า  $y$  ดังนั้น  $y$  จึงไม่มีคุณสมบัตินี้

**บทนิยาม** ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  จะเรียกว่า สมมาตร ถ้าคู่อันดับ  $(b, a) \in R$  ครอบคลุมโดยที่  $(a, b) \in R$  สำหรับ  $a, b \in A$

(A relation  $R$  on a set  $A$  is called **symmetric** if  $(b, a) \in R$  whenever  $(a, b) \in R$ , for  $a, b \in A$ .)

ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  โดยที่  $(a, b) \in R$  และ  $(b, a) \in R$  ก็ต่อเมื่อ  $a = b$  สำหรับ  $a, b \in A$  เรียกว่า ปฏิสมมาตร

(A relation  $R$  on a set  $A$  such that  $(a, b) \in R$  and  $(b, a) \in R$  only if  $a = b$ , for  $a, b \in A$ , is called **antisymmetric**.)

นั่นคือ ความสัมพันธ์ เป็น สมมาตร ก็ต่อเมื่อ ถ้า  $a$  สัมพันธ์กับ  $b$  แสดงว่า  $b$  สัมพันธ์กับ  $a$

ความสัมพันธ์ เป็น ปฏิสมมาตร ก็ต่อเมื่อ ไม่มีคู่อันดับใดๆ เลขที่ สมาชิก  $a$  ซึ่งแตกต่างกับ  $b$  โดยที่  $a$  สัมพันธ์กับ  $b$  และ  $b$  สัมพันธ์กับ  $a$

คำว่า สมมาตร และ ปฏิสมมาตร ไม่ใช่คำตรงกันข้ามกัน (are not opposites) เพราะว่า ความสัมพันธ์ใดๆ อาจจะเป็นทั้ง สมมาตร และ ปฏิสมมาตร ทั้งคู่ หรือ ไม่ใช่สมมาตร และไม่ใช่ปฏิสมมาตร ทั้งคู่

ความสัมพันธ์ใดๆ จะไม่สามารถ เป็น สมมาตร และ เป็นปฏิสมมาตร ทั้งคู่ ถ้าความสัมพันธ์ นั้น มี คู่อันดับ บางคู่ ในรูปแบบ  $(a, b)$  โดยที่  $a \neq b$

**ตัวอย่าง** จากตัวอย่างที่ 2.3.1 หน้า 2-7 ความสัมพันธ์ ชุดใดบ้างเป็นสมมาตร และชุดใดบ้างเป็นปฏิสมมาตร

ผลเฉลย

$R_2$  และ  $R_3$  เป็นสมมาตร

$R_4, R_5$  และ  $R_6$  เป็นปฏิสมมาตร

ตัวอย่าง  $R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (d, d)\}$  เป็นความสัมพันธ์สมมาตร บนเซต  $X = \{a, b, c, d\}$  เพราะว่า ไคกราฟของความสัมพันธ์ มีคุณสมบัติว่า ตรีภาคที่มีเส้นมีทิศทางจาก  $b$  ไป  $c$  จะต้องมีเส้นจาก  $c$  ไป  $b$  ด้วย

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ “divides” บนเซตของจำนวนเต็มบวก เป็นสมมาตร หรือไม่? เป็นปฏิสมมาตร หรือไม่?

ผลเฉลย ความสัมพันธ์นี้ ไม่ใช่ สมมาตร เพราะว่า  $1 \mid 2$  แต่  $2 \nmid 1$

ความสัมพันธ์นี้ เป็นปฏิสมมาตร เพราะว่า ถ้า  $a$  และ  $b$  เป็น จำนวนเต็มบวก โดยที่  $a \mid b$  และ  $b \mid a$  จะได้ว่า  $a = b$

ความสัมพันธ์  $R$  จะเรียกว่า อสมมาตร ถ้าคู่อันดับ  $(a, b) \in R$  แสดงว่า  $(b, a) \notin R$

(A relation  $R$  is called asymmetric if  $(a, b) \in R$  then  $(b, a) \notin R$ .)

ไคกราฟ ของ ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร มีคุณสมบัติว่า ระหว่าง สองจุดใดๆ จะมีเส้นเชื่อม อย่างมากที่สุด หนึ่งเส้น

ถ้าความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $X$  ไม่มีสมาชิกใดๆ เลย ในรูปแบบ  $(x, y)$  โดยที่  $x \neq y$  ดังนั้น  $R$  เป็นปฏิสมมาตร

ตัวอย่าง ให้  $R = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$  เป็นความสัมพันธ์ บน  $X = \{a, b, c\}$

ดังนั้น  $R$  เป็น ปฏิสมมาตร ในกรณีนี้ ถ้า  $x$  และ  $y$  เป็นสมาชิก ในเซต  $X$  ประพจน์ if  $(x, y) \in R$  and  $x \neq y$  then  $(y, x) \notin R$  เป็นจริง เพราะว่า สมมติฐาน (hypothesis) เป็นเท็จ



a



b



c

จากรูป ไคกราฟ ของ  $R$  จะเห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  เป็นการสะท้อน เป็นสมมาตร

ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ ประกอบด้วย คู่อันดับ ทั้งหมด  $(x, y)$  ของ นักศึกษา ใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ  $x$  สอบได้ จำนวนหน่วยกิต มากกว่า  $y$  สมมติว่า  $x$  สัมพันธ์ กับ  $y$  และ  $y$  สัมพันธ์กับ  $z$  สิ่งนี้ หมายความว่า  $x$  มีหน่วยกิต มากกว่า  $y$  และ  $y$  มีหน่วยกิต มากกว่า  $z$  แสดงว่า  $x$  สัมพันธ์กับ  $z$  สิ่งทีกล่าวมานี้ คือ คุณสมบัติ การถ่ายทอด

**บทนิยาม** ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  จะเรียกว่า การถ่ายทอด ถ้า เมื่อใดก็ตามที่  $(a, b) \in R$  และ  $(b, c) \in R$  จะได้  $(a, c) \in R$  สำหรับ  $a, b, c \in A$

(A relation  $R$  on a set  $A$  is called **transitive** if whenever  $(a, b) \in R$  and  $(b, c) \in R$  then  $(a, c) \in R$ , for  $a, b, c \in A$ .)

**ตัวอย่าง** จากตัวอย่าง 2.3.1 หน้า 2-7 ความสัมพันธ์ ชุดใดบ้าง เป็นการถ่ายทอด  
**ผลเฉลย**

$R_4, R_5$  และ  $R_6$  เป็น การถ่ายทอด

**ตัวอย่าง** ความสัมพันธ์ “divides” บนเซตของจำนวนเต็มบวก เป็นการถ่ายทอด หรือไม่?

**ผลเฉลย** สมมติว่า  $a$  divides  $b$  และ  $b$  divides  $c$

ให้  $k$  และ  $l$  เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ

จะได้  $b = ak$  และ  $c = bl$

ดังนั้น  $c = ak l$  แสดงว่า  $a$  divides  $c$

ความสัมพันธ์ นี้ จึงเป็น การถ่ายทอด

ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ จาก เซต  $A$  ไป เซต  $B$  ความสัมพันธ์ผกผันจาก  $B$  ไป  $A$  ใช้สัญลักษณ์  $R^{-1}$  หมายถึง เซตของคู่อันดับ  $\{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$

(Let  $R$  be a relation from a set  $A$  to a set  $B$ . The **inverse relation** from  $B$  to  $A$ , denoted by  $R^{-1}$ , is the set of ordered pair  $\{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$ .)

ความสัมพันธ์ส่วนเติมเต็ม  $\bar{R}$  หมายถึง เซตของคู่อันดับ  $\{(a, b) \mid (a, b) \notin R\}$

(The **complementary relation**  $\bar{R}$  is the set of ordered pair  $\{(a, b) \mid (a, b) \notin R\}$ .)

ตัวอย่าง ให้

$$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

เป็นความสัมพันธ์ จาก  $X = \{2, 3, 4\}$  ไป  $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

จงหา  $R^{-1}$ ,  $\bar{R}$

ผลเฉลย

$$R^{-1} = \{(4, 2), (6, 2), (3, 3), (6, 3), (4, 4)\}$$

$$\bar{R} = \{(2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 3), (4, 5), (4, 6), (4, 7)\}$$

#### 2.4 การรวมความสัมพันธ์ (Combining Relations)

เนื่องจาก ความสัมพันธ์ จาก  $A$  ไป  $B$  เป็นเซตย่อย ของ  $A \times B$  ดังนั้น ความสัมพันธ์ สองชุด จาก  $A$  ไป  $B$  สามารถ รวมกัน (combined) ได้ ใน วิธี เช่นเดียวกับ การรวม สองเซต

ตัวอย่าง ให้  $A = \{1, 2, 3\}$  ,  $B = \{1, 2, 3, 4\}$

ความสัมพันธ์  $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

สามารถรวมกันได้ ดังนี้

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1)\}$$

$$R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_2 - R_1 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

$$R_1 \oplus R_2 = \{(2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

บทนิยาม ให้  $R_1$  เป็นความสัมพันธ์ จาก เซต  $X$  ไป เซต  $Y$  และ  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์ จาก เซต  $Y$  ไปเซต  $Z$  ผลประกอบของความสัมพันธ์  $R_1$  และ  $R_2$  ใช้สัญลักษณ์  $R_2 \circ R_1$  หมายถึง ความสัมพันธ์ จาก  $X$  ไป  $Z$  นิยามดังนี้

$$R_2 \circ R_1 = \{(x, z) \mid (x, y) \in R_1 \text{ and } (y, z) \in R_2 \text{ for some } y \in Y\}$$

ตัวอย่าง ให้

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$$


เป็นความสัมพันธ์ จาก  $\{1, 2, 3\}$  ไป  $\{1, 2, 3, 4\}$

และ  $R_2 = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$

เป็นความสัมพันธ์ จาก  $\{1, 2, 3, 4\}$  ไป  $\{0, 1, 2\}$

จงหา ผลประกอบของความสัมพันธ์  $R_1$  และ  $R_2$

ผลเฉลย



$$R_2 \circ R_1 = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}$$

กำลังของความสัมพันธ์  $R$  สามารถนิยามเชิงอุปนัยได้จาก บทนิยามของ ผลประกอบของความสัมพันธ์ สองชุด

บทนิยาม ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ บนเซต  $A$  กำลัง  $R^n$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , นิยามเชิงอุปนัย ดังนี้

$$R^1 = R \text{ และ } R^{n+1} = R^n \circ R$$

(Let  $R$  be a relation on the set  $A$ . The powers  $R^n$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , are defined inductively by  $R^1 = R$  and  $R^{n+1} = R^n \circ R$ )

จากบทนิยามนี้ แสดงว่า  $R^2 = R \circ R$

$$R^3 = R^2 \circ R = (R \circ R) \circ R$$

เช่นนี้เรื่อยไป

ตัวอย่าง ให้

$$R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

จงหา กำลัง  $R^n$ ,  $n = 2, 3, 4, \dots$

ผลเฉลย

เนื่องจาก  $R^2 = R \circ R$

$$= \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 2)\}$$

$$R^3 = R^2 \circ R$$

$$= \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$$

$$R^4 = R^3 \circ R$$

$$= \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$$

เมื่อกำหนดต่อไป จะได้

$$R^n = R^3 \text{ สำหรับ } n = 5, 6, 7, \dots$$

แบบฝึกหัดเสริม

1. จงหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในความสัมพันธ์  $R$  จาก  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  ไป  $B = \{0, 1, 2, 3\}$

เมื่อ  $(a, b) \in R$  ก็ต่อเมื่อ

a)  $a = b$

b)  $a + b = 4$

c)  $a > b$

d)  $a \mid b$

e)  $\gcd(a, b) = 1$

f)  $\text{lcm}(a, b) = 2$

2. a) จงหาความสัมพันธ์ทั้งหมด ในความสัมพันธ์  $R = \{(a, b) \mid a \text{ divides } b\}$  บนเซต  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

b) จงวาดภาพความสัมพันธ์นี้ เช่นที่แสดงในตัวอย่าง 4

c) จงวาดภาพความสัมพันธ์นี้ ในรูปตาราง เช่นที่แสดงในตัวอย่าง 4

3. สำหรับความสัมพันธ์แต่ละชุดข้างล่างนี้ บนเซต  $\{1, 2, 3, 4\}$  จงพิจารณาว่า มันเป็นการ สะท้อน, สมมาตร, ปฏิสมมาตร และการถ่ายทอด หรือไม่

a)  $\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$

b)  $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

c)  $\{(2, 4), (4, 2)\}$

d)  $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- e)  $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- f)  $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$
4. จงบอกว่าคุณสมบัติความสัมพันธ์  $R$  บนเซตของคนที่ทั้งหมด เป็นการสะท้อน, สมมาตร, ปฏิสมมาตร และ/หรือการถ่ายทอด หรือไม่ เมื่อ  $(a, b) \in R$  ก็ต่อเมื่อ
- a สูงกว่า b
  - a และ b เกิดในวันเดียวกัน
  - a มีชื่อเหมือนกับ b
  - a และ b มีปู่คนเดียว
5. จงหาว่าคุณสมบัติความสัมพันธ์  $R$  บนเซตของจำนวนเต็มทั้งหมด เป็นการสะท้อน, สมมาตร, ปฏิสมมาตร และ/หรือ การถ่ายทอด หรือไม่ เมื่อ  $(x, y) \in R$  ก็ต่อเมื่อ
- $x \neq y$
  - $xy \geq 1$
  - $x = y + 1$  หรือ  $x = y - 1$
  - $x \equiv y \pmod{7}$
  - $x$  เป็นตัวคูณร่วมของ  $y$
  - $x$  และ  $y$  เป็นค่าลบทั้งคู่ หรือ ไม่เป็นค่าลบทั้งคู่
  - $x = y^2$
  - $x \geq y^2$
6. จงให้ตัวอย่างของคุณสมบัติบนเซต ซึ่งเป็น
- สมมาตร และปฏิสมมาตร
  - ไม่เป็นสมมาตร และไม่เป็นปฏิสมมาตร
7. ในแบบฝึกหัดข้อ 3 ความสัมพันธ์ชุดใดเป็นการไม่สะท้อน
8. ในแบบฝึกหัดข้อ 4 ความสัมพันธ์ชุดใดเป็นการไม่สะท้อน
9. ความสัมพันธ์หนึ่งชุดบนเซต สามารถไม่เป็นการสะท้อนและไม่เป็นการไม่สะท้อน ได้หรือไม่?
10. ในแบบฝึกหัดข้อ 3 ความสัมพันธ์ชุดใด เป็น อสมมาตร
11. ในแบบฝึกหัดข้อ 4 ความสัมพันธ์อันไหน เป็น อสมมาตร
12. ความสัมพันธ์อสมมาตร ต้องเป็นปฏิสมมาตร หรือไม่?
13. ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร ต้องเป็นอสมมาตร หรือไม่? จงบอกเหตุผลสำหรับคำตอบ





- c) สมมาตร  
e) อสมมาตร
- d) ปฏิสมมาตร  
f) การถ่ายทอด
25. มีความสัมพันธ์จำนวนเท่าไร บนเซตซึ่งมีสมาชิก  $n$  ตัว ซึ่ง
- a) สมมาตร  
b) ปฏิสมมาตร  
c) อสมมาตร  
d) การไม่สะท้อน  
e) การสะท้อน และสมมาตร  
f) ไม่เป็นการสะท้อน และไม่เป็นการไม่สะท้อน
26. มีความสัมพันธ์การถ่ายทอด จำนวนเท่าไร บนเซต ซึ่งมีสมาชิก  $n$  ตัว ซึ่ง
- a)  $n = 1$   
b)  $n = 2$   
c)  $n = 3$
27. จงหาข้อผิดพลาด ของการพิสูจน์ ทฤษฎีบท ข้างล่างนี้  
ทฤษฎีบท ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์บนเซต  $A$  ซึ่งเป็นสมมาตรและการถ่ายทอด แล้ว  $R$  จะเป็นการสะท้อน  
พิสูจน์ ให้  $a \in A$  มีสมาชิกหนึ่งตัว  $b \in A$  โดยที่  $(a, b) \in R$  เพราะว่า  $R$  เป็นสมมาตร เรามี  $(b, a) \in R$  โดยการใช้คุณสมบัติการถ่ายทอด เราสามารถสรุปได้ว่า  $(a, a) \in R$  เนื่องจาก  $(a, b) \in R$  และ  $(b, a) \in R$
28. สมมติว่า  $R$  และ  $S$  เป็นความสัมพันธ์การสะท้อน บนเซต  $A$  จงพิสูจน์ หรือพิสูจน์ว่า เท็จ ข้อความแต่ละชุดต่อไปนี้
- a)  $R \cup S$  เป็นการสะท้อน  
b)  $R \cap S$  เป็นการสะท้อน  
c)  $R \oplus S$  เป็นการไม่สะท้อน  
d)  $R - S$  เป็นการไม่สะท้อน  
e)  $S \circ R$  เป็นการสะท้อน
29. จงแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  เป็นสมมาตร ก็ต่อเมื่อ  $R = R^{-1}$  เมื่อ  $R^{-1}$  เป็นความสัมพันธ์ผกผัน
30. จงแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  เป็นปฏิสมมาตร ก็ต่อเมื่อ  $R \cap R^{-1}$  เป็นเซตย่อยของความสัมพันธ์เฉียง  $\Delta = \{(a, a) \mid a \in A\}$
31. จงแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  เป็นการสะท้อน ก็ต่อเมื่อ ความสัมพันธ์ผกผัน  $R^{-1}$  เป็นการสะท้อน

32. จงแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A$  เป็นการสะท้อน ก็ต่อเมื่อ ความสัมพันธ์ เดิมเติม  $\bar{R}$  เป็นการไม่สะท้อน
33. ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการสะท้อนและการถ่ายทอด จงพิสูจน์ว่า  $R^n = R$  สำหรับ จำนวนเต็มบวก  $n$  ทุกตัว
34. ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์บนเซต  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  ประกอบด้วยคู่อันดับ  $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 2)$  และ  $(5, 4)$  จงหา  
 a)  $R^2$                       b)  $R^3$                       c)  $R^4$                       d)  $R^5$
35. ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์การสะท้อน บนเซต  $A$  จงแสดงให้เห็นว่า  $R^n$  เป็นสมมาตร สำหรับจำนวนเต็มบวก  $n$  ทั้งหมด
36. ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์สมมาตร จงแสดงให้เห็นว่า  $R^n$  เป็นสมมาตร สำหรับ จำนวน เต็มบวก  $n$  ทั้งหมด
37. สมมติว่าความสัมพันธ์  $R$  เป็นการไม่สะท้อน  $R^n$  จำเป็นต้องเป็นการไม่สะท้อน หรือ ไม่ จงบอกเหตุผลสำหรับคำตอบของท่าน

แบบฝึกหัด 2.4

ข้อ 1-4 จงเขียนความสัมพันธ์จากตารางข้างล่างนี้ ให้เป็นเซตของคู่อันดับ (as a set of ordered pairs.)

1.

8840	Hammer
992 I	Pliers
452	Paint
2207	carpet

2.

a	3
b	1
c	4
d	1

3.

Sally	Math
Ruth	Physics
Sam	Econ

4.

a	a
b	b

ข้อ 5-8 จงเขียนความสัมพันธ์เป็นตาราง (write the relation as a table)

5.  $R = \{(a, 6), (b, 2), (a, 1), (c, 1)\}$

6.  $R = \{(Roger, Music), (Pat, History), (Ben, Match), (Pat, PolySci)\}$

7. ความสัมพันธ์  $R$  บน  $\{1, 2, 3, 4\}$  นิยามโดย  $(x, y) \in R$  ถ้า  $x^2 \geq y$

8. ความสัมพันธ์  $R$  จากเซต  $X$  ของรัฐต่างๆ ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "M" ไปยังเซต  $Y$  ของเมืองต่างๆ นิยามโดย  $(s, C) \in X \times Y$  ถ้า  $C$  เป็นเมืองหลวงของ  $s$

ข้อ 9-12 จงวาด ไดกราฟ ของความสัมพันธ์ (draw the digraph of the relation)


9. ความสัมพันธ์ ของข้อ 4 บน  $\{a, b, c\}$




10. ความสัมพันธ์  $R = \{(1, 2), (2, 1), (3, 3), (1, 1), (2, 2)\}$  บน  $X = \{1, 2, 3\}$

11. ความสัมพันธ์  $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$  บน  $\{1, 2, 3, 4\}$

12. ความสัมพันธ์ ของข้อ 7

ในข้อ 13-16 จงเขียน ความสัมพันธ์ เป็นเซตของคู่อันดับ





17. จงหาโดเมนและพิสัยของความสัมพันธ์ แต่ละชุด ในข้อ 1-16
18. จงหาบทกลับ (converse) เป็นเซตของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์แต่ละชุด ในข้อ 1-16
- ข้อ 19-24 อ้างถึงความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  นิยามโดยกฎ  $(x, y) \in R$  ถ้า 3 หาร  $x-y$  ลงตัว
19. จงเขียนรายการสมาชิกของ  $R$
20. จงเขียนรายการสมาชิกของ  $R^{-1}$
21. จงหาโดเมนของ  $R$
22. จงหาพิสัยของ  $R$
23. จงหาโดเมนของ  $R^{-1}$
24. จงหาพิสัยของ  $R^{-1}$
25. ทำซ้ำข้อ 19-24 สำหรับความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  นิยามโดยกฎ  $(x, y) \in R$  ถ้า  $x + y \leq 6$
26. ทำซ้ำข้อ 19-24 สำหรับความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  นิยามโดยกฎ  $(x, y) \in R$  ถ้า  $x = y - 1$
27. ความสัมพันธ์ ของข้อ 25 เป็น การสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร หรือ ถ่ายทอด หรือไม่?

28. ความสัมพันธ์ ของข้อ 26 เป็น การสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร หรือ ถ่ายทอด หรือไม่?

ในข้อ 19-34 จงบอกว่าคุณสมบัติไหนบ้าง นิยามบนเซตของจำนวนเต็มบวก เป็น การสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร หรือ ถ่ายทอด หรือไม่?

29.  $(x, y) \in R$  if  $x = y^2$

30.  $(x, y) \in R$  if  $x > y$

31.  $(x, y) \in R$  if  $x \geq y$

32.  $(x, y) \in R$  if  $x = y$

33.  $(x, y) \in R$  ถ้าตัวหารร่วมมากของ  $x$  และ  $y$  คือ 1

34.  $(x, y) \in R$  ถ้า 3 หาร  $x-y$  ลงตัว

35. ให้  $X$  เป็นเซตไม่ว่าง นิยามความสัมพันธ์บน  $P(X)$  เซตกำลังของ  $X$  เป็นดังนี้

$(A, B) \in R$  ถ้า  $A \subseteq B$  ความสัมพันธ์นี้เป็น การสะท้อน สมมาตร ปฏิสมมาตร ถ่ายทอด หรือไม่?

36. ให้  $R_1$  และ  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์บน  $\{1, 2, 3, 4\}$  กำหนดโดย

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 4), (2, 2)\}$$

จงเขียนรายการสมาชิกของ  $R_1 \circ R_2$  และ  $R_2 \circ R_1$

จงยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์บน  $\{1, 2, 3, 4\}$  โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 37-41

37. การสะท้อน, สมมาตร, ไม่เป็นการถ่ายทอด

38. การสะท้อน, ไม่เป็นสมมาตร, ไม่เป็นการถ่ายทอด

39. การสะท้อน, ปฏิสมมาตร, ไม่เป็นการถ่ายทอด

40. ไม่เป็นการสะท้อน, สมมาตร, ไม่เป็นปฏิสมมาตร, ถ่ายทอด

41. ไม่เป็นการสะท้อน, ไม่เป็นสมมาตร, ถ่ายทอด

ให้  $R$  และ  $S$  เป็นความสัมพันธ์ บน  $X$  จงบอกว่าคุณสมบัติในข้อ 42-57 เป็นจริง หรือเป็นเท็จ ถ้าข้อความ เป็นเท็จ จงยกตัวอย่างประกอบ

42. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการถ่ายทอด, แล้ว  $R \cup S$  เป็นการถ่ายทอด

43. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการถ่ายทอด, แล้ว  $R \cap S$  เป็นการถ่ายทอด

44. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการถ่ายทอด, แล้ว  $R \circ S$  เป็นการถ่ายทอด

45. ถ้า  $R$  เป็นการถ่ายทอด, แล้ว  $R^{-1}$  เป็นการถ่ายทอด
46. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการสะท้อน, แล้ว  $R \cup S$  เป็นการสะท้อน
47. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการสะท้อน, แล้ว  $R \cap S$  เป็นการสะท้อน
48. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นการสะท้อน, แล้ว  $R \circ S$  เป็นการสะท้อน
49. ถ้า  $R$  เป็นการสะท้อน, แล้ว  $R^{-1}$  เป็นการสะท้อน
50. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นสมมาตร, แล้ว  $R \cup S$  เป็นสมมาตร
51. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นสมมาตร, แล้ว  $R \cap S$  เป็นสมมาตร
52. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นสมมาตร, แล้ว  $R \circ S$  เป็นสมมาตร
53. ถ้า  $R$  เป็นสมมาตร, แล้ว  $R^{-1}$  เป็นสมมาตร
54. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นปฏิสมมาตร, แล้ว  $R \cup S$  เป็นปฏิสมมาตร
55. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นปฏิสมมาตร, แล้ว  $R \cap S$  เป็นปฏิสมมาตร
56. ถ้า  $R$  และ  $S$  เป็นปฏิสมมาตร, แล้ว  $R \circ S$  เป็นปฏิสมมาตร
57. ถ้า  $R$  เป็นปฏิสมมาตร, แล้ว  $R^{-1}$  เป็นปฏิสมมาตร
58. อะไรผิด กับ ข้อโต้แย้ง ข้างล่างนี้ ซึ่งสมมติว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์  $R$  ใดๆ บน  $X$  ซึ่งเป็นสมมาตร และถ่ายทอด จะเป็นการสะท้อน ด้วย

ให้  $x \in X$  โดยใช้คุณสมบัติความสมมาตร เรามี  $(x, y)$  และ  $(y, x)$  ทั้งคู่ อยู่ใน  $R$  เนื่องจาก  $(x, y), (y, x) \in R$  โดยคุณสมบัติการถ่ายทอด เรามี  $(x, x) \in R$  ดังนั้น  $R$  เป็นการสะท้อน

## 2.5 การแทนที่ความสัมพันธ์

(Representing Relations)

มีหลายวิธี ในการแทนที่ ความสัมพันธ์ ระหว่างเซตจำกัด จากหัวข้อที่ผ่านมา วิธีหนึ่งคือ เขียนรายการ คู่อันดับ ของมัน ในหัวข้อนี้ จะได้อภิปราย ทางเลือกอีก สองวิธี สำหรับ การแทนที่ความสัมพันธ์ วิธีที่หนึ่งใช้ เมทริกซ์ ศูนย์-หนึ่ง อีกวิธีหนึ่งใช้ กราฟมีทิศทาง

การแทนที่ความสัมพันธ์ โดยใช้ เมทริกซ์

(Representing Relations using Matrices)

ความสัมพันธ์ ระหว่าง เซตจำกัด สามารถถูกแทนที่ได้ โดยใช้ เมทริกซ์ ศูนย์-หนึ่ง (zero-one matrix)

สมมติว่า  $R$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$  ไป  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  ในที่นี้ สมาชิก ของเซต  $A$  และเซต  $B$  จะมีรายชื่อ ในลำดับอย่างหนึ่ง (listed in a particular order) แต่ ลำดับนี้ จะเรียงอย่างไรก็ได้ นอกจากนี้แล้ว เมื่อ  $A = B$  เราใช้ การเรียงอันดับ เหมือนกัน สำหรับ  $A$  และ  $B$

ความสัมพันธ์  $R$  สามารถถูก แทนที่ด้วย เมทริกซ์  $M_R = [m_{ij}]$  เมื่อ

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{if } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เมทริกซ์ ศูนย์-หนึ่ง ซึ่งแทน ความสัมพันธ์  $R$  มี 1 เป็น entry ตัวที่  $(i, j)$  เมื่อ  $a_i$  สัมพันธ์กับ  $b_j$  และมี 0 ในตำแหน่งนี้ ถ้า  $a_i$  ไม่สัมพันธ์กับ  $b_j$

การแทนที่ เช่นนี้ ขึ้นอยู่กับ การเรียงอันดับ ที่ใช้สำหรับ  $A$  และ  $B$  (Such a representation depends on the orderings used for  $A$  and  $B$ .)

ตัวอย่าง ให้  $A = \{1, 2, 3\}$  และ  $B = \{1, 2\}$

$R$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $A$  ไป  $B$  ประกอบด้วย คู่อันดับ  $(a, b)$  ถ้า  $a \in A, b \in B$  และ  $a > b$  จงหาเมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์  $R$  ถ้า  $a_1 = 1, a_2 = 2$  และ  $a_3 = 3$  ส่วน  $b_1 = 1$  และ  $b_2 = 2$





ความสัมพันธ์  $R$  เป็นสมมาตร ถ้า  $(a, b) \in R$  แสดงว่า  $(b, a) \in R$  เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์  $R$  บนเซต  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  จะเป็นสมมาตร ก็ต่อเมื่อ  $(a_j, a_i) \in R$  ใด ๆ ที่  $(a_i, a_j) \in R$  ในทอม สมาชิกของ  $M_R$ ,  $R$  จะเป็นสมมาตรก็ต่อเมื่อ ถ้า  $m_{ji} = 1$  ใด ๆ ที่  $m_{ij} = 1$  สิ่งนี้ หมายความว่า  $m_{ji} = 0$  เมื่อใดก็ตามที่  $m_{ij} = 0$  เพราะฉะนั้น  $R$  เป็นสมมาตร ก็ต่อเมื่อ  $m_{ij} = m_{ji}$  สำหรับ ทุกคู่ ของ จำนวนเต็ม  $i$  และ  $j$  โดยที่  $i = 1, 2, \dots, n$  และ  $j = 1, 2, \dots, n$  จากบทนิยาม ของ การสลับเปลี่ยน (transpose) ของเมทริกซ์ จะเห็นว่า  $R$  เป็นสมมาตร ก็ต่อเมื่อ

$$M_R = (M_R)^t$$

นั่นคือ ถ้า  $M_R$  เป็นเมทริกซ์สมมาตร รูปแบบของเมทริกซ์ สำหรับ ความสัมพันธ์ คือ รูป 2 (a)

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

(a) สมมาตร

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

(b) ปฏิสมมาตร

รูป 2 เมทริกซ์ ศูนย์-หนึ่ง สำหรับ ความสัมพันธ์ สมมาตร และปฏิสมมาตร

ความสัมพันธ์  $R$  เป็นปฏิสมมาตร ก็ต่อเมื่อ ถ้า  $(a, b) \in R$  และ  $(b, a) \in R$  แสดงว่า  $a = b$  เพราะฉะนั้น เมทริกซ์ของ ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร มีคุณสมบัติว่า ถ้า  $m_{ij} = 1$  โดยที่  $i \neq j$  แล้ว  $m_{ji} = 0$  หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อ  $i \neq j$ ,  $m_{ij} = 0$  หรือ  $m_{ji} = 0$  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นศูนย์ ทั้งคู่ รูปแบบของเมทริกซ์ สำหรับ ความสัมพันธ์ปฏิสมมาตร ดูรูป 2 (b)

ตัวอย่าง ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ บนเซต ซึ่งแทนด้วย เมทริกซ์

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$R$  เป็นความสัมพันธ์ ชนิดใด?

**ผลเฉลย**

$R$  เป็นการสะท้อน เพราะว่าสมาชิกทุกตัวบนเส้นทแยงมุมหลัก เท่ากับ 1

$R$  เป็นสมมาตร เพราะว่า  $M_R$  เป็นเมทริกซ์สมมาตร

$R$  ไม่ใช่ปฏิสมมาตร

เมทริกซ์ ที่แทน ผลบวก ของ ความสัมพันธ์  $R_1$  และ  $R_2$  จะมี 1 ในตำแหน่ง  
ที่  $M_{R_1}$  มี 1 หรือ  $M_{R_2}$  มี 1 หรือ มี 1 ทั้งคู่

เมทริกซ์ ซึ่ง แทนผลตัด ของ ความสัมพันธ์  $R_1$  และ  $R_2$  จะมี 1 ในตำแหน่ง  $M_{R_1}$   
และ  $M_{R_2}$  ทั้งคู่

เพราะฉะนั้น จากการดำเนินการแบบบูล (Boolean operations)

join และ meet :

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$$

และ

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$$

ตัวอย่าง ให้  $R_1$  และ  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์ บนเซต  $A$  ถูกแทนด้วยเมทริกซ์

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

จงหา เมทริกซ์ ซึ่ง แทนความสัมพันธ์  $R_1 \cup R_2$  และ  $R_1 \cap R_2$

ผลเฉลย เมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ เหล่านี้คือ

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ต่อไป ต้องการหา เมทริกซ์ สำหรับ ผลประกอบของ ความสัมพันธ์  
เมทริกซ์นี้ สามารถหาได้ โดยใช้ ผลคูณแบบบูล ((Boolean product) ของเมทริกซ์ สำหรับ  
ความสัมพันธ์เหล่านี้

ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ จากเซต  $A$  ไป  $B$  และ  $S$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $B$  ไป  $C$   
สมมติว่า เซต  $A, B$  และ  $C$  มีสมาชิก  $m, p$  และ  $n$  ตัว ตามลำดับ คู่อันดับ  $(a_i, c_j)$  จะอยู่ใน  
 $S \circ R$  ก็ต่อเมื่อ มีสมาชิก  $b_k$  โดยที่  $(a_i, b_k)$  อยู่ใน  $R$  และ คู่อันดับ  $(b_k, c_j)$  อยู่ใน  $S$  จะ  
ได้ว่า  $t_{ij} = 1$  ก็ต่อเมื่อ  $r_{ik} = s_{kj} = 1$  สำหรับ  $k$  บางตัว จากบทนิยามของผลคูณแบบบูล  
สิ่งนี้ หมายความว่า

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$$

ตัวอย่าง จงหาเมทริกซ์ ซึ่งแทนความสัมพันธ์  $S \circ R$  เมื่อ เมทริกซ์ แทนความสัมพันธ์  $R$   
และ  $S$  เป็นดังนี้

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad M_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ผลเฉลย เมทริกซ์ สำหรับ  $S \circ R$  คือ

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เมทริกซ์ ซึ่งแทน ผลประกอบของความสัมพันธ์ สองชุด สามารถนำมาใช้ หา เมทริกซ์  
สำหรับ  $M_R^n$  โดยเฉพาะ

$$M_{R^n} = M_R^{[n]}$$

ตัวอย่าง จงหา เมทริกซ์ ซึ่งแทนความสัมพันธ์  $R^2$  เมื่อเมทริกซ์ ซึ่งแทน  $R$  คือ

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ผลเฉลย เมทริกซ์ สำหรับ  $R^2$  คือ

$$M_{R^2} = M_R^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

การคูณเมทริกซ์ สัมพันธ์กับ ผลประกอบของความสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ให้  $R_1$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b\}$  นิยามดังนี้

$$R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

และให้  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $Y$  ไป  $Z = \{x, y, z\}$  นิยามดังนี้

$$R_2 = \{(a, x), (a, y), (b, y), (b, z)\}$$

เมทริกซ์ ของ  $R_1$  สัมพันธ์กับ การเรียงอันดับ 1, 2, 3 และ a, b ได้แก่

$$A_1 = \begin{matrix} & a & b \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

และเมทริกซ์  $R_2$  สัมพันธ์กับ การเรียงอันดับ a, b และ x, y, z คือ

$$A_2 = \begin{matrix} & x & y & z \\ \begin{matrix} a \\ b \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

ผลคูณ (product) ของเมทริกซ์สองชุดนี้คือ

$$A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1+0 & 1+0 & 0+0 \\ 0+0 & 0+1 & 0+1 \\ 1+0 & 1+1 & 0+1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

การตีความหมายของผลคูณนี้ (Let us interpret this product) สมาชิกตัวที่  $ik$  ใน  $A_1 A_2$  จำนวนจาก

$$i \begin{bmatrix} a & b \\ s & t \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \end{matrix} = su + tv$$

ถ้าค่านี้ ไม่เป็นศูนย์ (is nonzero) แสดงว่า  $su$  หรือ  $tv$  ไม่ใช่ค่าศูนย์ สมมติว่า  $su \neq 0$  แสดงว่า  $s \neq 0$  และ  $u \neq 0$  สิ่งนี้ หมายความว่า  $(i, a) \in R_1$  และ  $(a, k) \in R_2$  โดยนัยคือ  $(i, k) \in R_2 \circ R_1$  แสดงว่า ถ้าสมาชิกตัวที่  $ik$  ใน  $A_1 A_2$  ไม่ใช่ค่าศูนย์, แล้ว  $(i, k) \in R_2 \circ R_1$  การย้อนกลับ เป็นจริงด้วยเช่นกัน

### ทฤษฎีบท

ให้  $R_1$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $X$  ไป  $Y$  และให้  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์ จาก  $Y$  ไป  $Z$  เลือกการเลือกอันดับ ของ  $X, Y$  และ  $Z$  เมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ ทุกชุด เกี่ยวข้องกับการเรียงอันดับเหล่านี้

ให้  $A_1$  เป็น เมทริกซ์ ของ  $R_1$  และให้  $A_2$  เป็น เมทริกซ์ ของ  $R_2$  เมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์  $R_2 \circ R_1$  ได้จากการ แทนที่ แต่ละเทอม ซึ่ง ไม่ใช่ค่าศูนย์ ใน ผลคูณ  $A_1 A_2$  ด้วย 1

(Let  $A_1$  be the matrix of  $R_1$  and let  $A_2$  be the matrix of  $R_2$ . The matrix of the relation  $R_2 \circ R_1$  is obtained by replacing each nonzero term in the matrix product  $A_1 A_2$  by 1.)<sup>L</sup>

---

<sup>L</sup> Johnsonbaugh หน้า 107

## การแทนความสัมพันธ์ โดยใช้ ไดกราฟ


(Representing Relations using Digraphs)

จากที่ได้เห็นแล้วว่า ความสัมพันธ์ สามารถแทนด้วย รายการของ คู่อันดับ ทั้งหมด ของ มัน หรือ โดยใช้ เมทริกซ์ ศูนย์-หนึ่ง อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญ ของการแทนที่ ความสัมพันธ์ ใช้การ แทนที่ด้วยรูปภาพ สมาชิกแต่ละตัวของเซต แทนด้วย หนึ่งจุด (point) คู่อันดับแต่ละคู่ แทนที่ โดยการ ใช้ หนึ่งเส้น (arc) ทิศทางของมัน เป็นลูกศร เมื่อเราใช้ การแทนที่ด้วยภาพ ความสัมพันธ์ บนเซตจำกัด จะเป็นกราฟมีทิศทาง หรือ ไดกราฟ (directed graphs or digraphs)

**บทนิยาม** กราฟมีทิศทาง หรือ ไดกราฟ ประกอบด้วย เซต  $V$  ของจุด (vertices) หรือ โหนด (nodes) รวมกับ เซต  $E$  ของคู่อันดับ ของ สมาชิก ของ  $V$  เรียกว่า ด้าน (edges หรือ arcs) จุด  $a$  เรียกว่า จุดแรก (initial vertex) ของเส้น  $(a, b)$  และ จุด  $b$  เรียกว่า จุดปลาย (terminal vertex) ของด้านนี้

ด้านของรูปแบบ  $(a, a)$  ถูกแทนที่ โดยใช้ หนึ่งเส้น จากจุด  $a$  กลับไปยังตัวมันเอง ด้าน เช่นนี้ เรียกว่า รูปบ่วง (loop)

**ตัวอย่าง** กราฟมีทิศทาง ของจุด  $a, b, c$  และ  $d$  และด้านต่างๆ  $(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d)$  และ  $(d, b)$  แสดงด้วยรูปที่ 3




รูปที่ 3

โปรดสังเกตว่า ความสัมพันธ์ จากเซต  $A$  ไปยัง เซต  $B$  ไม่สามารถแทนด้วย กราฟมีทิศทางได้ ยกเว้น  $A = B$


**ตัวอย่าง** กราฟมีทิศทางของความสัมพันธ์

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\} \text{ บนเซต } \{1, 2, 3, 4\}$$



รูปที่ 4

ตัวอย่าง จงหา คู่อันดับทั้งหมด ในความสัมพันธ์ R ซึ่งแทนด้วย กราฟมีทิศทาง ในรูปที่ 5




รูปที่ 5

ผลเฉลย


คู่อันดับ  $(x, y)$  ในความสัมพันธ์ คือ

$$R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 3)\}$$

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ซึ่งแทนด้วย ไดกราฟ รูปที่ 6 เป็นชนิดใดบ้าง?



a) ไดกราฟ ของ R



(b) ไดกราฟ ของ S

รูปที่ 6

ผลเฉลย

R เป็นการสะท้อน, ไม่ใช่สมมาตร, ไม่ใช่ปฏิสมมาตร, ไม่ใช่ถ่ายทอด

S ไม่ใช่การสะท้อน, เป็นสมมาตร, ไม่ใช่ปฏิสมมาตร, ไม่ใช่ถ่ายทอด


ถ้า R เป็นความสัมพันธ์ บนเซต A และ  $a \in A$  แล้ว อินดีกรี (in-degree) ของ a หมายถึง จำนวนของ  $b \in A$  โดยที่ คู่อันดับ  $(b, a) \in R$  ส่วน เอ้าดีกรี (out-degree) ของ a หมายถึง จำนวนของ  $b \in A$  โดยที่ คู่อันดับ  $(a, b) \in R$

ตัวอย่าง ให้  $A = \{a, b, c, d\}$  และ R เป็นความสัมพันธ์ บน A ซึ่งมีเมทริกซ์

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

จงสร้าง ไดกราฟ ของ R และเขียนรายการ in-degrees และ out-degrees ของทุกจุด

ผลเฉลย



	a	b	c	d
in-degree	2	3	1	1
out-degree	1	1	3	2



### แบบฝึกหัดเสริม

ในแบบฝึกหัดข้อ 1-3 จงหาเมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ R จาก X ไป Y สัมพันธ์ กับ การเรียงอันดับที่กำหนดให้

1.  $R = \{(1, \delta), (2, \alpha), (2, \Sigma), (3, \beta), (3, \Sigma)\}$

การเรียงอันดับ ของ X : 1, 2, 3

การเรียงอันดับ ของ Y :  $\alpha, \beta, \Sigma, \delta$

2. R เหมือนกับ ข้อ 1

การเรียงอันดับ ของ X : 3, 2, 1

การเรียงอันดับ ของ Y :  $\Sigma, \beta, \alpha, \delta$

3.  $R = \{(x, a), (x, c), (y, a), (y, b), (z, d)\}$

การเรียงอันดับ ของ X : x, y, z

การเรียงอันดับ ของ Y : a, b, c, d

ในแบบฝึกหัดข้อ 4-6 จงหาเมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ R บน X สัมพันธ์กับ การเรียงอันดับที่กำหนดให้

4.  $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$

การเรียงอันดับของ X : 1, 2, 3, 4, 5

5. R เหมือนกับ ข้อ 4

การเรียงอันดับของ X : 5, 3, 1, 2, 4

6.  $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

การเรียงอันดับของ X : 1, 2, 3, 4

ในแบบฝึกหัดข้อ 7-9 จงเขียน ความสัมพันธ์ R เป็นเซตของคู่อันดับ, กำหนดโดยเมทริกซ์ข้างล่างนี้

7.

	w	x	y	z
a	1	0	1	0
b	0	0	0	0
c	0	0	1	0
d	1	1	1	1

8. 
$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

9. 
$$\begin{matrix} & w & x & y & z \\ \begin{matrix} w \\ x \\ y \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

10. How can we quickly determine whether a relation R is antisymmetric by examine the matrix of R (relative to same ordering)?
11. จงบอกว่า ความสัมพันธ์ ของ แบบฝึกหัดข้อ 9 เป็นการสะท้อน, สมมาตร, ถ่ายทอด, ปฏิสมมาตร, อันดับบางส่วน, และ/หรือ ความสัมพันธ์สมมูล หรือไม่?
12. กำหนดเมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ R จาก X ไป Y ให้ เราสามารถ หา เมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ ผกผัน  $R^{-1}$  ได้อย่างไร?
13. จงหาเมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์ ผกผัน ของ แบบฝึกหัดข้อ 7 และ ข้อ 8

ในแบบฝึกหัดข้อ 14-16, จงหา

- (a) เมทริกซ์  $A_1$  ของความสัมพันธ์  $R_1$  (สัมพันธ์กับการเรียงอันดับที่กำหนดให้)
- (b) เมทริกซ์  $A_2$  ของความสัมพันธ์  $R_2$  (สัมพันธ์กับการเรียงอันดับที่กำหนดให้)
- (c) เมทริกซ์ผลคูณ  $A_1 A_2$
- (d) จงใช้ ผลลัพธ์ ของ ข้อ (c) หา เมทริกซ์ ของ ความสัมพันธ์  $R_2 \circ R_1$
- (e) จงใช้ ผลลัพธ์ ของ ข้อ (d) หา ความสัมพันธ์  $R_2 \circ R_1$  (เป็นเซตของคู่อันดับ)
14.  $R_1 = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$   
 $R_2 = \{(x, b), (y, b), (y, a), (y, c)\}$   
 การเรียงอันดับ : 1, 2, 3 ; x, y ; a, b, c
15.  $R_1 = \{(x, y) \mid x \text{ divides } y\}$  ;  $R_1$  is from X to Y  
 $R_2 = \{(y, z) \mid y > z\}$  ;  $R_2$  is from Y to Z  
 การเรียงอันดับของ X และ Y : 2, 3, 4, 5  
 การเรียงอันดับของ Z : 1, 2, 3, 4

16.  $R_1 = \{(x, y) \mid x + y \leq 6\}$  ;  $R_1$  is from  $X$  to  $Y$

$R_2 = \{(y, z) \mid y = z + 1\}$  ;  $R_2$  is from  $Y$  to  $Z$

การเรียงอันดับของ  $X, Y$  และ  $Z$  : 1, 2, 3, 4, 5

## แบบฝึกหัด 2.5

- จงแทน ความสัมพันธ์ บน  $\{1, 2, 3\}$  ข้างล่างนี้ ด้วยเมทริกซ์ (ให้สมาชิกของเซตนี้ เรียงลำดับ จากน้อยไปหามาก)
  - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$
  - $\{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
  - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
  - $\{(1, 3), (3, 1)\}$

- จงเขียนรายการ คู่อันดับ ในความสัมพันธ์ บน  $\{1, 2, 3\}$  สมัยกับ เมทริกซ์ต่อไปนี้ (เมื่อแถว และสดมภ์ สมัยกับ จำนวนเต็ม เรียงลำดับจาก น้อยไปหามาก)

a) 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) 
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

c) 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ แทนด้วยเมทริกซ์

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

จงหา เมทริกซ์ ซึ่ง แทน

- a)  $R^{-1}$                       b)  $\bar{R}$                       c)  $R^2$

- ให้  $R_1$  และ  $R_2$  เป็นความสัมพันธ์ บนเซต  $A$  แทนด้วยเมทริกซ์

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

จงหาเมทริกซ์ ซึ่งแทน

- a)  $R_1 \cup R_2$                       b)  $R_1 \cap R_2$                       c)  $R_2 \circ R_1$   
 d)  $R_1 \circ R_1$                       e)  $R_1 \oplus R_2$

5. ให้  $R$  เป็นความสัมพันธ์ แทนด้วย เมทริกซ์

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

จงหาเมทริกซ์ ซึ่งแทน

- a)  $R^2$                       b)  $R^3$                       c)  $R^4$

6. จงวาดรูป กราฟมีทิศทาง แทนความสัมพันธ์ แต่ละชุด ในข้อ 1


7. จงวาดรูป กราฟมีทิศทาง แทนความสัมพันธ์ แต่ละชุด ในข้อ 2

8. จงวาดรูป กราฟมีทิศทาง ซึ่งแทนความสัมพันธ์


$\{(a, a), (a, b), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b)\}$

ในแบบฝึกหัดข้อ 9-11 จงเขียนรายการคู่อันดับ ใน ความสัมพันธ์ ซึ่ง แทนด้วยกราฟมีทิศทาง


9.



10.



11.




12. ความสัมพันธ์ ซึ่ง แทนด้วย กราฟมีทิศทาง ในแบบฝึกหัดข้อ 9-11 เป็นความสัมพันธ์ ชนิดใดบ้าง?

---

## 2.6 ฟังก์ชัน (Functions)

ในหลายกรณี เรากำหนดค่าให้สมาชิกแต่ละตัวของเซตด้วยสมาชิกใดโดยเฉพาะของเซตที่สอง (ซึ่งอาจจะเป็นเซตเดียวกับชุดแรก) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแต่ละคน ในชั้นเรียน โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง มีการกำหนดเกรดเป็นตัวอักษร จากเซต {A, B, C, D, E, F} เช่น อนันต์ ได้เกรด A, มาลี ได้เกรด C, นฤมล ได้เกรด B, ประชา ได้เกรด A และ สมศรี ได้เกรด F การกำหนดค่าของเกรดแสดงให้เห็นในรูป 1



รูป 1 การกำหนดเกรด ในชั้นเรียนโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

การกำหนดค่านี้ เป็นตัวอย่างของฟังก์ชัน แนวคิดของฟังก์ชันมีความสำคัญมากใน โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันนำไปใช้ในบทนิยามของโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง เช่น ลำดับ (sequences) และสายอักขระ (strings) ฟังก์ชันยังนำไปใช้ในการแทน เวลารานเพียงใดที่ให้ คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ซึ่งมีขนาดอินพุตเท่าที่กำหนดให้ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด ซึ่งเป็นฟังก์ชัน นิยามในเทอมของตัวเอง ใช้ในสาขาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับฟังก์ชันที่จำเป็นในคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

ฟังก์ชัน  $f$  จากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  ใช้สัญลักษณ์  $f: A \rightarrow B$  หมายถึงความสัมพันธ์ หนึ่ง จาก  $A$  ไป  $B$  มีคุณสมบัติดังนี้

- โดเมนของ  $f$  คือเซต  $A$
- ถ้าคู่อันดับ  $(a, b)$  และ  $(a, c) \in R$  แล้ว  $b = c$

บทนิยาม 1 ให้  $A$  และ  $B$  เป็นเซต ฟังก์ชัน  $f$  จาก  $A$  ไป  $B$  หมายถึงการกำหนดค่า ของสมาชิก เพียงค่าเดียว ของ  $B$  ให้กับสมาชิกแต่ละตัวของ  $A$  เราเขียน  $f(a) = b$  ถ้า  $b$  เป็นสมาชิกเพียง ค่าเดียว ของ  $B$  กำหนดโดยฟังก์ชัน  $f$  ให้กับสมาชิก  $a$  ของ  $A$  ถ้า  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $A$  ไป

B เราเขียน  $f: A \rightarrow B$

(Let A and B be sets. A function f from A to B is an assignment of a unique element of B to each element of A. We write  $f(a) = b$  if b is the unique element of B assigned by the function f to the element a of A. If f is a function from A to B, we write  $f: A \rightarrow B$ )

ฟังก์ชัน มีการกำหนดในหลายวิธีที่แตกต่างกัน บางครั้ง กำหนดอย่างชัดเจน บ่อยครั้งให้เป็นสูตร เช่น  $f(x) = x + 1$  ในกรณีนิยามฟังก์ชัน หลายครั้งเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดฟังก์ชัน

ตัวอย่าง 1.1 ความสัมพันธ์

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$$

จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c\}$  เป็นฟังก์ชันจาก X ไป Y

โดเมนของ f คือ  $\{1, 2, 3\}$  และพิสัยของ f คือ  $\{a, b\}$

ตัวอย่าง 1.2 ความสัมพันธ์

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, c), (1, b)\}$$

จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c\}$  ไม่ใช่ฟังก์ชัน เพราะว่าขาดคุณสมบัติข้อ 2 ตัวอย่างข้อนี้ มีคู่อันดับ  $(1, a)$  และ  $(1, b)$  อยู่ใน R แต่  $a \neq b$

**บทนิยาม 2** ถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เราพูดว่า A เป็น โดเมน (domain) ของ f และ B เป็น โคโดเมน (codomain) ของ f, ถ้า  $f(a) = b$  เราพูดว่า b เป็น อิมเมจ (image) ของ a และ a เป็น พี-อิมเมจ (pre-image) ของ b, พิสัย (range) ของ f หมายถึง เซตของอิมเมจทั้งหมดของสมาชิกของ A ถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เราพูดว่า f ส่ง A ไป B

(If f is a function from A to B, we say that A is domain of f and B is the codomain of f.

If  $f(a) = b$ , we say that b is the image of a and a is a pre-image of b. The range of f is the set of all images of elements of A. Also, if f is a function from A to B, we say that f maps A to B.)

รูป 2 แทนฟังก์ชัน f จาก A ไป B

จงพิจารณาตัวอย่างแรกของหัวข้อนี้ ให้ G เป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดเกรดให้กับนักศึกษา ในชั้นเรียนโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง โปรดสังเกตว่า  $G(\text{อนันต์}) = A$




โดเมนของ  $G$  คือเซต {อนันต์, มาลี, นฤมล, ประชา, สมศรี}

โคโดเมนของ  $G$  คือเซต {A, B, C, D, F}

พิสัยของ  $G$  คือเซต {A, B, C, F} เพราะว่า มีนักศึกษาซึ่งมีการกำหนดแต่ละเกรดให้ ยกเว้นเกรด D

ตัวอย่าง 1 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง กำหนดค่า 2 บิตสุดท้ายของสายบิต (bit string) ของความยาว 2 หรือมากกว่าให้กับสายอักขระนั้น ดังนั้น โดเมนของ  $f$  คือ เซตของสายบิตทั้งหมดของความยาว 2 หรือมากกว่า และ โคโดเมนและพิสัย ทั้งคู่คือเซต {00, 01, 10, 11}

ตัวอย่าง 2 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $Z$  ไป  $Z$  กำหนดค่ากำลังสองของจำนวนเต็มให้กับจำนวนเต็มนี้ ดังนั้น  $f(x) = x^2$  เมื่อ โดเมนของ  $f$  คือเซตของ จำนวนเต็มทั้งหมด, โคโดเมนของ  $f$  ถูกเลือกให้เป็นเซตของจำนวนเต็มทั้งหมด และพิสัยของ  $f$  คือเซตของจำนวนเต็ม ไม่เป็นค่าลบทั้งหมด คือกำลังสองสมบูรณ์ ได้แก่ {0, 1, 4, 9, ...}



รูป 2 ฟังก์ชัน  $f$  ส่ง  $A$  ไป  $B$

ตัวอย่าง 3 โดเมน และ โคโดเมน ของฟังก์ชัน บ่อยครั้ง กำหนดในภาษาโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คำสั่งของ Pascal

**function** floor( $x$  : real) : integer

กำหนดว่า โดเมนของฟังก์ชัน floor คือเซตของจำนวนจริง และ โคโดเมนของมันคือเซตของจำนวนเต็ม

ฟังก์ชันค่าจริง 2 ชุด ซึ่งมีโดเมนชุดเดียวกันสามารถบวกกันและคูณกันได้

บทนิยาม 3 ให้  $f_1$  และ  $f_2$  เป็นฟังก์ชันจาก  $A$  ไป  $R$  แล้ว  $f_1 + f_2$  และ  $f_1 f_2$  เป็นฟังก์ชันจาก  $A$  ไป  $R$  นิยามโดย

$$(f_1 + f_2)x = f_1(x) + f_2(x)$$

$$f_1 f_2(x) = f_1(x) f_2(x)$$

(Let  $f_1$  and  $f_2$  be functions from  $A$  to  $\mathbb{R}$ . Then  $f_1 + f_2$  and  $f_1 f_2$  are also functions from  $A$  to  $\mathbb{R}$  defined by

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$f_1 f_2(x) = f_1(x) f_2(x)$$

โปรดสังเกตว่า ฟังก์ชัน  $f_1 + f_2$  และ  $f_1 f_2$  นิยามโดยกำหนดค่าของมันที่  $x$  ในเทอมของค่าของ  $f_1$  และ  $f_2$  ที่  $x$

**ตัวอย่าง 4** ให้  $f_1$  และ  $f_2$  เป็นฟังก์ชันจาก  $\mathbb{R}$  ไป  $\mathbb{R}$  โดยที่  $f_1(x) = x^2$  และ  $f_2(x) = x - x^2$  จงคำนวณหาฟังก์ชัน  $f_1 + f_2$  และ  $f_1 f_2$

**ผลเฉลย** จากคำจำกัดความ ของผลบวกและผลคูณของฟังก์ชัน จะได้ว่า

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^2 + (x - x^2) = x$$

และ

$$f_1 f_2(x) = f_1(x) f_2(x) = x^2(x - x^2) = x^3 - x^4$$

เมื่อ  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $A$  ไปเซต  $B$ , อิมเททของเซตย่อยของ  $A$  สามารถนิยามได้

**บทนิยาม 4** ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  และให้  $S$  เป็นเซตย่อยของ  $A$ , อิมเททของ  $S$  คือเซตย่อยของ  $B$  ซึ่งประกอบด้วย อิมเททของสมาชิกของ  $S$  เราใช้สัญลักษณ์ อิมเททของ  $S$  โดย  $f(S)$  ดังนี้

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

(Let  $f$  be a function from the set  $A$  to the set  $B$  and let  $S$  be a subset of  $A$ . The image of  $S$  is the subset of  $B$  that consists of the images of the elements of  $S$ . We denote the image of  $S$  by  $f(S)$ , so that

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

**ตัวอย่าง 5** ให้  $A = \{a, b, c, d, e\}$  และ  $B = \{1, 2, 3, 4\}$  โดยที่  $f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 4, f(d) = 1$  และ  $f(e) = 1$  อิมเททของ เซตย่อย  $S = \{b, c, d\}$  คือเซต  $f(S) = \{1, 4\}$

## ฟังก์ชัน หนึ่งต่อหนึ่ง และฟังก์ชันไปทั่วถึง

(One-to-one and onto functions)

บางฟังก์ชัน มีอิมเมทแตกต่างกัน ที่ สมาชิกแตกต่างกันของโดเมนของมัน ฟังก์ชันเหล่านี้ เรียกว่า หนึ่งต่อหนึ่ง

**บทนิยาม 5** ฟังก์ชัน  $f$  เรียกว่า หนึ่งต่อหนึ่ง หรือ injective ก็ต่อเมื่อ  $f(x) = f(y)$  โดยนัย  $x = y$  สำหรับทุกค่า  $x$  และ  $y$  ในโดเมนของ  $f$  ฟังก์ชันจะเรียกว่า injection ถ้ามันเป็น หนึ่งต่อหนึ่ง

(A function  $f$  is said to be one-to-one, or injective, if and only if  $f(x) = f(y)$  implies that  $x = y$  for all  $x$  and  $y$  in the domain of  $f$ . A function is said to be an injection if it is one-to-one.)

**หมายเหตุ** ฟังก์ชัน  $f$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ  $f(x) \neq f(y)$  ตราบใดที่  $x \neq y$  การแสดงเช่นนี้  $f$  เป็น หนึ่งต่อหนึ่ง ได้มาจาก เอา ข้อความแย้งกลับที่ ของ การวางโดยนัย ในคำจำกัดความ

**ตัวอย่าง 6** จงบอกว่า ฟังก์ชัน  $f$  จาก  $\{a, b, c, d\}$  ไป  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  ด้วย  $f(a) = 4, f(b) = 5, f(c) = 1$  และ  $f(d) = 3$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่?

**ผลเฉลย** ฟังก์ชัน  $f$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เพราะว่า  $f$  อยู่บนค่าแตกต่างกัน ที่ สมาชิก 4 ตัวของโดเมนของมัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นในรูป 3


**ตัวอย่าง 7** จงบอกว่า ฟังก์ชัน  $f(x) = x^2$  จาก เซตของจำนวนเต็ม ไปเซตของจำนวนเต็ม เป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่?

**ผลเฉลย** ฟังก์ชัน  $f(x) = x^2$  ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  $f(1) = f(-1) = 1$  แต่  $1 \neq -1$

**ตัวอย่าง 8** จงบอกว่า ฟังก์ชัน  $f(x) = x + 1$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่?

**ผลเฉลย** ฟังก์ชัน  $f(x) = x + 1$  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง การแสดงตัวอย่างให้เห็น โปรดสังเกตว่า  $x + 1 \neq y + 1$  เมื่อ  $x \neq y$

ขณะนี้ เราให้เงื่อนไขบางอย่างซึ่งรับประกันว่า ฟังก์ชันเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง



รูป 3 ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

**บทนิยาม 6** ฟังก์ชัน  $f$  ซึ่งมีโดเมน และ โคโดเมน เป็นเซตย่อย ของเซตของจำนวนจริง เรียกว่า **เพิ่มโดยแท้** ถ้า  $f(x) < f(y)$  ตรีบาใดที่  $x < y$  และ  $x$  และ  $y$  อยู่ในโดเมนของ  $f$  ในทำนองเดียวกัน  $f$  เรียกว่า **ลดโดยแท้** ถ้า  $f(x) > f(y)$  ตรีบาใดที่  $x < y$  และ  $x$  และ  $y$  อยู่ในโดเมนของ  $f$

(A function  $f$  whose domain and codomain are subsets of the set of real numbers is called **strictly increasing** if  $f(x) < f(y)$  whenever  $x < y$  and  $x$  and  $y$  are in the domain of  $f$ .

Similarly,  $f$  is called **strictly decreasing** if  $f(x) > f(y)$  whenever  $x < y$  and  $a$  and  $y$  are the domain of  $f$ .)

จากคำจำกัดความนี้ จะเห็นว่า ฟังก์ชัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น เพิ่มโดยแท้ หรือ ลดโดยแท้ ต้องเป็น หนึ่งต่อหนึ่ง

บางฟังก์ชัน พิสัยและโคโดเมนเท่ากัน นั่นคือ สมาชิกทุกตัวของโคโดเมน เป็นอิมเทท ของสมาชิกบางตัวของโดเมน ฟังก์ชัน ซึ่งมีคุณสมบัตินี้ เรียกว่า ฟังก์ชันไปทั่วถึง

**บทนิยาม 7** ฟังก์ชัน  $f$  จาก  $A$  ไป  $B$  เรียกว่า **ไปทั่วถึง** หรือ **surjective** ก็ต่อเมื่อ สำหรับ สมาชิกทุกตัว  $b \in B$  มีสมาชิกหนึ่งตัว  $a \in A$  ด้วย  $f(a) = b$  ฟังก์ชัน  $f$  เรียกว่า **surjection** ถ้ามันเป็น **ไปทั่วถึง**

(A function  $f$  from  $A$  to  $B$  is called **onto**, or **surjective**, if and only if for every element  $b \in B$  there is an element  $a \in A$  with  $f(a) = b$ . A function  $f$  is called a **surjection** if it is onto.)


ตัวอย่าง 9 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $\{a, b, c, d\}$  ไป  $\{1, 2, 3\}$  นิยามโดย  $f(a) = 3, f(b) = 2, f(c) = 1$  และ  $f(d) = 3$  ถามว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันไปทั่วถึงหรือไม่?

ผลเฉลย เนื่องจากสมาชิกทั้งหมด 3 ตัว ของโคโดเมน เป็นอิมเมทของสมาชิก ในโดเมน ฟังก์ชัน  $f$  จึงเป็นไปทั่วถึง สิ่งนี้แสดงให้เห็นในรูป 4

ตัวอย่าง 9.1 ฟังก์ชัน

$$f = \{(1, a), (2, c), (3, b)\}$$

จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c\}$  เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และไปทั่วถึง  $Y$



รูป 4 ฟังก์ชันไปทั่วถึง

ตัวอย่าง 10 ฟังก์ชัน  $f(x) = x^2$  จากเซตของจำนวนเต็ม ไปเซตของจำนวนเต็ม เป็น ไปทั่วถึงหรือไม่?

ผลเฉลย ฟังก์ชัน  $f$  ไม่เป็น ไปทั่วถึง เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม  $x$  ด้วย  $x^2 = -1$  เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่าง 11 ฟังก์ชัน  $f(x) = x + 1$  จากเซตของจำนวนเต็มไปเซตของจำนวนเต็ม เป็น ไปทั่วถึง หรือไม่?

ผลเฉลย ฟังก์ชันนี้เป็น ไปทั่วถึง เพราะสำหรับจำนวนเต็มทุกตัว มี จำนวนเต็ม  $x$  โดยที่  $f(x) = y$  โปรดสังเกตว่า  $f(x) = y$  ก็ต่อเมื่อ  $x + 1 = y$  เป็นจริงก็ต่อเมื่อ  $x = y - 1$

บทนิยาม 8 ฟังก์ชัน  $f$  เป็น หนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึง หรือ bijection ถ้ามันเป็น หนึ่งต่อหนึ่ง และไปทั่วถึง ทั้งคู่




(The function  $f$  is a one-to-one correspondence or a bijection if it is both one-to-one and onto.)

ตัวอย่าง 12 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $\{a, b, c, d\}$  ไป  $\{1, 2, 3, 4\}$  ด้วย  $f(a) = 4, f(b) = 2, f(c) = 1$  และ  $f(d) = 3$  ถามว่า  $f$  เป็น bijection หรือไม่?


เฉลย ฟังก์ชัน  $f$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง และ ไปทั่วถึง มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เพราะว่าฟังก์ชันมันรับเอาค่าแตกต่างกัน มันเป็นไปทั่วถึง เพราะว่าสมาชิกทั้งหมด 4 ตัวของโคโดเมนเป็นอิมเมทของสมาชิกในโดเมน ดังนั้น  $f$  เป็น bijection

รูป 5 แสดงให้เห็นฟังก์ชัน 4 แบบ ชุดแรกเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปทั่วถึง, ชุดที่สองเป็นแบบไปทั่วถึงแต่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่ง, ชุดที่สาม เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งและไปทั่วถึง ทั้งคู่, ชุดที่สี่ ไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่งและไม่ใช่ไปทั่วถึง ชุดที่ห้า ไม่ใช่ฟังก์ชัน เพราะว่ามันส่งสมาชิกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกแตกต่างกันสองตัว


(a) One-to-one, not onto      (b) Onto, not one-to-one      (c) One-to-one and onto



(d) Neither one-to-one nor onto



(e) Not a function



รูป 5 ตัวอย่างชนิดต่างๆ ของการสมนัย

ตัวอย่าง 13 ให้  $A$  เป็นเซต, ฟังก์ชันเอกลักษณ์ (identity function) บน  $A$  หมายถึงฟังก์ชัน  $i_A : A \rightarrow A$  คือ

$$i_A(x) = x$$

เมื่อ  $x \in A$  ชุดอีกอย่างหนึ่งคือ ฟังก์ชันเอกลักษณ์  $i_A$  หมายถึง ฟังก์ชัน ซึ่งกำหนดสมาชิกแต่ละตัวให้กับตัวเอง ฟังก์ชัน  $i_A$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง และ ไปทั่วถึง ดังนั้น มันเป็น bijection


## ฟังก์ชันผกผันและผลประกอบของฟังก์ชัน

(Inverse functions and Compositions of functions)

จงพิจารณาฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและไปทั่วถึง  $f$  จากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  เพราะว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันไปทั่วถึง สมาชิกทุกตัวของ  $B$  เป็นอิมเททของสมาชิกบางตัวใน  $A$  นอกจากนี้แล้ว เพราะว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งด้วย สมาชิกทุกตัวของ  $B$  เป็นอิมเททของสมาชิกเพียงค่าเดียวของ  $A$  ดังนั้นเราสามารถนิยามฟังก์ชันใหม่จาก  $B$  ไป  $A$  ซึ่งผกผันกับการสมนัย กำหนดให้โดย  $f$  สิ่งนี้นำไปสู่คำจำกัดความต่อไปนี้

บทนิยาม 9 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและไปทั่วถึง จากเซต  $A$  ไปเซต  $B$ , ฟังก์ชันผกผัน ของ  $f$  หมายถึงฟังก์ชัน ซึ่งกำหนดค่าให้กับ สมาชิก  $b$  อยู่ใน  $B$  ด้วยเพียงค่าเดียว สมาชิก  $a$  ใน  $A$  โดยที่  $f(a) = b$  ฟังก์ชันผกผัน  $f$  ใช้สัญลัษณ์  $f^{-1}$  ดังนั้น  $f^{-1}(b) = a$  เมื่อ  $f(a) = b$  (Let  $f$  be a one-to-one correspondence from the set  $A$  to the set  $B$ . The inverse function of  $f$  is the function that assigns to an element  $b$  belonging to  $B$  the unique element  $a$  in  $A$  such that  $f(a) = b$ . The inverse function of  $f$  is denoted by  $f^{-1}$ . Hence,  $f^{-1}(b) = a$  when  $f(a) = b$ .)

รูป 6 แสดงให้เห็นแนวความคิดของฟังก์ชันผกผัน



รูป 6 ฟังก์ชัน  $f^{-1}$  เป็นการผกผันของฟังก์ชัน  $f$

ถ้าฟังก์ชัน  $f$  ไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่งและไปทั่วถึง เราไม่สามารถนิยามฟังก์ชันผกผันของ  $f$  เมื่อ  $f$  ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึง ไม่ว่ามัน ไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือ ไม่ใช่แบบไปทั่วถึง ถ้า  $f$  ไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง จะมีสมาชิกบางตัว  $b$  ในโคโดเมน เป็นอิมเททของ

สมาชิกมากกว่าหนึ่งตัวในโดเมน ถ้า  $f$  ไม่ใช่แบบทั่วถึง สำหรับสมาชิกบางตัว  $b$  ในโคโดเมน จะไม่มีสมาชิก  $a$  ในโดเมนอยู่ สำหรับ  $f(a) = b$  นอกจากนี้แล้ว ถ้า  $f$  ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งแบบไปทั่วถึง เราไม่สามารถกำหนดค่าให้กับสมาชิก  $b$  แต่ละตัวในโคโดเมน ด้วยสมาชิกเพียงค่าเดียว  $a$  ในโดเมน โดยที่  $f(a) = b$  (เพราะว่า สำหรับ  $b$  บางตัว อาจจะไม่มีความมากกว่าหนึ่ง เช่น  $a$  หรือไม่มี  $a$ )

หนึ่งต่อหนึ่งแบบไปทั่วถึง เรียกว่า หาตัวผกผันได้ (invertible) เนื่องจากเราสามารถนิยามการผกผันของฟังก์ชันนี้ได้ ฟังก์ชันซึ่งไม่เป็น ฟังก์ชันหาตัวผกผันได้ (not invertible) ถ้ามันไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่งและไปทั่วถึง เพราะว่า การผกผันของฟังก์ชันเช่นนี้ ไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่าง 14 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $\{a, b, c\}$  ไป  $\{1, 2, 3\}$  โดยที่  $f(a) = 2, f(b) = 3$  และ  $f(c) = 1$  ถามว่า  $f$  หาตัวผกผันได้หรือไม่? และถ้าเป็น อะไรคือฟังก์ชันผกผัน?

เฉลย ฟังก์ชัน  $f$  หาตัวผกผันได้เนื่องจากมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบไปทั่วถึง ฟังก์ชันผกผัน  $f^{-1}$  ย้อนลำดับการสมนัยกับที่กำหนดโดย  $f$  ดังนั้น  $f^{-1}(1) = c, f^{-1}(2) = a, f^{-1}(3) = b$

ตัวอย่าง 15 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนเต็ม ไปเซตของจำนวนเต็ม โดยที่  $f(x) = x + 1$ , ถามว่า  $f$  หาตัวผกผันได้หรือไม่? และถ้าหาได้ อะไรเป็นฟังก์ชันผกผัน?

เฉลย ฟังก์ชัน  $f$  เป็นฟังก์ชันหาตัวผกผันได้ เพราะว่ามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึง เช่นที่เราได้แสดงให้เห็นแล้ว การย้อนลำดับการสมนัย สมมติว่า  $y$  เป็น อิมเทจของ  $x$  ดังนั้น  $y = x + 1$  แล้ว  $x = y - 1$  สิ่งนี้หมายความว่า  $y - 1$  เป็นสมาชิกเพียงค่าเดียวของ  $Z$  นั่นคือส่งค่าไป  $y$  ด้วย  $f$  ดังนั้น  $f^{-1}(y) = y - 1$

ตัวอย่าง 15.1 ฟังก์ชัน

$$f = \{(1, a), (2, c), (3, b)\}$$

จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c\}$  เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และไปทั่วถึง

$$f^{-1} = \{(a, 1), (c, 2), (b, 3)\}$$

เป็นฟังก์ชันผกผัน

ตัวอย่าง 16 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $Z$  ไป  $Z$  ด้วย  $f(x) = x^2$  ถามว่า  $f$  หาตัวผกผันได้หรือไม่?



ผลเฉลย เนื่องจาก  $f(-1) = f(1) = 1$ ,  $f$  จึงไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ถ้าฟังก์ชันผกผันถูกนิยาม มันจะกำหนดสมาชิกสองตัวให้ 1 ดังนั้น  $f$  ไม่เป็น หาดัวผกผันได้

บทนิยาม 10 ให้  $g$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  และให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $B$  ไปเซต  $C$  ผลประกอบของฟังก์ชัน  $f$  และ  $g$  ใช้สัญลักษณ์  $f \circ g$  นิยามดังนี้

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

(Let  $g$  be a function from the set  $A$  to the set  $B$  and let  $f$  be a function from the set  $B$  to the set  $C$ . The **composition** of the function  $f$  and  $g$ , denoted by  $f \circ g$  is defined by

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

พูดอีกอย่างหนึ่งคือ  $f \circ g$  เป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดค่าให้กับสมาชิก  $a$  ของ  $A$  ด้วยสมาชิกซึ่งกำหนดค่าโดย  $f$  ไป  $g(a)$  โปรดสังเกตว่า ผลประกอบ  $f \circ g$  ไม่สามารถนิยามได้ ถ้าพิสัยของ  $g$  ไม่เป็นเซตย่อยของโดเมนของ  $f$  ในรูป 7 แสดงให้เห็นผลประกอบของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง 17 ให้  $g$  เป็นฟังก์ชัน จากเซต  $\{a, b, c\}$  ไปยังตัวมันเอง โดยที่  $g(a) = b$ ,  $g(b) = c$  และ  $g(c) = a$  ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $\{a, b, c\}$  ไปเซต  $\{1, 2, 3\}$  โดยที่  $f(a) = 3$ ,  $f(b) = 2$  และ  $f(c) = 1$  จงหาผลประกอบของ  $f$  และ  $g$  และอะไรคือผลประกอบของ  $g$  และ  $f$ ?


ผลเฉลย ผลประกอบ  $f \circ g$  นิยามโดย

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$$

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$$

$$(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$$

โปรดสังเกตว่า  $g \circ f$  นิยามไม่ได้ เพราะว่า พิสัยของ  $f$  ไม่เป็น เซตย่อยของโดเมนของ  $g$



รูป 7 ผลประกอบของฟังก์ชัน  $f$  และ  $g$

### ตัวอย่าง 17.1 ให้

$g = \{(1, a), (2, a), (3, c)\}$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c\}$   
และ  $f = \{(a, y), (b, x), (c, z)\}$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $Y$  ไป  $Z = \{x, y, z\}$  ผลประกอบของ  
ฟังก์ชันจาก  $X$  ไป  $Z$  คือ

$$f \circ g = \{(1, y), (2, y), (3, z)\}$$

ตัวอย่าง 18 ให้  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนเต็ม ไปเซตของจำนวนเต็ม นิยาม  
โดย  $f(x) = 2x + 3$  และ  $g(x) = 3x + 2$  จงหาผลประกอบของ  $f$  และ  $g$ , จงหาผลประกอบ  
ของ  $g$  และ  $f$

ผลเฉลย ผลประกอบของ  $f \circ g$  และ  $g \circ f$  ทั้งคู่ นิยามดังนี้

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$$

และ

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$$

หมายเหตุ ถึงแม้ว่า  $f \circ g$  และ  $g \circ f$  นิยามได้ สำหรับฟังก์ชัน  $f$  และ  $g$  ในตัวอย่าง 18 อย่าง  
ไรก็ตาม  $f \circ g$  และ  $g \circ f$  ไม่เท่ากัน พุคอีกอย่างหนึ่ง คือ กฎการสลับที่ (commutative law) ไม่  
เป็นจริงสำหรับผลประกอบของฟังก์ชัน

เมื่อผลประกอบของฟังก์ชันและการผกผันของมัน กำหนดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอันดับ  
อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเอกลักษณ์จะได้มาด้วย เช่น สมมติว่า  $f$  เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึง  
จากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  แล้วฟังก์ชันผกผัน  $f^{-1}(b) = a$  เมื่อ  $f(a) = b$  และ  $f(a) = b$  เมื่อ  
 $f^{-1}(b) = a$

$$\text{ดังนั้น } (f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a$$

$$\text{และ } (f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = f(a) = b$$

ดังนั้น  $f^{-1} \circ f = i_A$  และ  $f \circ f^{-1} = i_B$  เมื่อ  $i_A$  และ  $i_B$  เป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์ บนเซต  
 $A$  และ  $B$  ตามลำดับ นั่นคือ  $(f^{-1})^{-1} = f$

### กราฟของฟังก์ชัน (The Graphs of Functions)

เราสามารถ associate เซตของคู่ต่างๆ ใน  $A \times B$  ให้กับแต่ละฟังก์ชันจาก  $A$  ไป  $B$   
เซตของคู่ต่างๆ เรียกว่า กราฟ (graph) ของฟังก์ชัน และบ่อยครั้งแสดงด้วยภาพ เพื่อช่วยในการ  
ทำความเข้าใจพฤติกรรมของฟังก์ชัน


บทนิยาม 11 ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  กราฟของฟังก์ชัน  $f$  คือเซตของคู่อันดับ  $\{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } f(a) = b\}$

(Let  $f$  be a function from the set  $A$  to the set  $B$ . The graph of the function  $f$  is the set of ordered pairs  $\{(a, b) \mid a \in A \text{ and } f(a) = b\}$ .)

จากคำจำกัดความนี้ กราฟของฟังก์ชัน  $f$  จาก  $A$  ไป  $B$  คือเซตย่อยของ  $A \times B$  ประกอบด้วย คู่อันดับต่าง ด้วยตัวที่สอง เท่ากับสมาชิกของ  $B$  กำหนดค่าโดย  $f$  ไปยังตัวแรก

ตัวอย่าง 19 จงวาดภาพ กราฟของฟังก์ชัน  $f(n) = 2n + 1$  จงหาเซตของจำนวนเต็ม ไปเซตของจำนวนเต็ม


ผลเฉลย กราฟของ  $f$  คือเซตของคู่อันดับ ของรูปแบบ  $(n, 2n + 1)$  เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนเต็ม, กราฟนี้ แสดงด้วยรูป 8



รูป 8 กราฟของฟังก์ชัน  $f(n) = 2n + 1$  จาก  $Z$  ไป  $Z$

ตัวอย่าง 20 จงวาดภาพ กราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = x^2$  จากเซตของจำนวนเต็ม ไปยังเซตของจำนวนเต็ม

ผลเฉลย กราฟของ  $f$  คือ เซตของคู่อันดับต่าง ของรูปแบบ  $(x, f(x)) = (x, x^2)$  เมื่อ  $x$  เป็นจำนวนเต็ม กราฟนี้ แสดงในรูป 9



รูป 9 กราฟของ  $f(x) = x^2$  จาก  $\mathbb{Z}$  ไป  $\mathbb{Z}$

### ฟังก์ชันที่สำคัญ (Some Important Functions)

ต่อไป เราจะแนะนำ ฟังก์ชันที่สำคัญ 2 ชุด ในคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ชื่อ ฟังก์ชันฟลอร์ (floor) และ ฟังก์ชันซีลิ่ง (ceiling) ให้  $x$  เป็นจำนวนจริง ฟังก์ชันฟลอร์ ปัดเศษ  $x$  ให้ใกล้จำนวนเต็มที่สุด ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $x$  และฟังก์ชันซีลิ่ง ปัดเศษ  $x$  ให้ใกล้จำนวนเต็มซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ  $x$  ฟังก์ชันนี้ บ่อยครั้งใช้เมื่อมีการนับสิ่งของ มันมีบทบาทสำคัญ ในการวิเคราะห์ จำนวนของขั้นตอนซึ่งใช้โดยกระบวนการแก้ปัญหาของขนาด ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง

**บทนิยาม 12** ฟังก์ชันฟลอร์ กำหนดค่าให้กับ จำนวนจริง  $x$  ด้วยจำนวนเต็มใหญ่ที่สุด ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  $x$  และค่าของฟังก์ชันฟลอร์ที่  $x$  ใช้สัญลักษณ์  $\lfloor x \rfloor$  ฟังก์ชันซีลิ่ง กำหนดค่าให้กับจำนวนจริง  $x$  ด้วยจำนวนเต็มเล็กที่สุด ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ  $x$  ค่าของฟังก์ชันซีลิ่งที่  $x$  ใช้สัญลักษณ์  $\lceil x \rceil$


(The floor function assigns to the real number  $x$  the largest integer that is less than or equal to  $x$ . The value of the floor function at  $x$  is denoted by  $\lfloor x \rfloor$ . The ceiling function assigns to the real number  $x$  the smallest integer that is greater than or equal to  $x$ . The value of the ceiling function at  $x$  is denoted by  $\lceil x \rceil$ .)

หมายเหตุ ฟังก์ชันฟลอร์ บ่อยครั้ง เรียกว่า ฟังก์ชันจำนวนเต็มบวก (greatest integer function) ใช้สัญลักษณ์  $\lfloor x \rfloor$

ตัวอย่าง 21 จงแสดงค่าของฟังก์ชันฟลอร์ และฟังก์ชันซีลิ่ง

$$\begin{aligned} \lfloor 1/2 \rfloor &= 0, & \lceil 1/2 \rceil &= 1 \\ \lfloor -1/2 \rfloor &= -1, & \lceil -1/2 \rceil &= 0 \\ \lfloor 3.1 \rfloor &= 3, & \lceil 3.1 \rceil &= 4 \\ \lfloor 7 \rfloor &= 7, & \lceil 7 \rceil &= 7 \end{aligned}$$

เราแสดงกราฟของฟังก์ชันฟลอร์และฟังก์ชันซีลิ่ง ในรูป 10 มีฟังก์ชันบางชนิดซึ่งจะใช้ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ พหุนาม (polynomial), ลอการิทึม (logarithm) และ ฟังก์ชันชี้กำลัง (exponential function) ในหนังสือเล่มนี้ สัญลักษณ์  $\log x$  จะใช้แทนลอการิทึมฐานสองของ  $x$  เพราะว่าสองเป็นเลขฐานซึ่งปกติจะใช้สำหรับลอการิทึม เราใช้ลอการิทึมฐาน  $b$  เมื่อ  $b$  เป็นเลขจำนวนจริงใดๆ มีค่ามากกว่า 1 ใช้สัญลักษณ์  $\log_b x$



รูป 10 กราฟของฟังก์ชันฟลอร์ และฟังก์ชันซีลิ่ง

The floor of  $x$  “round  $x$  down” while the ceiling of  $x$  “round  $x$  up”.

ตัวอย่าง 22 ค่าแสดมปีไปรษณีย์  $P(w)$  เป็นฟังก์ชันของน้ำหนัก  $w$  กำหนดโดยสมการข้างล่างนี้

$$P(w) = 29 + 23 \lceil w - 1 \rceil, \quad 11 \geq w > 0$$

จงหา  $P(3.7)$  และ  $P(2)$

ผลเฉลย

$$\begin{aligned} P(3.7) &= 29 + 23 \lceil 3.7 - 1 \rceil \\ &= 29 + 23 \lceil 2.7 \rceil \\ &= 29 + 23 \cdot 3 \\ &= 29 + 69 = 98 \\ P(2) &= 29 + 23 \lceil 2 - 1 \rceil \\ &= 29 + 23 \lceil 1 \rceil \\ &= 29 + 23 \cdot 1 = 52 \end{aligned}$$

บทนิยาม 18 ถ้า  $x$  เป็นจำนวนเต็ม ไม่ใช่ค่าลบ และ  $y$  เป็นจำนวนเต็มบวก เรานิยาม  $x \bmod y$  ให้เป็นเศษ ของ  $x$  หารด้วย  $y$

(If  $x$  is a nonnegative integer and  $y$  is a positive integer, we define  $x \bmod y$  to be the remainder when  $x$  is divided by  $y$ .)

ตัวอย่าง 23

$$\begin{aligned} 6 \bmod 2 &= 0, & 8 \bmod 12 &= 8 \\ 5 \bmod 1 &= 0, & 199673 \bmod 2 &= 1 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 24 ฟังก์ชันแบบแฮช (Hash Functions) สมมติว่าเรามีเซลล์ (cells) ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ครรชนี จาก 0 ถึง 10 (ดูรูป 11) ต้องการเก็บและค้นคืน จำนวนเต็ม ไม่ใช่ค่าลบใดๆ ในเซลล์เหล่านี้ กลยุทธ์วิธีหนึ่ง (one approach) คือใช้ ฟังก์ชันแบบแฮช ฟังก์ชันแบบแฮช จะนำข้อมูล (data item) เข้าไปเก็บ หรือ ค้นคืน และคำนวณทางเลือกที่หนึ่งสำหรับตำแหน่งให้กับข้อมูลตัวนั้น ตัวอย่างเช่น ต้องการเก็บหรือค้นคืน จำนวน  $n$  เลือกสิ่งแรกสำหรับตำแหน่ง  $n \bmod 11$  ฟังก์ชันแบบแฮช เป็นดังนี้

$$h(n) = n \bmod 11$$

รูป 11 แสดงผลลัพธ์ ของการเก็บ 15, 558, 32, 132, 102 และ 5 ในอันดับนี้ ซึ่งตอนเริ่มต้นเป็นเซลล์ว่าง

ต่อไป สมมติว่า ต้องการเก็บเลข 257 เพราะว่า  $h(257) = 4$ , 257 จัดการเก็บที่ตำแหน่ง 4 อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งนี้ มีการเก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีเช่นนี้ เรียกว่า การชนกัน (collision) เกิดขึ้น เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น การชนกันเกิดขึ้น สำหรับฟังก์ชันแบบแฮช H ถ้า  $H(x) = H(y)$  แต่  $x \neq y$  การแก้ปัญหานี้

132			102	15	5	257		558		32
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

รูป 11

นโยบายแก้ปัญหการชนกัน (collision resolution policy) จึงจำเป็นต้องมี นโยบายเบื้องต้นวิธีหนึ่งคือ หาเซลล์ว่างสูงสุดถัดไป (สมมติว่า 0 ต่อจาก 10) ถ้าเราใช้นโยบายแก้ปัญหการชนกันนี้ เราจะเก็บ 257 ที่ตำแหน่ง 6 (ดูรูป 11)

ถ้าเราต้องการหาตำแหน่งที่อยู่ซึ่งเก็บ ค่า  $n$  ให้คำนวณ  $m = h(n)$  และเริ่มด้วยการมองหาที่ตำแหน่ง  $m$  ถ้า  $n$  ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนี้ ให้มองที่ตำแหน่งสูงสุดถัดไป (สมมติว่า 0 ต่อจาก 10) ถ้า  $n$  ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนี้อีก ให้ดำเนินการต่อไป กับตำแหน่งสูงสุดถัดไป เช่นนี้เรื่อยๆ ถ้าเรามาถึงเซลล์ว่าง หรือ กลับคืน ยังตำแหน่งเริ่มต้น จึงสรุปได้ว่า  $n$  ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำ กรณีอื่นๆ แสดงว่า เราได้ตำแหน่งของ  $n$

### แบบฝึกหัดเสริม

จงบอกว่า ความสัมพันธ์แต่ละชุด ในข้อ 1-5 จาก  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  ไป  $Y = \{a, b, c, d\}$  เป็นฟังก์ชัน หรือไม่? ถ้าเป็นฟังก์ชัน จงหา โดเมนและพิสัยของมัน และจงบอกว่าเป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง หรือ ไปทั่วถึง ถ้าเป็นแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง และไปทั่วถึง ทั้งคู่ จงให้รายละเอียดของฟังก์ชันผกผัน เป็นเซตของคู่อันดับ และจงบอกโดเมนและพิสัยของฟังก์ชันผกผัน

1.  $\{(1, a), (2, a), (3, c), (4, b)\}$
2.  $\{(1, c), (2, a), (3, b), (4, c), (2, d)\}$
3.  $\{(1, c), (2, d), (3, a), (4, b)\}$
4.  $\{(1, d), (2, d), (4, a)\}$
5.  $\{(1, b), (2, b), (3, b), (4, b)\}$
6. จงยกตัวอย่างฟังก์ชัน ซึ่งเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ไม่ใช่ ไปทั่วถึง
7. จงยกตัวอย่างฟังก์ชัน ซึ่งเป็นแบบไปทั่วถึง แต่ไม่ใช่ หนึ่งต่อหนึ่ง
8. จงยกตัวอย่างฟังก์ชัน ซึ่งไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และไม่ใช่แบบ ไปทั่วถึง
9. กำหนดให้

$$g = \{(1, b), (2, c), (3, a)\}$$

เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c, d\}$  และ

$$f = \{(a, x), (b, x), (c, z), (d, w)\}$$

เป็นฟังก์ชัน จาก  $Y$  ไป  $Z = \{w, x, y, z\}$

จงเขียน  $f \circ g$  เป็นเซตของคู่อันดับ

10. กำหนดให้

$$f = \{(x, x^2) \mid x \in X\}$$

เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{-5, -4, \dots, 4, 5\}$  ไปเซตของจำนวนเต็ม จงเขียน  $f$  เป็นเซตของคู่อันดับ และ  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง หรือ ไปทั่วถึง หรือไม่?

11. จะมีจำนวนฟังก์ชัน จาก  $\{1, 2\}$  ไป  $\{a, b\}$  เท่าไหร่? ชุดไหนบ้างเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, ชุดไหนบ้างเป็นแบบ ไปทั่วถึง

12. กำหนดให้

$$f = \{(a, b), (b, a), (c, b)\}$$

เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{a, b, c\}$  ไป  $X$  :



(a) จงเขียน  $f \circ f$  และ  $f \circ f \circ f$  เป็นเซตของคู่อันดับ

(b) นิยาม

$$f^n = f \circ f \circ \dots \circ f$$

เป็นผลประกอบ  $n$ -fold ของ  $f$  กับตัวมันเอง

จงหา  $f^8$  และ  $f^{623}$

13. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  ไป  $X$  นิยามดังนี้

$$f(x) = 4x \pmod{5}$$

จงเขียน  $f$  เป็นเซตของคู่อันดับ,  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง หรือแบบ ไปทั่วถึง?

14. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  ไป  $X$  นิยามดังนี้

$$f(x) = 4x \pmod{6}$$

จงเขียน  $f$  เป็นเซตของคู่อันดับ,  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง หรือแบบ ไปทั่วถึง?

15. ให้  $m$  และ  $n$  เป็นจำนวนเต็มบวก ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก

$$X = \{0, 1, \dots, m-1\}$$

นิยามดังนี้

$$f(x) = nx \pmod{m}$$

จงหาเงื่อนไข บน  $m$  และ  $n$  ซึ่งแน่ใจว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง และ ไปทั่วถึง

สำหรับ ฟังก์ชันแบบเลขแต่ละชุด ในข้อ 18-19 จงแสดงว่า ข้อมูลจะใส่เข้าไปในอันดับ  
ซึ่งเริ่มต้นกำหนดเป็น เซลล์ว่างอย่างไร? ให้ใช้นโยบายแก้ปัญหาการชนกัน ของ ตัวอย่าง 24

16.  $h(x) = x \pmod{11}$ , เซลล์ มีคิรชนี เป็น 0 ไป 10

ข้อมูลคือ 53, 13, 281, 743, 377, 20, 10, 796

17.  $h(x) = x \pmod{17}$ , เซลล์ มีคิรชนี เป็น 0 ไป 16

ข้อมูลคือ 714, 631, 26, 373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, 1028

18.  $h(x) = x^2 \pmod{11}$ , เซลล์ และข้อมูล เหมือนข้อ 16

19.  $h(x) = (x^2 + x) \pmod{17}$ , เซลล์ และข้อมูล เหมือนข้อ 17

20. สมมติว่าเราเก็บและกั้นคินข้อมูล เช่นที่อธิบายในตัวอย่าง 24 ถ้าเราเอาข้อมูลออก จะมี  
ปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่? อธิบาย

21. สมมติว่าเราเก็บข้อมูล เช่นที่อธิบายในตัวอย่าง 24 และเราไม่เคยเก็บ ข้อมูลมากกว่า 10 ตัว  
จะมีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อกั้นคินข้อมูล ถ้าเราหยุดค้นหาเมื่อพบเซลล์ว่าง? อธิบาย

22. สมมติว่าเราเก็บข้อมูล เช่นที่อธิบายในตัวอย่าง 24 และค้นคืนข้อมูล เช่นที่อธิบายในข้อ 21. จะมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่? ถ้าเราเอาข้อมูลออก, อธิบาย

ให้  $g$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $X$  ไป  $Y$  และให้  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $Y$  ไป  $Z$  สำหรับข้อความแต่ละชุด ในข้อ 23-29 ถ้าข้อความ เป็นจริง จงเขียน จริง ถ้าข้อความ เป็นเท็จ จงยกตัวอย่าง

23. ถ้า  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แล้ว  $f \circ g$  เป็น หนึ่งต่อหนึ่ง
24. ถ้า  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชันแบบ ไปทั่วถึง, แล้ว  $f \circ g$  เป็น ไปทั่วถึง
25. ถ้า  $f$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและ ไปทั่วถึง, แล้ว  $f \circ g$  เป็น หนึ่งต่อหนึ่ง และไปทั่วถึง
26. ถ้า  $f \circ g$  เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, แล้ว  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง
27. ถ้า  $f \circ g$  เป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, แล้ว  $g$  เป็นฟังก์ชันแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง
28. ถ้า  $f \circ g$  เป็นฟังก์ชันแบบ ไปทั่วถึง, แล้ว  $f$  เป็นฟังก์ชันแบบ ไปทั่วถึง
29. ถ้า  $f \circ g$  เป็นฟังก์ชันแบบ ไปทั่วถึง แล้ว  $g$  เป็นฟังก์ชันแบบ ไปทั่วถึง

ถ้า  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $X$  ไป  $Y$  และ  $A \subseteq X$  และ  $B \subseteq Y$  เรานิยาม

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

เราเรียก  $f^{-1}(B)$  เป็น ภาพผกผัน (inverse image) ของ  $B$  ภายใต้  $f$

30. ให้  $g = \{(1, a), (2, c), (3, c)\}$   
เป็นฟังก์ชัน จาก  $X = \{1, 2, 3\}$  ไป  $Y = \{a, b, c, d\}$   
ให้  $S = \{1\}$ ,  $T = \{1, 3\}$ ,  $U = \{a\}$  และ  $V = \{a, c\}$   
จงหา  $g(S)$ ,  $g(T)$ ,  $g^{-1}(U)$  และ  $g^{-1}(V)$

## แบบฝึกหัด 2.6

- ทำไม  $f$  ไม่ใช่ฟังก์ชัน จาก  $\mathbb{R}$  ไป  $\mathbb{R}$  ในสมการต่อไปนี้
  - $f(x) = 1/x$
  - $f(x) = \sqrt{x}$
  - $f(x) = \pm \sqrt{x^2 + 1}$
- จงบอกว่า  $f$  เป็นฟังก์ชัน จาก  $\mathbb{Z}$  ไป  $\mathbb{R}$  หรือไม่? ถ้า
  - $f(n) = \pm n$
  - $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$
  - $f(n) = 1/(n^2 - 4)$
- จงบอกว่า  $f$  เป็นฟังก์ชัน จากเซตของสายบิตทั้งหมด (all bit strings) ไป เซตของจำนวนเต็มหรือไม่? ถ้า
  - $f(S)$  เป็นตำแหน่งของบิตศูนย์ใน  $S$
  - $f(S)$  เป็นจำนวนบิตหนึ่งใน  $S$
  - $f(S)$  เป็น จำนวนเต็ม  $i$  เล็กที่สุด โดยที่บิตที่  $i$  ของ  $S$  เท่ากับ 1 และ  $f(S) = 0$  เมื่อ  $S$  เป็นสายอักขระว่าง (empty string) คือสายอักขระซึ่งไม่มีบิตใดๆ
- จงหาโดเมนและพิสัยของฟังก์ชันต่อไปนี้
  - ฟังก์ชันซึ่งกำหนดค่าให้กับ จำนวนเต็มไม่เป็นค่าลบแต่ละตัวด้วยเลขหลักสุดท้ายของมัน
  - ฟังก์ชันซึ่งกำหนดค่า จำนวนเต็มใหญ่ที่สุดถัดไปให้กับจำนวนเต็มบวก
  - ฟังก์ชันซึ่งกำหนดค่าให้กับสายบิต ด้วยจำนวนบิตหนึ่งในสายอักขระ
  - ฟังก์ชันซึ่งกำหนดค่าให้กับสายบิต ด้วยจำนวนบิตในสายอักขระ
- จงคำนวณหา
  - $\lceil 3/4 \rceil$
  - $\lfloor 7/8 \rfloor$
  - $\lceil -3/4 \rceil$
  - $\lfloor -7/8 \rfloor$
  - $\lceil 3 \rceil$
  - $\lfloor -1 \rfloor$
- จงบอกว่า ฟังก์ชันต่อไปนี้แต่ละชุดจาก  $\{a, b, c, d\}$  ไปยังตัวมันเองเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่?
  - $f(a) = b, f(b) = a, f(c) = c, f(d) = d$
  - $f(a) = b, f(b) = b, f(c) = d, f(d) = c$
  - $f(a) = d, f(b) = b, f(c) = d, f(d) = d$
- ฟังก์ชันชุดไหน? ในแบบฝึกหัดข้อ 6 เป็นฟังก์ชันแบบไปทั่วถึง



21. จงให้ตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่า การเป็นเซตย่อย ในส่วน (b) ในแบบฝึกหัดข้อ 20 อาจเป็นสิ่งถูกต้อง

ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจากเซต  $A$  ไปเซต  $B$  ให้  $S$  เป็นเซตย่อยของ  $B$  เรานิยาม ภาพผกผัน (inverse image) ของ  $S$  เป็นเซตย่อยของ  $A$  ประกอบด้วย pre-image ทั้งหมดของสมาชิกของ  $S$  เราใช้สัญลักษณ์ ภาพผกผันของ  $S$  ด้วย  $f^{-1}(S)$  ดังนั้น

$$f^{-1}(S) = \{a \in A \mid f(a) \in S\}$$

22. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $\mathbb{R}$  ไป  $\mathbb{R}$  นิยามโดย  $f(x) = x^2$  จงหา

a)  $f^{-1}(\{1\})$

b)  $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

c)  $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$

23. ให้  $g(x) = \lfloor x \rfloor$  จงหา

a)  $g^{-1}(\{0\})$

b)  $g^{-1}((-1, 0, 1))$

c)  $g^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$

24. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $A$  ไป  $B$  ให้  $S$  และ  $T$  เป็นเซตย่อยของ  $B$  จงแสดงให้เห็นว่า

a)  $f^{-1}(S \cup T) = f^{-1}(S) \cup f^{-1}(T)$

b)  $f^{-1}(S \cap T) = f^{-1}(S) \cap f^{-1}(T)$

25. ให้  $f$  เป็นฟังก์ชันจาก  $A$  ไป  $B$  ให้  $S$  เป็นเซตย่อยของ  $B$  จงแสดงให้เห็นว่า

$$f^{-1}(S) = \overline{f^{-1}(\overline{S})}$$

26. จงแสดงให้เห็นว่า  $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$

27. ให้  $x$  เป็นจำนวนจริง จงแสดงให้เห็นว่า

$$\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + 1/2 \rfloor$$

28. จงวาดกราฟของฟังก์ชัน  $f(n) = 1 - n^2$  จาก  $\mathbb{Z}$  ไป  $\mathbb{Z}$

29. จงวาดกราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$  จาก  $\mathbb{R}$  ไป  $\mathbb{R}$

30. จงวาดกราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = x^3 + 1$

32. สมมติว่า  $f$  เป็นฟังก์ชันหาตัวผกผันได้ จาก  $Y$  ไป  $Z$  และ  $g$  เป็นฟังก์ชันหาตัวผกผันได้

จาก  $X$  ไป  $Y$  จงแสดงให้เห็นว่า การผกผันของผลประกอบ  $f \circ g$  ถูกกำหนดโดย

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$