

ไขมัน ในที่นี้หมายถึงไขมันและน้ำมัน อาจจะเป็นของแข็งหรือของเหลวในอุณหภูมิ ธรรมชาติ อาหารหมูนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของน้ำมัน แต่อาจจะแทรกอยู่ในเนื้ออาหารหลาย ๆ ชนิด เช่น ถั่วลิสง ไข่ นม เนย เนื้อวัว ฯลฯ

1. ส่วนประกอบของไขมัน ไขมันประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ ของกรดไขมัน (Fatty Acid) ซึ่งเกากันอยู่กับอัลกออล ชนิดหนึ่งเรียกว่ากลีเซอรอล (Glycerol) ในกรดไขมัน ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นส่วนใหญ่

ไขมันเป็นส่วนที่พิชและสัตว์สามารถเก็บไว้ได้อย่างมากมาย จำนวนไม่จำกัดพื้นที่บางชนิด เก็บไขมันไว้ในผล เมล็ด ฯลฯ ไขมันที่มาจากการพิชเรียกว่าน้ำมันพิช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว เป็นต้น สำหรับไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ นม เนย น้ำมันหมู น้ำมันปลา ไปดัง

## 2. อาหารประเภทไขมัน ที่เราคินอยู่มี 2 ประเภทคือ

2.1 ไขมันจากสัตว์ สัตว์จะสะสมอาหารที่เหลือใช้ส่วนใหญ่ไว้ในรูปของไขมัน เพื่อ เอาไว้เผาผลาญให้พลังงานในเมื่อร่างกายต้องการ ทั้งนี้ไม่ว่าอาหารที่เหลือใช้จะเป็นคาร์บ ไฮเดรต โปรตีน หรือไขมันเองก็ประรูปเก็บไว้ในรูปของไขมันทั้งสิ้น

สัตว์สะสมไขมันเหล่านี้ไว้ในที่หลำแหลม มีมากได้พิเศษ ไขมันได้แก่ส่วนที่เรียกว่า ไขมันแข็งซึ่งติดกับหนังหมู นอกจากนี้ยังมีมากในช่วงท้อง ได้แก่มันปลารอบ ๆ อวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ไต มักจะมีไขมันห่อหุ้มอยู่ ไขมันส่วนนี้ป้องกันการกระแทกกระเทือน และช่วยให้อวัยวะอยู่ที่ นอกจากนั้นยังมีแทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

### 2.1.1 ชนิดของสัตว์ ในเนื้อหมูจะมีแทรกมากกว่าเนื้อวัว

### 2.1.2 อายุของสัตว์ สัตว์แก่มีมันมากกว่าสัตว์อ่อน เช่น ไก่ วัว

2.1.3 ตำแหน่งของเนื้อ ส่วนที่ไม่ค่อยได้ออกแรงนัก จะมีมันแทรกมากกว่าส่วน ที่ใช้ออกแรง เช่น ส่วนอกจะมีมันปนมากกว่าส่วนขา เนื้อสันนอกของวัวมีมันปนมากกว่า ส่วนขา

ไขมันที่มีในอวัยวะที่ก่อสร้างขึ้นนี้ เป็นไขมันที่เห็นได้ชัด ส่วนใหญ่เป็นพากไขมัน แท้ คือมีส่วนประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนซึ่งเดียวกับคาร์บไฮเดรต หาก แต่ว่ามีส่วนของไฮโดรเจนสูงกว่าในคาร์บไฮเดรตมาก โครงสร้างของไขมันเหล่านี้เป็น โครงสร้างอ่อน弱 ง่าย ประกอบด้วยกรดไขมันและกลีเซอรอล

มีสารอิกร่วมหนึ่งเรียกว่าเป็นสารคล้ายไขมัน สารเหล่านี้มีอยู่ในอวัยวะสำคัญ ๆ เช่น เชลล์ของประสาท สมอง ต่อมหมวกไต ฯลฯ สารพิษคล้ายไขมันนี้มีส่วนประกอบเพิ่มเติมไปจากชาตุかるนอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน โครงสร้างของไขมันเหล่านี้ слับชั้บช้อนกว่าพิษ ไขมันแท้ ทั้งนี้มีได้ทำหน้าที่ให้พลังงาน หากแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นช่วยให้อวัยวะนั้น ๆ ทำหน้าที่ได้

ยอร์โมนหลาายนิดนิดสร้างขึ้นจากสารพิษนี้ เช่น ยอร์โมนแห่งเพศ และยอร์โมนแห่งต่อมหมวกไตที่เป็นสารจำพวกคล้ายไขมันที่มีโครงสร้างทางเคมี слับชั้บช้อน

2.2 ไขมันที่ได้จากพืช มีมากในส่วนเมล็ดที่แก่สามารถจะปีบหรือสกัดออกมากใช้ได้ เช่น จากถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฯ เมล็ดฝ้าย เราได้น้ำมันถั่ว น้ำมันงา และน้ำมันเมล็ดฝ้าย นอกจากนี้เรารายจะได้ไขมันจากส่วนอื่นของพืชได้อีก เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก

พิษจำพวกถั่วเมล็ดที่มีเปลือกแข็งก็มีไขมันมาก เช่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น สำหรับผักและผลไม้ทั่วไปมีไขมันต่ำมากจนนับว่าไม่มี

มีพิษหลาายนิดที่คนทั่วไปกล่าวว่ามี “رسمัน” โดยที่ไขมันต่ำมากจนแทนจะกล่าวได้ว่า “ไม่มี” เช่น แห้ว มะม่วงมัน กระจับ “رسمัน” ของพิษเหล่านี้อันที่จริงเกิดจากแบ่งดิบหาใช้ไขมันไม่

### 3. คุณสมบัติของไขมัน ไขมันมีคุณสมบัติที่แบ่งออกไปเป็น 2 ประการคือ

#### 3.1 คุณสมบัติทางพิสิตร์

3.1.1 ไขมันบางกว่าน้ำ จึงลอยตัวอยู่เหนือน้ำ

3.1.2 ไขมันไม่ละลายในน้ำ และไม่ ผสมกลมกลืนกับน้ำด้วย ถึงแม้เราจะเขย่า น้ำกับน้ำมันเข้าด้วยกัน น้ำมันจะแตกออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ แต่เมื่อเราหยุดเขย่า ตั้งทิ้งไว้น้ำและน้ำมันจะแยกกันอยู่คนละส่วน

3.1.3 ไขมันละลายได้ในเบนซิน คาร์บอนเตอร์ทະคลอไรด์ อีเซอร์ และคลอโรฟอร์ม สารเหล่านี้เรียกว่าเป็นตัวทำละลายไขมัน เราอาจใช้สารเหล่านี้ตัวได้ตัวหนึ่ง เช็ดเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนไขมันเพื่อช่วยลบรอยเปื้อนได้

3.1.4 ในอุณหภูมิปกติจะเป็นของเหลวเรียกว่า oil fat

3.1.5 ไขมันที่มีโมเลกุลเล็กจะละลายที่อุณหภูมิ 12°C

3.1.6 ไขมันที่อยู่ในสภาพที่อุณหภูมิของร่างกายคนเราจะถูกย่อยได้ง่าย

#### 3.2 คุณสมบัติทางเคมี

3.2.1 ไขมันประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

3.2.2 พากปลาจะสะสมไขมันไว้ในตับแทนโกรโคเจน (Glycogen) เมื่อเราสักดั้งจะได้น้ำมันเตบปลาซึ่งมีคุณค่าประกอบไปด้วยวิตามินต่าง ๆ ที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินอี วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค

3.2.3 ใน 1 โมเลกุลของไขมันจะเท่ากับกลีเซอโรล 1 โมเลกุล และกรดไขมัน 3 โมเลกุล

4. ชนิดของไขมัน ไขมันมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติในทางอาหาร ต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่ชนิดของกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบ กรดไขมันมีอยู่ 2 ชนิดคือ

4.1 กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย (Essential Fatty Acids) หมายถึงกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ปริมาณไม่เพียงพอ กับความต้องการ กรดไขมันที่ไม่จำเป็นต้องร่างกายคนได้แก่ Linoleic Acid ซึ่งถ้าไม่ได้รับจากอาหารอย่างพอเพียงจะปรากฏอาการที่เห็นได้ชัด

กรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกายนี้มีมากในน้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันมะพร้าว) มีบ้างใน มันสัตว์ เช่น มันหมู มันไก่ มันเป็ด มันปลา การได้รับประทานอาหารไขมันพากที่กล่าวมา ย่อมช่วยให้ร่างกายได้กรดไขมันที่จำเป็น

4.2 กรดไขมันที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย (Non Essential Fatty Acid) หมายถึงกรดไขมัน ที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้ มีอยู่ในอาหารไขมันทั่วไป

5. คุณค่าทางอาหารของไขมัน ไขมันให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายของมนุษย์หลาย ประการ คือ

5.1 ไขมันให้พลังงานได้มากกว่าสารอาหารอื่น ๆ ไขมันบรรทุกชนิดให้พลังงาน ได้เท่ากัน คือ ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 แคลอรี่ ซึ่งให้พลังงานมากกว่าโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตสองเท่าครึ่ง

5.2 กรดไขมันบางชนิดในอาหารจำเป็นต่อร่างกาย และร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเอง ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เพียงพอ

5.3 ไขมันในอาหารช่วยให้อาหารรสเด็ดขึ้นและนุ่มขึ้น

5.4 เป็นตัวละลายวิตามิน ไขมันที่มีวิตามินละลายอยู่ ได้แก่ไขมันจากสัตว์ มีมากคือ น้ำมันเตบปลา และเนย ซึ่งช่วยในการดูดซึมวิตามินนั้น ๆ ในระบบทางเดินอาหาร

5.5 ไขมันในอาหารช่วยให้ผู้บริโภคอิ่มทันขึ้น เพราะไขมันย่อยได้ช้ากว่าโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต อญ្យในกระบวนการนานกว่า ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มนาน

5.6 ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายจะช่วยป้องกันการระเหบกระเทือนของอวัยวะภายในได้

5.7 ไขมันช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนภายในร่างกาย เพราะเป็นสื่อความร้อนที่เลว

5.8 ช่วยเพิ่มรสอาหาร และให้กรดไขมันที่จำเป็น

## 6. ความต้องการไขมันของร่างกาย

โดยปกติ 40% ของจำนวนแคลอรี่ทั้งหมดในอาหารควรมาจากไขมัน แต่ถ้าปริมาณนั้นลดลงเป็น 25% อาหารนั้นก็เป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ จะนั่น อาจกล่าวได้ว่าอาหารไขมันต่ำคืออาหารที่มีจำนวนแคลอรี่มากจากไขมันเพียง 25% ซึ่งจะเท่ากับไขมันอยู่ 35-36 กรัม ขึ้นอยู่กับระดับของแคลอรี่ ถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำมาก แคลอรี่ที่มาจากการไขมันจะมีเพียง 10-15% ของแคลอรี่ทั้งหมด หรือประมาณ 20-25 กรัม

7. การย่อยไขมัน ไขมันส่วนใหญ่ถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในลำไส้เล็ก สิ่งที่ช่วยในการย่อยและดูดซึมของไขมันมี

7.1 น้ำดี (Bile) สร้างขึ้นในตับและเก็บไว้ในถุงน้ำดี

7.2 น้ำย่อยจากตับอ่อน (Pancreatic Juice) มีเอนไซม์ไลเปส (Lipase) ซึ่งทำหน้าที่ย่อยไขมัน

ในปากและกระเพาะอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นแก่ไขมัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออาหารถูกขับออกจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็ก ในตอนนี้น้ำดีจะออกมากล่าวลำไส้เล็กตอนต้น

น้ำดีมีคุณสมบัติช่วยทำให้ไขมันแตกออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ ทำให้อ่อนไขม์ไลเปสมีโอกาสเข้าทำ การย่อยได้ง่ายขึ้น ไขมันที่เรารับประทานเข้าไป จะแตกออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ โดย

- ได้รับความร้อนจากร่างกาย
- การบีบตัวของกระเพาะและลำไส้
- สารสำคัญที่อยู่ในน้ำดีคือ Bile salt ช่วยทำให้ไขมันแตกออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ

เมื่อไขมันแตกออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ แล้วนั้น เข้าใจว่าบางส่วนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยมีได้โดยก่อได้ แต่ส่วนใหญ่จะถูกย่อยโดยเอนไซม์ไลเปส ให้ลายเป็นกรดไขมันกับกลีเซอรอล แล้วจึงผ่านผนังลำไส้เข้าสู่ร่างกายโดยมีน้ำดีช่วยในการดูดซึม เมื่อผ่านผนังลำไส้ไปแล้วสาร

ทั้งสองนี้จะรวมกันเป็นไขมันและส่วนใหญ่เข้าสู่ห้องน้ำเหลือง ส่วนน้อยเข้าสู่เส้นโลหิตดำไปยังตับ

พวกที่เข้าสู่น้ำเหลืองนั้น ในที่สุดก็จะเข้าสู่เส้นโลหิตเชื่อมกัน ภายในหลังอาหารสัก 2-3 ชม. ในโลหิตจะมีไขมันสูงแล้วจึงค่อย ๆ ลดลงเป็นปกติ ทั้งนี้เข้าใจว่าไขมันส่วนหนึ่งอาจถูกเผาผลาญใช้ทันที บางส่วนก็ไปยังอวัยวะอันเป็นศีรษะสม่าวีไว้ใช้

8. การใช้ไขมันในร่างกาย หลังจากย่อยและดูดซึม ไขมันจะเข้าสู่กระแสโลหิต หลังจากนี้ส่วนหนึ่งจะถูกเผาผลาญให้พลังงาน บางส่วนอาจถูกใช้สร้างส่วนประกอบของเซลล์ เช่น เซลล์ประสาท สมอง ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งร่างกายจะเก็บสะสมไว้ใต้ผิวหนังบ้าง ไขมันที่พบในร่างกายจำแนกได้เป็น 2 พฤกติ

8.1 พวกที่ร่างกายสะสมไว้ใช้ เผาผลาญให้พลังงานเมื่อร่างกายต้องการไขมัน พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นไขมันแท้ มีโครงสร้างอย่างง่าย ประกอบด้วยราชุคริบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเท่านั้น ไขมันจำพวกนี้ในอวัยวะที่เป็นที่สะสม เช่น ใต้ผิวหนังในช่องท้อง ไขมันออกจากการมาจากไขมันในอาหารแล้วจากมาจากการโปรดีนที่เหลือใช้ก็ได้ ปริมาณที่มีก็ไม่แน่นอน สุดแท้แต่สภาพการกินและการใช้อาหาร ถ้ากินอาหารที่ให้พลังงานมากจนเหลือใช้ ก็จะมีไขมันสะสมอยู่มาก ถ้าร่างกายขาดอาหารที่ให้พลังงานก็คงเอาไขมันนี้มาใช้ ทำให้ไขมันที่สะสมนี้น้อยลง

การลดความอ้วน จึงควรใช้หลักการกินอาหารจำพวกที่ใช้พลังงานให้น้อยลง เพื่อให้ร่างกายเอาไขมันที่สะสมไว้มาใช้ คนอ้วนจึงควรปฏิบัติในด้านอาหารดังนี้

- ลดปริมาณไขมันในอาหารลง (แต่จะดีเลยไม่ได้)
- ลดปริมาณอาหารหารครัวไอกเรhog เช่น แบ่ง น้ำตาล
- รับประทานโปรดีน เช่น พวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ พอกครา

8.2 พวกที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่าง ๆ เช่น เซลล์ประสาทสมอง ฯลฯ พวกนี้มีส่วนประกอบขับข้อน มิใช่ไขมันแท้และเป็นส่วนที่ร่างกายจะไม่ดึงเอามาใช้เผาผลาญ แม้ในยามที่ร่างกายขาดแคลนอาหารที่ให้พลังงาน

9. ปริมาณที่ควรได้รับ ปริมาณที่คนในประเทศไทยต่าง ๆ บริโภคแตกต่างกันมาก พบว่ามีปริมาณไขมันที่คนบริโภคเปลี่ยนแปลงตามฐานะเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประชาชนจะบริโภคไขมันในปริมาณสูง เช่นประเทศไทยรู้จักบริการซึ่งบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง คือใน 100 แคลอรี่มีไขมัน 40 แคลอรี่ ส่วนประเทศไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก

ประชาชนกับบริโภคไข่มันน้อย โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน บริโภคต่ำเกินไป คือใน 100 แคลอรี่จะมีไข่มันเพียง 10 แคลอรี่เท่านั้น

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเราควรรับประทานไข่มันเท่าไรจึงจะเหมาะสม แต่มีเหตุการณ์ที่นำไปให้ความสนใจเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของไข่มันที่รับประทาน กล่าวคือ ในประเทศไทยบริโภคไข่มันมากและเป็นไข้มันจากสัตว์จะมีสิทธิการตายเกี่ยวกับหลอดโลหิตแข็งและโรคหัวใจสูงมาก ในทางตรงข้ามประเทศไทยบริโภคไข่มันน้อยจะมีอัตราการตายแบบนี้ต่ำ

เนื่องจากไข่มันมีประโยชน์นักโภชนาการจึงได้เสนอไว้ว่าควรรับประทานไข่มันอย่างน้อย 20% ของแคลอรี่ที่ต้องการ ทั้งนี้หมายความว่า สำหรับประเทศไทย ผู้ใหญ่(หญิง) คนหนึ่งที่ทำงานค่อนข้างเบาเมื่อความต้องการใช้พลังงานวันละประมาณ 1,750 แคลอรี่ ควรใช้ไข่มัน

$$\frac{1750 \times 20}{100} = 350 \text{ แคลอรี่}$$

ควรรับประทานไข่มันวันละ 40 กรัมโดยประมาณ