


**บทที่ 6**  
**บทประยุกต์เกี่ยวกับแนวทาง (course) และระยะทาง (distance)**  
**บนทรงกลมโลก**

**6.1 ลักษณะของทรงกลมโลกและสามเหลี่ยมโลก**

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว โลกเรามีรูปร่างลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกับรูปทรงรี (ellipsoid) ดังนั้น สำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องสูงแล้วในการคิดคำนวณจะใช้รูปทรงรี แต่สำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องไม่สูงมากนัก แล้วในการคิดคำนวณมักจะพิจารณาให้โลกเป็นทรงกลม เพื่อว่าการแก้ปัญหาหรือการคิดคำนวณงานนั้น ๆ จะสามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิชาตรีโกณมิติเชิงทรงกลม (spherical trigonometry) มาช่วยแก้ปัญหาได้ ทรงกลมที่ใช้แทนโลกนั้น เราเรียกว่า ทรงกลมโลก (terrestrial sphere) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 7,917 ไมล์

โดยปกติโลกหมุนรอบเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งเราเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ว่า แกน (axis) ของโลก แกนของโลกนี้จะตัดผิวโลกที่จุด 2 จุด จุดหนึ่งเรียกว่า ขั้วโลกเหนือ (north pole) ซึ่งจะเขียนแทนด้วย  $P_n$  และอีกจุดหนึ่งเรียกว่า ขั้วโลกใต้ (south pole) ซึ่งจะเขียนแทนด้วย  $P_s$  ดังรูป 6.1.1



รูป 6.1.6

**เส้นศูนย์สูตร (equator)** คือ วงกลมใหญ่บนโลกซึ่งระนาบของวงกลมใหญ่นั้นตั้งฉากกับแกนของโลก หรืออาจให้ความหมายได้อีกแบบหนึ่งว่า เส้นศูนย์สูตร ก็คือ วงกลมใหญ่ที่มี  $P_1$  และ  $P_2$  เป็นขั้วนั่นเอง

**เส้นเมริเดียน (meridian)** คือ ครึ่งวงกลมใหญ่ที่ผ่านขั้วโลกทั้งสอง โดยมีขั้วโลกทั้งสองเป็นจุดตั้งต้นและจุดสิ้นสุด นั่นคือ สำหรับจุด  $A$  ใด ๆ บนผิวโลกที่ไม่ใช่ขั้ว เราจะเรียกครึ่งวงกลม  $P_1AP_2$  ว่า เส้นเมริเดียนของ  $A$  (ดูรูป 6.1.1)

**เส้นเมริเดียนเริ่มแรก (first or prime meridian)** คือ เส้นเมริเดียนที่ผ่านหอดูดาวที่กรีนวิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษ จากรูป 6.1.1 คือ เส้นเมริเดียนของ  $G$  หรือเส้น  $P_1GP_2$  ก็คือ เส้นเมริเดียนเริ่มแรกนั่นเอง

เนื่องจากเส้นเมริเดียนตัดกับเส้นศูนย์สูตรเป็นมุมฉาก ดังนั้น ระยะเชิงมุมของจุด (angular distance of points) บนผิวโลกจากเส้นศูนย์สูตรสามารถวัดได้ด้วยความยาวตามเส้นเมริเดียนนั่นเอง

**ละติจูด (latitude)** ของจุดใด ๆ บนผิวโลก คือ ระยะเชิงมุมจากเส้นศูนย์สูตรไปตามเส้นเมริเดียนจนถึงจุดนั้น มักเขียนแทนด้วย  $L$  ในรูป 6.1.1 ละติจูดของ  $A$  ก็คือ มุม  $A'O A$  หรือส่วนโค้ง  $A'A$  ของเส้นเมริเดียนของ  $A$  ละติจูดของจุดแบ่งออกเป็นละติจูดเหนือ (north latitude) กับละติจูดใต้ (south latitude) ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจุดที่กล่าวถึงนั้นอยู่ในครึ่งทรงกลมส่วนที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรหรือใต้เส้นศูนย์สูตร โดยทั่ว ๆ ไป ค่าละติจูดเหนือให้มีค่าเป็นจำนวนบวก และค่าละติจูดใต้ให้มีค่าเป็นจำนวนลบ หรืออาจจะใช้วิธีระบุค่าว่า เหนือหรือใต้ก็ได้ เช่น ใช้  $50^\circ$  เหนือ แทน  $50^\circ$  และใช้  $50^\circ$  ใต้ แทน  $-50^\circ$  เป็นต้น

ผลต่างระหว่างละติจูด  $L_1$  กับ  $L_2$  ( $L_1 > L_2$ ) ตามลำดับ ก็คือ ค่า  $L_1 - L_2$  ถ้าจุดทั้งสองนั้นอยู่บนครึ่งทรงกลมเดียวกัน แต่ถ้าจุดทั้งสองนั้นอยู่ต่างครึ่งทรงกลมกัน แล้วค่าผลต่างนั้นคือ  $L_1 + L_2$

วงกลมเล็กที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร เราเรียกว่า แนวขนานของละติจูดหรือแนวขนาน (parallels of latitude or parallel) จุดทุก ๆ จุดบนแนวขนานเดียวกัน ย่อมมีค่าละติจูดเท่ากัน

**ลองจิจูด (longitude)** ของจุดใด ๆ บนผิวโลก ก็คือ มุมทรงกลมที่ขั้วโลกระหว่างเส้นเมริเดียนที่ผ่านจุดนั้น กับเส้นเมริเดียนเริ่มแรก มักเขียนแทนด้วย  $\lambda$  ค่าลองจิจูดของจุดใด ๆ อาจวัดไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกของเส้นเมริเดียนเริ่มแรก แล้วแต่ว่าจุด ๆ นั้นอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกของเส้นเมริเดียนเริ่มแรก ตามแต่กรณี โดยมีค่าระหว่าง  $0^\circ$  ถึง  $180^\circ$  ในรูป 6.1.1 ลองจิจูดของ  $A$  ก็คือ มุมเชิงทรงกลม  $G'P_1A'$  หรือ ก็คือส่วนโค้ง  $G'A'$  นั่นเอง

ผลต่างระหว่างลองจิจูด  $\lambda_1$  กับ  $\lambda_2$  ( $\lambda_1 > \lambda_2$ ) ตามลำดับ ก็คือ ค่า  $\lambda_1 - \lambda_2$  ถ้าจุดทั้งสองอยู่ห่างจากเส้นเมริเดียนเริ่มแรกไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าจุดทั้งสองอยู่ห่างจากเส้นเมริเดียนเริ่มแรกไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้ว ค่าผลต่างนั้นก็คือ ค่าที่น้อยกว่าระหว่าง  $\lambda_1 + \lambda_2$  กับค่า  $360^\circ - (\lambda_1 + \lambda_2)$  (ค่าใดน้อยกว่าก็นำค่านั้นมาใช้)

อนึ่ง เส้นศูนย์สูตรและเส้นเมริเดียนเริ่มแรกเปรียบเสมือนแกนโคออร์ดิเนต 2 แกนที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยเส้นศูนย์สูตรเปรียบเสมือนแกน X และเส้นเมริเดียนเริ่มแรกเปรียบเสมือนแกน Y ของระบบโคออร์ดิเนตพิกัดฉากในระนาบ ดังนั้น ค่าลองจิจูดและค่าละติจูดของจุด A ก็คือ โคออร์ดิเนตของจุด A ที่สอดคล้องกับแกนเส้นศูนย์สูตรและแกนเส้นเมริเดียนเริ่มแรก โดยค่าลองจิจูดเปรียบเสมือนกับค่าโคออร์ดิเนต x และค่าละติจูดก็เปรียบเสมือนกับค่าโคออร์ดิเนต y การกำหนดละติจูดเหนือและละติจูดใต้ ลองจิจูดตะวันออกและลองจิจูดตะวันตก ก็สมนัยกับเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบของค่าโคออร์ดิเนตของจุดในระนาบ เช่น


จุดที่มีลองจิจูด  $a^\circ$  ตะวันออก และละติจูด  $b^\circ$  เหนือ ก็เปรียบเสมือน จุด  $(a, b)$  ในระนาบ

จุดที่มีลองจิจูด  $a^\circ$  ตะวันตก และละติจูด  $b^\circ$  เหนือ ก็เปรียบเสมือนจุด  $(-a, b)$  ในระนาบ

จุดที่มีลองจิจูด  $a^\circ$  ตะวันตก และละติจูด  $b^\circ$  ใต้ ก็เปรียบเสมือนจุด  $(-a, -b)$  ในระนาบ

และจุดที่มีลองจิจูด  $a^\circ$  ตะวันออก และละติจูด  $b^\circ$  ใต้ ก็เปรียบเสมือนจุด  $(a, -b)$  ในระนาบ

**สามเหลี่ยมโลก (terrestrial triangle)** เส้นเมริเดียนที่ผ่านจุด 2 จุดบนพื้นผิวโลก และส่วนโค้งที่สั้นกว่าของวงกลมใหญ่ที่เชื่อมจุดทั้งสองนั้น จะทำให้เกิดสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม 2 รูป ดังรูป 6.1.2



รูป 6.1.2


จากรูป 6.1.2 ได้ว่า เส้นเมริเดียนที่ผ่านจุด A กับเส้นเมริเดียนที่ผ่านจุด B และส่วนโค้งที่สั้นกว่าของวงกลมใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง A กับ B (คือ ส่วนโค้ง AB) ทำให้เกิดสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม 2 รูป คือ สามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $P_1AB$  กับ  $P_2AB$  สามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $P_1AB$  นี้ มีชื่อเฉพาะเรียกว่า สามเหลี่ยมโลก (terrestrial triangle) ซึ่งสามเหลี่ยมโลกนี้จะนำไปใช้หา ระยะทาง (distance) ระหว่างจุดตามแนววงกลมใหญ่ (ความยาวของส่วนโค้ง AB) ซึ่งปกติมักกำหนดให้อยู่ในรูป “ไมล์ทะเล” (nautical miles)

โดย


$$\begin{aligned} 1 \text{ ลิบตาของส่วนโค้งวงกลมใหญ่} &= 1 \text{ ไมล์ทะเล} \\ &= 6,080 \text{ ฟุต} \end{aligned}$$

อนึ่ง ถ้าเรือ (หรืออากาศยาน) เคลื่อนที่ไปตามวงกลมใหญ่ระหว่างจุด 2 จุดแล้ว แนวทาง (course) ของเรือก็คือ มุมระหว่างเส้นเมริเดียนของเรือ กับวงกลมใหญ่นั้น โดยปกติ แนวทางจะวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก (วัดตามเข็มนาฬิกา)

ตัวอย่าง 6.1.1 พิจารณารูป 6.1.3 และรูป 6.1.4



รูป 6.1.3



รูป 6.1.4

ในรูป 6.1.3 เรือลำหนึ่งเดินทางจาก A ไปยัง B แนวทางเริ่มต้น (initial course) หรือแนวทางที่ A ก็คือ มุม  $P_1AB$  และแนวทางขณะถึง (course on arrival) หรือแนวทางที่ B ก็คือ มุม  $P_2BC$

ในรูป 6.1.4 เรือลำหนึ่งเดินทางจาก B ไป A แนวทางเริ่มต้น หรือแนวทางที่ B ก็คือ มุม  $P_2BA$  และแนวทางขณะถึง หรือแนวทางที่ A ก็คือมุม  $P_1AC$

ตัวอย่าง 8.1.2 จงหาผลต่างของลองจิจูดระหว่างสถานที่ต่อไปนี้

- 1.1) ซานฟรานซิสโกกับดาการ์
- 1.2) ซานฟรานซิสโกกับเมลเบิร์น
- 1.3) ดาการ์กับเคปทาวน์
- 1.4) เมลเบิร์นกับเคปทาวน์

เมื่อกำหนดให้

ซานฟรานซิสโก มี ลองจิจูด  $122^{\circ} 15' 42''$  ตะวันตก

ดาการ์ มี ลองจิจูด  $17^{\circ} 25'$  ตะวันตก

เมลเบิร์น มี ลองจิจูด  $144^{\circ} 58' 30''$  ตะวันออก

และ เคปทาวน์ มี ลองจิจูด  $18^{\circ} 26'$  ตะวันออก

วิธีทำ

1.1) เพราะซานฟรานซิสโกกับดาการ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน คือทิศตะวันตกทั้งคู่

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น } \lambda_1 - \lambda_2 &= 122^{\circ} 15' 42'' - 17^{\circ} 25' \\ &= 104^{\circ} 50' 42''\end{aligned}$$

1.2) เพราะวา ซานฟรานซิสโกกับเมลเบิร์นอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ซานฟรานซิสโกอยู่ทางทิศตะวันตก แต่เมลเบิร์นอยู่ทางทิศตะวันออก

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น } 360^{\circ} - (\lambda_1 + \lambda_2) &= 360^{\circ} - (122^{\circ} 15' 42'' + 144^{\circ} 58' 30'') \\ &= 360^{\circ} - 267^{\circ} 14' 12'' \\ &= 92^{\circ} 45' 48''\end{aligned}$$

1.3) เพราะวา ดาการ์กับเคปทาวน์อยู่ในทิศทางตรงกันข้าม

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น } \lambda_1 + \lambda_2 &= 17^{\circ} 25' + 18^{\circ} 26' \\ &= 35^{\circ} 51'\end{aligned}$$

1.4) เพราะวา เมลเบิร์นกับเคปทาวน์อยู่ในทิศทางเดียวกัน

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น } \lambda_1 - \lambda_2 &= 144^{\circ} 58' 30'' - 18^{\circ} 26' \\ &= 126^{\circ} 32' 30''\end{aligned}$$


ตัวอย่าง 8.1.3 จงหาระยะทาง (หน่วยเป็นไมล์ทะเล) ระหว่างสถานที่ A กับ B บนพื้นผิวโลก

เมื่อ A มี (ละติจูด  $30^{\circ} 25'$  เหนือ, ลองจิจูด  $40^{\circ}$  ตะวันตก)

และ B มี (ละติจูด  $75^{\circ} 10'$  เหนือ, ลองจิจูด  $40^{\circ}$  ตะวันตก)

**วิธีทำ**

พิจารณารูป 6.1.5



รูป 6.1.5

ในรูป 6.1.5 ได้ว่า

$$CA = 30^{\circ} 25' \text{ เหนือ และ } CB = 75^{\circ} 10' \text{ เหนือ}$$

$$\text{ดังนั้น } AB = CB - CA$$

$$= 75^{\circ} 10' - 30^{\circ} 25'$$

$$= 44^{\circ} 45'$$

$$= 2685'$$

จึงได้ว่า ระยะทางระหว่าง A กับ B คือ 2,685 ไมล์ทะเล

ตัวอย่าง 6.1.4 จงหาระยะทาง (หน่วยเป็นไมล์ทะเล) ระหว่างสถานที่ A กับ B บน


พื้นผิวโลก

เมื่อ A มี (ละติจูด  $30^{\circ} 25'$  ใต้, ลองจิจูด  $50^{\circ}$  ตะวันออก)

และ B มี (ละติจูด  $75^{\circ} 10'$  เหนือ, ลองจิจูด  $50^{\circ}$  ตะวันออก)

**วิธีทำ**

พิจารณารูป 6.1.6



รูป 6.1.6

ในรูป 6.1.6 ได้ว่า

$$CA = 30^{\circ} 25' \text{ เหนือ และ } CB = 75^{\circ} 10' \text{ เหนือ}$$

$$\text{ดังนั้น } AB = CA + CB$$

$$= 30^{\circ} 25' + 75^{\circ} 10'$$

$$= 105^{\circ} 35'$$

$$= 6335'$$

จึงได้ว่า ระยะทางระหว่าง A กับ B คือ 6,335 ไมล์ทะเล

### แบบฝึกหัด 6.1

1. จงหาผลต่างของลองจิจูดระหว่างสถานที่ต่อไปนี้

1.1) นิวยอร์กกับเฟิร์ลฮาเบอร์

1.2) นิวยอร์กกับมอสโคว์

1.3) นิวยอร์กกับซิดนีย์

1.4) ซิดนีย์กับมอสโคว์

เมื่อกำหนดให้

นิวยอร์กมีลองจิจูด  $74^{\circ} 1'$  ตะวันตก

เฟิร์ลฮาเบอร์มีลองจิจูด  $157^{\circ} 58' 18''$  ตะวันตก

มอสโคว์มีลองจิจูด  $37^{\circ} 34' 18''$  ตะวันออก

และซิดนีย์มีลองจิจูด  $151^{\circ} 13'$  ตะวันออก

2. จงหาระยะทาง (หน่วยเป็นไมล์ทะเล) ระหว่างสถานที่ A กับ B บนพื้นผิวโลก เมื่อ

2.1) A มี (ละติจูด  $40^{\circ} 40'$  เหนือ, ลองจิจูด  $120^{\circ}$  ตะวันตก)

และ B มี (ละติจูด  $75^{\circ} 25'$  เหนือ, ลองจิจูด  $120^{\circ}$  ตะวันตก)

2.2) A มี (ละติจูด  $50^{\circ} 20'$  เหนือ, ลองจิจูด  $80^{\circ}$  ตะวันตก)

และ B มี (ละติจูด  $30^{\circ} 50'$  ใต้, ลองจิจูด  $80^{\circ}$  ตะวันตก)


2.3) A มี (ละติจูด  $10^{\circ} 30'$  ใต้, ลองจิจูด  $40^{\circ}$  ตะวันออก)

และ B มี (ละติจูด  $50^{\circ} 20'$  ใต้, ลองจิจูด  $40^{\circ}$  ตะวันออก)



## 6.2 แนวทางและระยะทางของการเดินเรือตามแนวขนานของละติจูด

ในหัวข้อนี้ จะศึกษาถึงการหาแนวทางและระยะทางของการเดินเรือไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ตามวงกลมเล็กที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเราเรียกว่า ตามแนวขนานของละติจูด



รูป 6.2.1

ในรูป 6.2.1 สมมติว่าเรือลำหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออก โดยเริ่มต้นจากจุด D แล่นไปเป็นระยะทาง  $p$  ไมล์ทะเล ถึงจุด B เนื่องจากเรือลำนี้แล่นไปตามแนวขนานของละติจูด ค่าละติจูดของ B จึงเท่ากับค่าละติจูดของจุดเริ่มต้น D เราต้องการจะทราบค่าลองจิจูดของ B

ให้ค่าผลต่างของลองจิจูดระหว่าง B กับ D ซึ่งเขียนแทนด้วย  $DL_0$  นั้น วัดด้วยส่วนโค้ง  $FG$  ซึ่งเป็นระยะบนเส้นศูนย์สูตรที่เกิดจากเส้นเมริเดียนที่ผ่านจุด D และ B ตัดกับเส้นศูนย์สูตร ค่าผลต่างของลองจิจูดระหว่าง B กับ D นี้ จะเป็นลองจิจูดตะวันออกหรือตะวันตกนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เรือแล่น ว่าเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแล้วแต่กรณี

ในการหาลองจิจูดของ B นั้น เราจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะทางที่เรือแล่นตามส่วนโค้งจาก D ไป B (ซึ่งในที่นี้มีระยะ  $p$  ไมล์ทะเล) ให้เป็นค่าลิปดา (มีข้อนำสังเกตว่า เนื่องจากระยะทางนี้วัดตามแนวขนานของละติจูดหรือตามส่วนโค้งของวงกลมเล็ก ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ว่า 1 ไมล์ทะเล = 1 ลิปดา จึงไม่สอดคล้อง)

ในรูป 6.2.1 ลากเส้นเชื่อมจากจุด D และจุด B ไปยังจุด C ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็ก (แนวขนานของละติจูด) และลากเส้นเชื่อมจุด D, F และ G ไปยังจุด O ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ

ทรงกลมโลก และลากเส้น DH ไปตั้งฉากกับ OF จะสังเกตเห็นว่า มุม FOD คือ ค่าละติจูดของ D ซึ่งในที่นี้จะเขียนแทนด้วย L

เนื่องจาก  $\angle FOG = \angle DCB$  ดังนั้น ส่วนโค้ง FG กับส่วนโค้ง DB ย่อมเป็นสัดส่วนกับ รัศมีของวงกลม คือ OF และ CD ตามลำดับ

ดังนั้น

$$\frac{\text{ส่วนโค้ง FG}}{\text{ส่วนโค้ง DB}} = \frac{OF}{CD} = \frac{OD}{OH} = \sec L$$

$$\text{ส่วนโค้ง FG} = \text{ส่วนโค้ง DB} \times \sec L$$

$$\text{หรือ } DL_o = p \sec L$$

นั่นคือ

$$\begin{aligned} \text{ผลต่างของลองจิจูด (ลิปดา)} &= \text{ระยะทางตามแนวขนาน (ไมล์ทะเล)} \\ &\times \text{ซีแคนต์ของละติจูด} \end{aligned}$$

**ตัวอย่าง 6.2.1** เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $44^\circ 33'$  ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 55 ไมล์ทะเล จงหาว่าตำแหน่งที่เรือไปถึงนั้นได้เปลี่ยนค่าลองจิจูดไปเท่าไร?

**วิธีทำ**

จากรูป 6.2.1 ได้ว่า

$$P = 55 \text{ ไมล์ทะเล ไปทางทิศตะวันออก}$$

$$L = 44^\circ 30'$$

$$\text{จาก } DL_o = p \sec L$$

$$\text{ดังนั้น } DL_o = 55 \sec 44^\circ 30' \text{ ตะวันออก}$$

$$= \frac{55}{\cos 44^\circ 30'} \text{ ตะวันออก}$$

$$= \frac{55}{0.71325} \text{ ตะวันออก}$$

$$= 77.11' \text{ ตะวันออก}$$


$$= 1^\circ 17.11' \text{ ตะวันออก}$$

นั่นคือ ตำแหน่งที่เรือแล่นไปถึงนั้น ได้เปลี่ยนค่าลองจิจูดไป  $1^\circ 17.11'$  ตะวันออก

**ตัวอย่าง 6.2.2** เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $50^\circ$  เหนือ ไปทางทิศตะวันออก จนกระทั่งค่าลองจิจูดเปลี่ยนไป  $2^\circ 15'$  จงหาระยะทางตามแนวขนานนั้น

วิธีทำ

พิจารณารูป 6.2.2



รูป 6.2.2

จากรูป 6.2.2 ได้ว่า

$$\begin{aligned} DL_o &= 2^\circ 15' \\ &= 135' \text{ ตะวันออก} \end{aligned}$$

และ  $L = 50^\circ$

จาก  $DL_o = p \sec L$

ดังนั้น  $p = DL_o \times \cos L$

$$\begin{aligned} &= 135 \cos 50^\circ \\ &= (135)(0.64279) \\ &= 86.78 \text{ ไมล์ทะเล (ตะวันออก)} \end{aligned}$$


นั่นคือ เรือแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด เป็นระยะทาง 86.78 ไมล์ทะเล ทางทิศ ตะวันออก

## แบบฝึกหัด 6.2

1. เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $35^\circ$  เหนือ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 180 ไมล์ทะเล จงหาว่าตำแหน่งที่เรือไปถึงนั้นได้เปลี่ยนค่าลองจิจูดไปเท่าไร
  2. เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $42^\circ$  เหนือ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 220 ไมล์ทะเล จงหาว่าตำแหน่งที่เรือไปถึงมีค่าลองจิจูดเป็นเท่าไร
    - ถ้า 2.1) เรือเริ่มต้นออกจากลองจิจูด  $140^\circ$  ตะวันออก
    - 2.2) เรือเริ่มต้นออกจากลองจิจูด  $135^\circ$  ตะวันตก
  3. เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $42^\circ$  เหนือ ไปทางทิศตะวันตก จนกระทั่งค่าลองจิจูดเปลี่ยนไป  $5^\circ 45'$  จงหาระยะทางตามแนวขนานนั้น
  4. เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนวขนานของละติจูด  $20^\circ$  เหนือ ไปทางทิศตะวันออก จนกระทั่งค่าลองจิจูดเปลี่ยนไป  $13^\circ 45'$  จงหาระยะทางตามแนวขนานนั้น
-

### 6.3 แนวทางและระยะทางของการเดินเรือตามแนวราบ

สมมุติว่า เรือลำหนึ่งแล่นไปเป็นระยะทาง  $d$  ไมล์ทะเล ตามแนวของวงกลมใหญ่ จาก A ไปยัง B ดังรูป 6.3.1



รูป 6.3.1


ในรูป 6.3.1 จาก B ลากเส้นขนานของละติจูดไปตัดกับเส้นเมริเดียนที่ผ่าน A ณ จุด D และให้เส้นเมริเดียนที่ผ่าน A ไปตัดกับเส้นศูนย์สูตรที่ F กับให้เส้นเมริเดียนที่ผ่าน B ไปตัดกับเส้นศูนย์สูตรที่ G แล้วจะได้ว่า

$l$  = ส่วนโค้ง AD เป็นค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูดหรือผลต่างของละติจูด

และ  $p$  = ส่วนโค้ง DB เป็นระยะทางตามแนวขนาน (ขงละติจูด)

การพิจารณาระยะทางบนพื้นผิวโลกโดยปกติถ้าเป็นระยะทางยาว ๆ เราต้องพิจารณาเป็นส่วนโค้ง ทั้งนี้เนื่องจากผิวโลกเป็นทรงกลม แต่ถ้าระยะทางที่ใช้เป็นระยะทางสั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการคิดคำนวณ เราจึงมักใช้เป็นระยะทางบนพื้นราบ (plane) ดังนั้น โดยทั่ว ๆ ไป ถ้าระยะทางบนผิวโลกที่จะพิจารณาน้อยกว่า 200 ไมล์ทะเลเราก็จะใช้เป็นระยะทางบนพื้นราบ

ในพื้นที่ราบหรือระนาบ (plane) นี้ เส้นศูนย์สูตรและเส้นขนานของละติจูดจะแทนด้วยเส้นขนานตามแนวนอน ในขณะที่เส้นเมริเดียนซึ่งเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรนั้น ก็จะแทนด้วยเส้นขนานตามแนวตั้ง ดังรูป 6.3.2



รูป 6.3.2

ในรูป 6.3.2 จะได้ว่า

NAS เป็นเส้นเมริเดียนที่ผ่านจุด A

และ DB เป็นส่วนหนึ่งของเส้นขนานของละติจูดที่ผ่านจุด B

แล้ว  $d = AB$  เป็นระยะทางระหว่าง A กับ B

$p = DB$  เป็นระยะทางตามแนวขนาน (ของละติจูด)

$l = AD$  เป็นค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูด (ผลต่างของละติจูด)

และ  $C = \angle BAD$  เป็นมุมของแนวทาง (course angle)

จากสามเหลี่ยมมุมฉาก ABD ซึ่งมี D เป็นมุมฉาก

จะได้ว่า

$$(1) \quad l = d \cos C$$

$$(2) \quad p = d \sin C$$


$$(3) \quad \tan C = \frac{p}{l}$$

ค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูด จะเป็นค่าเหนือหรือใต้ นั้น เป็นไปตาม B ว่าอยู่ทางเหนือหรืออยู่ทางใต้ของ A ในรูป 6.3.2 ได้ว่า ค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูด คือ  $l$  ไมล์ทะเล เหนือ หรือ  $l$  ลิบตา เหนือ, ระยะทางตามแนวขนานละติจูด คือ  $p$  ไมล์ทะเลตะวันออก และแนวทาง (ของการเดินเรือ) คือ  $C^\circ$  (หรือ เหนือ  $C^\circ$  ตะวันออก)

**ตัวอย่าง 6.3.1** เรือลำหนึ่งแล่นไปในแนวทาง  $30^\circ$  (หรือ เหนือ  $30^\circ$  ตะวันออก) จากจุด A ซึ่งมี (ละติจูด  $45^\circ$  เหนือ, ลองจิจูด  $70^\circ$  ตะวันตก) ไปเป็นระยะทาง 120 ไมล์ทะเล ถึงจุด B จงหาระยะทางตามแนวขนาน และละติจูดของจุด B

**วิธีทำ**

พิจารณารูป 6.3.3



รูป 6.3.3

จากรูป 6.3.3 ABD เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมี D เป็นมุมฉาก โจทย์กำหนดให้  $d = 120$ ,  $\angle C = 30^\circ$  จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} p &= d \sin C \\ &= 120 \sin 30^\circ \\ &= 60 \text{ ไมล์ทะเล ตะวันออก} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} l &= d \cos C \\ &= 120 \cos 30^\circ \\ &= 103.9 \text{ ไมล์ทะเล เหนือ} \end{aligned}$$


ดังนั้น ค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูด คือ  $103.9' = 1^\circ 44'$

และค่าละติจูดของ B คือ  $45^\circ + 1^\circ 44' = 46^\circ 44'$  เหนือ

ตัวอย่าง 6.3.2 เครื่องบินลำหนึ่งบินจาก A ไป B โดยมีค่าเปลี่ยนแปลงของละติจูด (หรือผลต่างของละติจูด) เป็น  $l = 80$  ไมล์ทะเล ได้ และมีระยะทางตามแนวขนานเป็น 115 ไมล์ทะเล ตะวันออก จงหาแนวทางและระยะทางของเครื่องบิน ในการบินครั้งนี้

วิธีทำ

พิจารณารูป 6.3.4



รูป 6.3.4

จากรูป 6.3.4 ABD เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมี  $l$  เป็นมุมฉาก และโจทย์กำหนดให้  $p = 115$ ,  $l = 80$

$$\begin{aligned} \text{จาก} \quad \tan C &= \frac{p}{l} \\ &= \frac{115}{80} \\ &= 1.4375 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \angle C = 55^\circ 11'$$

จึงกล่าวได้ว่า แนวทางของการบินเป็นมุม ได้  $55^\circ 11'$  ตะวันออก หรือเป็นมุม  $180^\circ - 55^\circ 11'$   
 $= 124^\circ 49'$  หรือเหนือ  $124^\circ 49'$  ตะวันออก

$$\begin{aligned} \text{และ จาก} \quad d &= \frac{l}{\cos C} \\ &= \frac{80}{\cos 55^\circ 11'} \\ &= 140.1 \text{ ไมล์ทะเล} \end{aligned}$$

จึงได้ว่า เครื่องบินบินไปเป็นระยะทาง 140.1 ไมล์ทะเล




### แบบฝึกหัด 6.3


1. เรือลำหนึ่งแล่นไปในแนวทาง  $245^{\circ} 10'$  (หรือ ได้  $65^{\circ} 10'$  ตะวันตก) จากซานฟรานซิสโก ซึ่งมีละติจูด  $37^{\circ} 50'$  เหนือ ไปเป็นระยะทาง 150 ไมล์ทะเล จงหาระยะทางตามแนวขนานของเรือ และค่าละติจูดของจุดที่เรือแล่นไปถึง
  2. เรือลำหนึ่งแล่นไปเป็นระยะทาง 125 ไมล์ทะเล ในแนวทาง  $42^{\circ} 40'$  จากจุด A ซึ่งมีละติจูด  $40^{\circ}$  เหนือ จงหาระยะทางตามแนวขนาน และค่าละติจูดของจุดที่เรือไปถึง
  3. เรือลำหนึ่งแล่นไปในแนวทาง  $160^{\circ}$  จากจุด A ซึ่งมีละติจูด  $52^{\circ} 20'$  ได้ ไปยังจุด B ซึ่งมีละติจูด  $56^{\circ} 40'$  ได้ จงหาระยะทางของการเดินเรือจาก A ไป B และระยะทางตามแนวขนานของเรือ
  4. ถ้า B เป็นจุดที่อยู่ทาง 125 ไมล์ทะเล ตะวันตก และ 90 ไมล์ทะเล เหนือ ของจุด A แล้ว จงหาระยะทางจาก A ถึง B และแนวทางในการเดินเรือจาก A ไปยัง B
-

## 6.4 แนวทางและระยะทางของการเดินเรือตามแนววงกลมใหญ่


ในการเดินเรือตามแนวของวงกลมใหญ่จากจุด A ถึงจุด B ดังรูป 6.4.1, รูป 6.4.2 และรูป 6.4.3 เป็นการเดินเรือตามแนวของส่วนที่สั้นกว่าของวงกลมใหญ่ จาก A ถึง B ปัญหาพื้นฐานของการเดินเรือตามแนวของวงกลมใหญ่ ก็คือ การหาระยะทางจาก A ถึง B และการหาทิศทางของการเดินทางที่จุดใด ๆ



รูป 6.4.1



รูป 6.4.2



รูป 6.4.3

ปัญหาของการเดินเรือตามแนวของวงกลมใหญ่นี้ จำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาของสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม (โดยปกติมักจะเป็นสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง) มาช่วยแก้ปัญหา โดยสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมนี้จะมีขั้วเหนือหรือขั้วใต้ขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นจุดยอด โดยถ้าจุด A และ B อยู่ในครึ่งทรงกลมเดียวกันแล้ว จะใช้จุดขั้วของครึ่งทรงกลมนั้นเป็นจุดยอด แต่ถ้า A กับ B อยู่คนละครึ่งทรงกลมแล้ว อาจจะใช้ขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นจุดยอดก็ได้

ในรูป 6.4.1 จุด A และจุด B อยู่ในครึ่งทรงกลมเหนือทั้งคู่ โดยในสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $AP_nB$  มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

$$b = \text{ส่วนโค้ง } AP_n = 90^\circ - \text{ละติจูด } A$$

$$a = \text{ส่วนโค้ง } BP_n = 90^\circ - \text{ละติจูด } B$$

$$\text{และ } DL_o = \angle AP_nB = \text{ผลต่างระหว่างลองจิจูด } A \text{ กับ } B$$

ในรูป 6.4.2 จุด A อยู่ในครึ่งทรงกลมใต้ และจุด B อยู่ในครึ่งทรงกลมเหนือ โดยในสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $AP_nB$  มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

$$b = \text{ส่วนโค้ง } AP_n = 90^\circ + \text{ละติจูด } A$$

$$a = \text{ส่วนโค้ง } BP_n = 90^\circ - \text{ละติจูด } B$$

$$\text{และ } DL_o = \angle AP_nB = \text{ผลต่างระหว่างลองจิจูด } A \text{ กับ } B$$

ในขณะที่สามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $AP_nB$  มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

$$b' = \text{ส่วนโค้ง } AP_s = 90^\circ - \text{ละติจูด } A$$

$$a' = \text{ส่วนโค้ง } BP_s = 90^\circ + \text{ละติจูด } B$$

$$\text{และ } DL_o = \angle AP_sB = \text{ผลต่างระหว่างลองจิจูด } A \text{ กับ } B$$

ในรูป 6.4.3 จุด A และจุด B อยู่ในครึ่งทรงกลมใต้ทั้งคู่ โดยในสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม  $AP_nB$  มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

$$b = \text{ส่วนโค้ง } AP_n = 90^\circ - \text{ละติจูด } A$$

$$a = \text{ส่วนโค้ง } BP_n = 90^\circ - \text{ละติจูด } B$$

$$\text{และ } DL_o = \angle AP_nB = \text{ผลต่างระหว่างลองจิจูด } A \text{ กับ } B$$

โดยในแต่ละรูป (รูป 6.4.1, รูป 6.4.2 และรูป 6.4.3) มี

$$d = \text{ส่วนโค้ง } AB = \text{ระยะบนวงกลมใหญ่ระหว่าง } A \text{ กับ } B$$

$$\angle P_nAB = \text{แนวทางเริ่มต้น}$$


$$\text{และ } \angle P_nBC = \text{แนวทางขณะถึง}$$

ตัวอย่าง 6.4.1 เรือลำหนึ่งแล่นไปตามแนววงกลมใหญ่ จากท่าเรือดัตช์ (Dutch Harbor) ซึ่งมี (ละติจูด  $53^{\circ} 53'$  เหนือ, ลองจิจูด  $166^{\circ} 35'$  ตะวันตก) ไปยังเมลเบิร์น (Melbourne) ซึ่งมี (ละติจูด  $37^{\circ} 50'$  ใต้, ลองจิจูด  $144^{\circ} 59'$  ตะวันออก)

- 1) จงหาระยะทาง, แนวทางเริ่มต้น และแนวทางขณะถึง
- 2) จงหาจุดตัดของเส้นทางเดินเรือกับเส้นศูนย์สูตร, จงหาแนวทางที่จุดตัดนี้ และจงหาระยะทางระหว่างจุดตัดนี้กับท่าเรือดัตช์
- 3) จงหาจุดบนเส้นทางเดินเรือ ในขณะที่เรือมีค่าลองจิจูด  $180^{\circ}$ , จงหาแนวทางที่จุดนี้ และจงหาระยะทางระหว่างจุดนี้กับท่าเรือดัตช์

วิธีทำ

- 1) ในรูป 6.4.4 A คือท่าเรือดัตช์ และ B คือเมลเบิร์น



รูป 6.4.4

แล้ว

$$\begin{aligned} b &= 90^{\circ} - \text{ละติจูด A} \\ &= 90^{\circ} - 53^{\circ} 53' \\ &= 36^{\circ} 7' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 90^{\circ} + \text{ละติจูด B} \\ &= 90^{\circ} + 37^{\circ} 50' \\ &= 127^{\circ} 50' \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} C &= \text{ผลต่างระหว่างลองจิจูดของ A กับ B} \\ &= 360^{\circ} - (166^{\circ} 35' + 144^{\circ} 59') \\ &= 48^{\circ} 26' \end{aligned}$$

ดังนั้น จากรูปสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม ABC เราต้องการหา A, B และ C ซึ่งหาได้โดยใช้  
สูตรการอุปมานของเนเปียร์ คือ

$$\tan \frac{1}{2}(A+B) = \frac{\cos \frac{1}{2}(a-b)}{\cos \frac{1}{2}(a+b)} \cot \frac{1}{2}C \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\tan \frac{1}{2}(A-B) = \frac{\sin \frac{1}{2}(a-b)}{\sin \frac{1}{2}(a+b)} \cot \frac{1}{2}C \quad \dots\dots\dots(2)$$

และ  $\tan \frac{1}{2}c = \frac{\sin \frac{1}{2}(A+B)}{\sin \frac{1}{2}(A-B)} \tan \frac{1}{2}(a-b) \quad \dots\dots\dots(3)$

โดย A, B หาได้จาก (1), (2) และ c หาได้จาก (3)  
จาก (1) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \tan \frac{1}{2}(A+B) &= \frac{\cot \frac{1}{2}(a-b)}{\cos \frac{1}{2}(a+b)} \cot \frac{1}{2}C \\ &= \frac{(\cos 45^\circ 51' 30'')}{(\cos 81^\circ 58' 30'')} (\cot 24^\circ 13') \\ &= \frac{(0.69644)}{(0.13961)} (2.2234) \\ &= 11.09136 \\ \therefore \frac{1}{2}(A+B) &= \tan^{-1}(11.09136) \\ &= 84^\circ 50' 53'' \quad \dots\dots\dots(4) \end{aligned}$$

จาก (2) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \tan \frac{1}{2}(A-B) &= \frac{\sin \frac{1}{2}(a-b)}{\sin \frac{1}{2}(a+b)} \cot \frac{1}{2}C \\ &= \frac{(\sin 45^\circ 51' 30'')}{(\sin 81^\circ 58' 30'')} (\cot 24^\circ 13') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(0.71762)}{(0.99021)} (2.2234) \\
&= 1.61133 \\
\therefore \frac{1}{2}(A - B) &= \tan^{-1}(1.61133) \\
&= 58^\circ 10' 32'' \quad \dots\dots\dots(5)
\end{aligned}$$

(4) + (5) ได้  $A = 143^\circ 1' 22''$

(4) - (5) ได้  $B = 26^\circ 40' 21''$

จาก (3) ได้ว่า

$$\begin{aligned}
\tan \frac{1}{2}c &= \frac{\sin \frac{1}{2}(A + B)}{\sin \frac{1}{2}(A - B)} \tan \frac{1}{2}(a - b) \\
&= \frac{(\sin 84^\circ 50' 51'')}{(\sin 58^\circ 10' 30'')} (\tan 45^\circ 51' 30'') \\
&= \frac{(0.99596)}{(0.84966)} (1.0304) \\
&= 1.2078 \\
\frac{1}{2}c &= \tan^{-1}(1.2078) \\
&= 50^\circ 22' 34'' \\
\therefore c &= 100^\circ 45' 8''
\end{aligned}$$

ดังนั้น จึงได้ว่า

(i) ระยะทางที่ต้องการคือ  $100^\circ 45' 8'' = 6045.13$  ไมล์ทะเล


(ii) แนวทางเริ่มต้น คือ

$$360^\circ - 143^\circ 1' 22'' = 216^\circ 58' 38'' \text{ หรือเหนือ } 216^\circ 58' 38'' \text{ ตะวันออก}$$

(iii) แนวทางขณะถึง คือ

$$180^\circ + 26^\circ 40' 21'' = 206^\circ 40' 21'' \text{ หรือเหนือ } 206^\circ 40' 21'' \text{ ตะวันออก}$$

2) ในรูป 6.4.5 A คือ ท่าเรือดัชท์ B คือ เมลเบอร์น



รูป 6.4.5

และให้ D เป็นจุดตัดของเส้นทางเดินเรือกับเส้นศูนย์สูตร, G เป็นจุดตัดของเส้นเมริเดียน  
ที่ผ่าน A กับเส้นศูนย์สูตร

พิจารณารูปสามเหลี่ยมเชิงทรงกลม AGD ซึ่งมี  $G = 90^\circ$  และ

$$d = \text{ส่วนโค้ง } GA = 53^\circ 53'$$

$$\begin{aligned} A = \angle DAG &= 180^\circ - 143^\circ 1' 22'' \\ &= 36^\circ 58' 38'' \end{aligned}$$

ต้องการหา a, D และ g

โดยกฎของเนเปียร์ จะได้ว่า

$$\tan a = \sin d \tan A \quad \dots\dots\dots(6)$$

$$\cos D = \cos d \sin A \quad \dots\dots\dots(7)$$

$$\tan g = \frac{\tan d}{\cos A} \quad \dots\dots\dots(8)$$

จาก (6) ได้ว่า

$$\begin{aligned} \tan a &= \sin 53^\circ 53' \tan 36^\circ 58' 38'' \\ &= (0.80782)(0.75293) \\ &= 0.60823 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a &= \tan^{-1}(0.60823) \\ &= 31^\circ 18' 33'' \end{aligned}$$

จาก (7) ได้ว่า

$$\begin{aligned}\cos D &= \cos d \sin A \\ &= (\cos 53^\circ 53')(\sin 36^\circ 58' 38'') \\ &= (0.58943)(0.60149) \\ &= 0.35453\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore D &= \cos^{-1}(0.35453) \\ &= 69^\circ 14' 7''\end{aligned}$$

จาก (8) ได้ว่า

$$\begin{aligned}\tan g &= \frac{\tan d}{\cos A} \\ &= \frac{\tan 53^\circ 53'}{\cos 36^\circ 58' 38''} \\ &= \frac{1.3705}{0.79888} \\ &= 1.7155\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore g &= \tan^{-1}(1.7155) \\ &= 59^\circ 45' 40''\end{aligned}$$

ดังนั้น จึงได้ว่า

(i) จุดตัดของเส้นทางเดินเรือกับเส้นศูนย์สูตร (หรือจุด D) มีค่าลองจิจูดเท่ากับ  $166^\circ 35' + 31^\circ 18' 33'' = 197^\circ 53' 33''$  ตะวันตก =  $360^\circ - 197^\circ 53' 33''$  ตะวันออก หรือ  $162^\circ 6' 27''$  ตะวันออก

นั่นคือ จุดตัดของเส้นทางเดินเรือกับเส้นศูนย์สูตร มีค่าลองจิจูดเท่ากับ  $197^\circ 53' 33''$  ตะวันตก หรือ  $162^\circ 6' 27''$  ตะวันออก

(ii) แนวทางที่จุดตัด D คือ  $180^\circ + 20^\circ 45' 53'' = 200^\circ 45' 53''$


นั่นคือ แนวทางที่จุด D คือ  $200^\circ 45' 53''$

(iii) ระยะทางระหว่างจุด D กับท่าเรือดัลซ์ (A) คือ ค่า  $g = 59^\circ 45' 40'' = 3585.66'$   
 $= 3585.66$  ไมล์ทะเล

นั่นคือ ระยะทางระหว่างจุด D กับท่าเรือดัลซ์ คือ  $3585.66$  ไมล์ทะเล



3) ในรูป 6.4.6 ให้ A เป็นท่าเรือดัชท์ B คือ เมลเบอร์น และ M เป็นจุดบนเส้นทางเดินเรือที่มีค่าองศาจุด 180°



รูป 6.4.6

พิจารณาสองเหลี่ยมเชิงทรงกลม AMC

ซึ่งมี  $C = 180^\circ - 166^\circ 35' = 13^\circ 25'$

$A = 143^\circ 1' 22''$

และ  $m = 90^\circ - 53^\circ 53' = 36^\circ 7'$

ในที่นี้ ต้องการหา a, c, M

โดยสูตรการอุปมานของเนเปียร์ จะได้ว่า

$$\tan \frac{1}{2}(a+c) = \frac{\cos \frac{1}{2}(A-C)}{\cos \frac{1}{2}(A+C)} \tan \frac{1}{2}m \quad \dots\dots\dots(9)$$

$$\tan \frac{1}{2}(a-c) = \frac{\sin \frac{1}{2}(A-C)}{\sin \frac{1}{2}(A+C)} \tan \frac{1}{2}m \quad \dots\dots\dots(10)$$

และ  $\cot \frac{1}{2}M = \frac{\sin \frac{1}{2}(a+c)}{\sin \frac{1}{2}(a-c)} \tan \frac{1}{2}(A-C) \quad \dots\dots\dots(11)$

โดย a, c หาได้จาก (9), (10) และ M หาได้จาก (11)

จาก (9) ได้ว่า

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(a+c) &= \frac{\cos \frac{1}{2}(A-C)}{\cos \frac{1}{2}(A+C)} \tan \frac{1}{2} m \\ &= \frac{\cos 64^{\circ} 48' 11''}{\cos 78^{\circ} 13' 11''} \tan 18^{\circ} 3' 30'' \\ &= \frac{0.42570}{0.20416} (0.32604) \\ &= 0.67983\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{2}(a+c) &= \tan^{-1}(0.67983) \\ &= 34^{\circ} 12' 33'' \qquad \dots\dots\dots(12)\end{aligned}$$

จาก (10) ได้ว่า

$$\begin{aligned}\tan \frac{1}{2}(a-c) &= \frac{\sin \frac{1}{2}(A-C)}{\sin \frac{1}{2}(A+C)} \tan \frac{1}{2} m \\ &= \frac{\sin 64^{\circ} 48' 11''}{\sin 78^{\circ} 13' 11''} \tan 18^{\circ} 3' 30'' \\ &= \frac{0.90485}{0.97894} (0.32604) \\ &= 0.30136\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{2}(a-c) &= \tan^{-1}(0.30136) \\ &= 16^{\circ} 46' 15'' \qquad \dots\dots\dots(13)\end{aligned}$$

(12) + (13) ได้

$$a = 50^{\circ} 58' 48''$$

(12) - (13) ได้

$$c = 17^{\circ} 26' 18''$$

จาก (11) ได้ว่า

$$\cot \frac{1}{2} M = \frac{\sin \frac{1}{2}(a+c)}{\sin \frac{1}{2}(a-c)} \tan \frac{1}{2}(A-C)$$

$$= \frac{\sin 34^\circ 12' 33''}{\sin 16^\circ 46' 15''} (\tan 64^\circ 48' 11'')$$

$$= \frac{0.56221}{0.28853} (2.1254)$$

$$= 4.1414$$

$$\frac{1}{2}M = \cot^{-1}(4.1414)$$

$$= 13^\circ 34' 30''$$

$$\therefore M = 27^\circ 9'$$

ดังนั้น จึงได้ว่า

(i) ละติจูดของจุด M ซึ่งเป็นจุดบนเส้นทางเดินเรือที่ต้องการคือ  
 $(90^\circ - a)$  เหนือ  $= 90^\circ - 50^\circ 58' 48''$  เหนือ  $= 39^\circ 1' 12''$  เหนือ

(ii) แนวทางที่จุด M คือ  $180^\circ + 27^\circ 9' = 207^\circ 9'$

(iii) ระยะทางระหว่างจุด M กับท่าเรือดัทช์ (A) คือ  $17^\circ 26' 18'' = 1046.3' = 1046.3$   
 ไมล์ทะเล

#### แบบฝึกหัด 6.4

1. จงหาระยะทาง, แนวทางเริ่มต้น และแนวทางขณะถึง ในการเดินทางจากโฮโนลูลู ซึ่งมี (ละติจูด  $21^{\circ} 18' 18''$  เหนือ, ลองจิจูด  $157^{\circ} 52' 18''$  ตะวันตก) ไปยังซานฟรานซิสโก ซึ่งมี (ละติจูด  $37^{\circ} 47' 30''$  เหนือ, ลองจิจูด  $122^{\circ} 25' 42''$  ตะวันตก)
2. เรือลำหนึ่งแล่นออกจากนิวยอร์ก ซึ่งมี (ละติจูด  $40^{\circ} 48' 36''$  เหนือ, ลองจิจูด  $73^{\circ} 57' 30''$  ตะวันตก) ไปตามวงกลมใหญ่ด้วยแนวทางเริ่มต้น  $36^{\circ}$ 
  - 2.1) จงหาละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งที่เรือเดินทางไปได้ 500 ไมล์ทะเล
  - 2.2) จงบอกจุดเหนือสุด (northern-most point) ของเส้นทางเดินเรือ
3. จงหาระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่าง
  - 3.1) ซิดคาโก ซึ่งมี (ละติจูด  $41^{\circ} 50'$  เหนือ, ลองจิจูด  $87^{\circ} 37'$  ตะวันตก) กับท่าเรือดัทช์ ซึ่งมี (ละติจูด  $53^{\circ} 54'$  เหนือ, ลองจิจูด  $166^{\circ} 30'$  ตะวันตก)
  - 3.2) นิวยอร์ก ซึ่งมี (ละติจูด  $40^{\circ} 43'$  เหนือ, ลองจิจูด  $74^{\circ}$  ตะวันตก) กับบริโอเดจาเนโร ซึ่งมี (ละติจูด  $22^{\circ} 54'$  ใต้, ลองจิจูด  $43^{\circ} 11'$  ตะวันตก)
  - 3.3) ท่าเรือดัทช์กับบริโอเดจาเนโร
4. จงหาระยะทางตามแนววงกลมใหญ่, แนวทางเริ่มต้น และแนวทางขณะถึง ในการเดินทางจากวอชิงตัน ซึ่งมี (ละติจูด  $38^{\circ} 55'$  เหนือ, ลองจิจูด  $77^{\circ} 4'$  ตะวันตก) ไปยังมอสโคว์ ซึ่งมี (ละติจูด  $55^{\circ} 45'$  เหนือ, ลองจิจูด  $37^{\circ} 34'$  ตะวันออก)
5. จงหาระยะทางตามแนววงกลมใหญ่, แนวทางเริ่มต้น และแนวทางขณะถึง ในการเดินทางจากกัลกัตตา ซึ่งมี (ละติจูด  $22^{\circ} 35'$  เหนือ, ลองจิจูด  $88^{\circ} 27'$  ตะวันออก) ไปยังเมลเบิร์น ซึ่งมี (ละติจูด  $37^{\circ} 48'$  ใต้, ลองจิจูด  $144^{\circ} 58'$  ตะวันออก)
6. จงหาตำแหน่งของเรือในโจทย์ข้อ 5. เมื่อเรือแล่นผ่านเส้นศูนย์สูตร และจงหาระยะทางจากจุดที่เรือแล่นผ่านเส้นศูนย์สูตรกับกัลกัตตา
7. เครื่องบินลำหนึ่งบินจากโฮโนลูลู ซึ่งมี (ละติจูด  $21^{\circ} 18'$  เหนือ, ลองจิจูด  $157^{\circ} 52'$  ตะวันตก) ด้วยแนวทาง  $40^{\circ} 43'$ 
  - 7.1) จงหาจุดบนเส้นทางการบินที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด
  - 7.2) จงหาตำแหน่งบนเส้นทางการบิน เมื่อมีค่าลองจิจูดเป็น  $74^{\circ}$  ตะวันตก