

## บทที่ 13

### มวลอากาศ แนวปะทะอากาศและไซโคลน

- 13.1 มวลอากาศ (Air Masses)
- 13.2 แนวปะทะอากาศ (Fronts)
  - 13.2.1 แนวปะทะอากาศอุ่น (Warm Fronts)
  - 13.2.2 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Fronts)
  - 13.2.3 แนวปะทะอากาศที่ไม่เคลื่อนที่ (Stationary Fronts)
  - 13.2.4 แนวปะทะอากาศสวอครูด (Occluded Fronts)
- 13.3 เวนไซโคลน (Wave Cyclone)
  - 13.3.1 วงจรชีวิตของเวฟไซโคลน (Life Cycle of Wave Cyclone)
  - 13.3.2 ลักษณะกาลอากาศของเวฟไซโคลน  
(Idealized Weather of a Wave Cyclone)
  - 13.3.3 การกำเนิดไซโคลน (Cyclogenesis)

การหมุนวนโดยทั่วไป (general circulation) ของบรรยากาศสามารถพูดได้ว่าเป็นการอธิบาย ถึงลักษณะความกดและลมโดยเฉลี่ยบนพื้นโลกนั่นเอง อย่างไรก็ตามที่เวลาหนึ่งเวลาใด โดยเฉพาะรูปร่างของเส้นไอโซบาร์ ลม อุณหภูมิ และลักษณะสำคัญของกาลอากาศอื่น ๆ ก็สามารถแตกต่างออกไปจากค่าเฉลี่ยได้


สภาวะของบรรยากาศจะถูกตรวจโดยสถานีตรวจอากาศทั่วโลกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด สถานีเหล่านี้จะวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศความเร็วลมและความชื้นใกล้พื้นดินและรวมทั้งสังเกตภาวะของท้องฟ้าด้วย เจ้าหน้าที่สถานีจะบันทึกชนิดและจำนวนของเมฆรวมทั้งลักษณะของกาลอากาศเช่นฝนหิมะ พายุแลและฟ้าร้องเป็นต้น ทุก ๆ 3 ชั่วโมงข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งออกไปในรูปของรหัสโดยผ่าน โทรพิมพ์ (teletype) และวิทยุไปยังศูนย์กลางของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ซึ่งจะใช้สำหรับสร้างแผนที่อากาศซินอปติก (synoptic chart) ขึ้น เพื่อแสดงสภาวะอากาศที่ระดับนี้ทะเล

ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่พลอต (plot) บนแผนที่อากาศผิวพื้นจะมีวิธีเขียนรูปแบบ โดยเฉพาะ ตามรูป 13.1 เป็นแบบอย่างการแสดงผลที่ได้จากการตรวจอากาศ บางครั้ง การแสดงผลปริมาณ (quantities) จะตัดทิ้งไป รายการที่สำคัญที่สุดจะเป็นทิศทางลมและความเร็วลม ความกดอากาศ (ppp) ความกดที่เปลี่ยนแปลง (ppe) อุณหภูมิของภาค (TT) อุณหภูมิของจุดน้ำค้าง ( $T_d$   $T_d$ ) ลักษณะอากาศในปัจจุบัน (PW) และจำนวนเมฆทั้งหมดที่ครอบคลุมท้องฟ้า ทิศทางของลมแสดงโดยลูกศร โดยที่หางลูกศรจะหมายถึงทิศทางพัดมาส่วนความเร็วลมแสดงโดย บั้ง (barbs) บนลูกศร ชนิดของเมฆ ( $C_H$ ,  $C_M$ ,  $C_L$ ) และลักษณะอากาศที่ผ่านมา (past weather) (W) จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ (symbols) สำหรับเมฆสูง เมฆชั้นกลางและเมฆต่ำ จะมีรายการอยู่ 10 ชนิด และจะมีรายการของสภาพกาลอากาศที่ผ่านมาแล้วอยู่ 100 ชนิด สำหรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนแผนที่ดูได้จากตารางที่ 13.1 13.2 13.3 13.4


### 13.1 มวลอากาศ

มวลอากาศให้คำจำกัดความว่าเป็นปริมาณอันกว้างใหญ่ของอากาศซึ่งอาจจะกว้างถึง 1000 กิโลเมตรและหนาหลายกิโลเมตร โดยที่มีคุณสมบัติของอุณหภูมิและความชื้นเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) ในแนวนอน มวลอากาศจะค่อย ๆ สร้างคุณสมบัติของตัวเองขึ้น โดยการอยู่หนึ่งเหนือพื้นที่เฉพาะอันหนึ่ง (particular region) บนพื้นโลกเป็นเวลานานเพื่อที่จะทำให้การกระจายของอุณหภูมิและความชื้น ในแนวตั้งถึงจุดสมดุลกับพื้นผิวเบื้องล่าง

มวลอากาศสามารถจำแนกตามเส้นละติจูดหรือเขตภูมิศาสตร์ที่อากาศนั้นกำเนิด ซึ่งการแบ่งแบบนี้จะบอกถึงลักษณะอุณหภูมิของแหล่งกำเนิด (source region) นั่นเอง โดยให้ T หมายถึงบริเวณเขตร้อน (Tropic) P หมายถึงขั้วโลก (Polar) และ A หมายถึงบริเวณอาร์คติกหรือแอนตาร์คติก สำหรับคุณสมบัติความชื้นของมวลอากาศจะใช้อักษรย่อ c ซึ่งหมายถึง



A




B


รูป 13.1 (A) แบบของสถานีที่ใช้ในการพล็อตข้อมูลบนแผนที่พื้นผิวหรือแผนที่ที่ระดับน้ำทะเล  
 (B) ตัวอย่างของการพล็อต


**สัญลักษณ์ของกาลอากาศ**


**Air Pressure Tendency**


**Cloud Abbreviations**


- 


Rising, then falling; same as or higher than 3 hours ago  
Barometric pressure now higher than 3 hours ago
- 


Rising; then steady; or rising, then rising more slowly
- 


Rising steadily, or unsteadily
- 

Falling or steady, then rising; or rising, then rising more rapidly
- 

Steady; same as 3 hours ago
- 

Falling, then rising; same as or lower than 3 hours ago  
Barometric pressure now lower than 3 hours ago
- 

Falling, then steady; or falling, then falling more slowly
- 

Falling steadily, or unsteadily
- 

Steady or rising, then falling; or falling, then falling more rapidly

- St—Stratus
- Fra—Fractus
- Sc—Stratocumulus
- Cu—Cumulus
- Cb—Cumulonimbus
- Ac—Alto cumulus
- Ns—Nimbostratus
- As—Altostratus
- Ci—Cirrus
- Cs—Cirrostratus
- Cc—Cirro cumulus

**ตารางที่ 13.1**    **คอลัมน์ทางซ้ายเป็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความกด**    **และคอลัมน์ทางขวาเป็นอักษรย่อของเมฆ**

Cloud Cover

Wind Speed

Fronts

Cloud Cover	Wind Speed	Fronts			
		Knots	Miles per hour	Kilometers per hour	
No clouds		Calm	Calm	Calm	<p>Fronts are shown on surface weather maps by the symbols below. (Arrows—not shown on maps—indicate direction of motion of front.)</p> Cold front (surface) Warm front (surface) Occluded front (surface) Stationary front (surface) Warm front (aloft) Cold front (aloft)
One-tenth or less					
Two-tenths or three-tenths		1-2	1-2	1-3	
Four-tenths		3-7	3-8	4-13	
Five-tenths		8-12	9-14	14-19	
Six-tenths		13-17	15-20	20-32	
Seven-tenths or eight-tenths		18-22	21-25	33-40	
Nine-tenths or overcast with openings		23-27	26-31	41-50	
Completely overcast (ten-tenths)		28-32	32-37	51-60	
Sky obscured		33-37	38-43	61-69	
		38-42	44-49	70-79	
		43-47	50-54	80-87	
		48-52	55-60	88-96	
		53-57	61-66	97-106	
		58-62	67-71	107-114	
		63-67	72-77	115-124	
		68-72	78-83	125-134	
		73-77	84-89	135-143	
		103-107	119-123	192-198	



















































ตารางที่ 13.2

คอลัมน์ทางซ้ายเป็นจำนวนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า คอลัมน์ตรงกลางเป็นความเร็วของลม ส่วนคอลัมน์ทางขวาสุดเป็นสัญลักษณ์ของแนวปะทะอากาศต่าง ๆ

Cloud Types

	Cu of fair weather, little vertical development and seemingly flattened		Thin As (most of cloud layer semi-transparent)		Filaments of Ci, or "mares tails," scattered and not increasing
	Cu of considerable development, generally towering, with or without other Cu or Sc bases all at same level		Thick As, greater part sufficiently dense to hide sun (or moon), or Ns		Dense Ci in patches or twisted sheaves, usually not increasing, sometimes like remains of Cb; or towers or tufts
	Cb with tops lacking clear-cut outlines, but distinctly not cirriform or anvil shaped; with or without Cu, Sc, or St		Thin Ac, mostly semitransparent; cloud elements not changing much and at a single level		Dense Ci, often anvil shaped, derived from or associated with Cb
	Sc formed by spreading out of Cu; Cu often present also		Thin Ac in patches; cloud elements continually changing and/or occurring at more than one level		Ci, often hook shaped, gradually spreading over the sky and usually thickening as a whole
	Sc not formed by spreading out of Cu		Thin Ac in bands or in a layer gradually spreading over sky and usually thickening as a whole		Ci and Cs, often in converging bands, or Cs alone; generally overspreading and growing denser; the continuous layer not reaching 45° altitude
	St or StFra, but no StFra of bad weather		Ac formed by the spreading out of Cu or Cb		Ci and Cs, often in converging bands, or Cs alone; generally overspreading and growing denser; the continuous layer exceeding 45° altitude
	StFra and/or CuFra of bad weather (scud)		Double-layered Ac, or a thick layer of Ac, not increasing; or Ac with As and/or Ns		Veil of Cs covering the entire sky
	Cu and Sc (not formed by spreading out of Cu) with bases at different levels		Ac in the form of Cu-shaped tufts or Ac with turrets		Cs not increasing and not covering entire sky
	Cb having a clearly fibrous (cirriform) top, often anvil shaped, with or without Cu, Sc, St, or scud		Ac of a chaotic sky, usually at different levels; patches of dense Ci usually present also		Cc alone or Cc with some Ci or Cs, but the Cc being the main cirriform cloud

ตารางที่ 13.3 ชนิดของเมฆต่าง ๆ

 Cloud development NOT observed or NOT observable during past hour	 Clouds generally dissolving or becoming less developed during past hour	 State of sky on the whole unchanged during past hour	 Clouds generally forming or developing during past hour	 Visibility reduced by smoke
 Light fog (mist)	 Patches of shallow fog at station, NOT deeper than 6 feet on land	 More or less continuous shallow fog at station, NOT deeper than 6 feet on land	 Lightning visible, no thunder heard	 Precipitation within sight, but NOT reaching the ground
 Drizzle (NOT freezing) or snow grains (NOT falling as showers) during past hour, but NOT at time of observation	 Rain (NOT freezing and NOT falling as showers) during past hour, but NOT at time of observation	 Snow (NOT falling as showers) during past hour, but NOT at time of observation	 Ram and snow or ice pellets (NOT falling as showers) during past hour, but NOT at time of observation	 Freezing drizzle or freezing rain (NOT falling as showers) during past hour, but NOT at time of observation
 Slight or moderate dust storm or sandstorm, has decreased during past hour	 Slight or moderate dust storm or sandstorm, no appreciable change during past hour	 Slight or moderate dust storm or sandstorm has begun or increased during past hour	 Severe dust storm or sandstorm, has decreased during past hour	 Severe dust storm or sandstorm, no appreciable change during past hour
 Fog or ice fog at distance at time of observation, but NOT at station during past hour	 Fog or ice fog in patches	 Fog or ice fog, sky discernible, has become thinner during past hour	 Fog or ice fog, sky NOT discernible, has become thinner during past hour	 Fog or ice fog, sky discernible, no appreciable change during past hour
 Intermittent drizzle (NOT freezing), slight at time of observation	 Continuous drizzle (NOT freezing), slight at time of observation	 Intermittent drizzle (NOT freezing), moderate at time of observation	 Continuous drizzle (NOT freezing), moderate at time of observation	 Intermittent drizzle (NOT freezing), heavy at time of observation
 Intermittent rain (NOT freezing), slight at time of observation	 Continuous rain (NOT freezing), slight at time of observation	 Intermittent rain (NOT freezing), moderate at time of observation	 Continuous rain (NOT freezing), moderate at time of observation	 Intermittent rain (NOT freezing), heavy at time of observation
 Intermittent fall of snowflakes, slight at time of observation	 Continuous fall of snowflakes, slight at time of observation	 Intermittent fall of snowflakes, moderate at time of observation	 Continuous fall of snowflakes, moderate at time of observation	 Intermittent fall of snowflakes, heavy at time of observation
 Slight rain shower(s)	 Moderate or heavy rain shower(s)	 Violent rain shower(s)	 Slight shower(s) of rain and snow mixed	 Moderate or heavy shower(s) of rain and snow mixed
 Moderate or heavy shower(s) of hail, with or without rain, or rain and snow mixed, not associated with thunder	 Slight rain at time of observation; thunderstorm during past hour, but NOT at time of observation	 Moderate or heavy rain at time of observation; thunderstorm during past hour, but NOT at time of observation	 Slight snow, or rain and snow mixed, or hail at time of observation; thunderstorm during past hour, but NOT at time of observation	 Moderate or heavy snow, or rain and snow mixed, or hail at time of observation; thunderstorm during past hour, but NOT at time of observation


ตารางที่ 13.4

สภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วซึ่งมีอยู่ 100 ชนิด


Haze	Widespread dust in suspension in the air, NOT raised by wind, at time of observation	Dust or sand raised by wind at time of observation	Well-developed dust whirl(s) within past hour	Dust storm or sandstorm within sight of or at station during past hour
Precipitation within sight, reaching the ground but distant from station	Precipitation within sight, reaching the ground, near to but NOT at station	Thunderstorm, but no precipitation at the station	Squall(s) within sight during past hour or at time of observation	Funnel cloud(s) within sight of station at time of observation
Showers of rain during past hour, but NOT at time of observation	Showers of snow, or of rain and snow, during past hour, but NOT at time of observation	Showers of hail, or of hail and rain, during past hour, but NOT at time of observation	Fog during past hour, but NOT at time of observation	Thunderstorm (with or without precipitation) during past hour, but NOT at time of observation
Severe dust storm or sandstorm has begun or increased during past hour	Slight or moderate drifting snow, generally low (less than 6 ft)	Heavy drifting snow, generally low	Slight or moderate blowing snow, generally high (more than 6 ft)	Heavy blowing snow, generally high
Fog or ice fog, sky NOT discernible, no appreciable change during past hour	Fog or ice fog, sky discernible, has begun or become thicker during past hour	Fog or ice fog, sky NOT discernible, has begun or become thicker during past hour	Fog depositing rime, sky discernible	Fog depositing rime, sky NOT discernible
Continuous drizzle (NOT freezing), heavy at time of observation	Slight freezing drizzle	Moderate or heavy freezing drizzle	Drizzle and rain, slight	Drizzle and rain, moderate or heavy
Continuous rain (NOT freezing), heavy at time of observation	Slight freezing rain	Moderate or heavy freezing rain	Rain or drizzle and snow, slight	Rain or drizzle and snow, moderate or heavy
Continuous fall of snowflakes, heavy at time of observation	Ice prisms (with or without fog)	Snow grains (with or without fog)	Isolated starlike snow crystals (with or without fog)	Ice pellets or snow pellets
Slight snow shower(s)	Moderate or heavy snow shower(s)	Slight shower(s) of snow pellets, with or without rain, or rain and snow mixed	Moderate or heavy shower(s) of snow pellets, or ice pellets, with or without rain or rain and snow mixed	Slight shower(s) of hail, with or without rain or rain and snow mixed, not associated with thunder
Slight or moderate thunderstorm without hail, but with rain and/or snow at time of observation	Slight or moderate thunderstorm, with hail at time of observation	Heavy thunderstorm, without hail, but with rain and/or snow at time of observation	Thunderstorm combined with dust storm or sandstorm at time of observation	Heavy thunderstorm with hail at time of observation



ถึงอยู่เหนือทวีป (continental) และเป็นอากาศแห้ง สำหรับ ๓ หมายถึงอยู่เหนือพื้นน้ำ (maritime) และเป็นอากาศชื้น ดังนั้นมวลอากาศที่เกิดขึ้นเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนจะมีสัญลักษณ์ mT และสำหรับมวลอากาศที่เกิดขึ้นเหนือทวีปแถบขั้วโลกจะมีสัญลักษณ์ cP ซึ่งเป็นอากาศที่แห้งและเย็น สำหรับมวลอากาศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลกแสดงไว้ในรูป 13.2 และ 13.3



รูป 13.2 มวลอากาศต่าง ๆ บนพื้นโลกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม



รูป 13.3 มวลอากาศต่าง ๆ บนพื้นโลกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์


เมื่อมวลอากาศเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเดิมมันจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย เนื่องจากมีปฏิกริยาระหว่างกันและกันกับพื้นผิวที่อยู่เบื้องล่าง สำหรับอากาศซึ่งอุ่นกว่าพื้นผิวเบื้องล่างในบริเวณที่มันพัดผ่านจะเติมคำว่า  $w$  ลงไป ดังนั้นอากาศแถวบริเวณเขตร้อนที่เกิดขึ้นเหนือพื้นน้ำทะเลที่เคลื่อนตัวไปเหนือทวีปที่เย็นจะมีสัญลักษณ์  $mTw$  และอากาศซึ่งเย็นกว่าพื้นผิวที่อยู่เบื้องล่างในบริเวณที่มันพัดผ่านจะมีอักษร  $k$  เพิ่มเติมลงไป เพราะฉะนั้นอากาศที่เกิดบนทวีปแถบขั้วโลกที่เคลื่อนตัวลงมาทางใต้เหนือพื้นดินที่อุ่นกว่าจะมีสัญลักษณ์เป็น  $cPk$

## 13.2 แนวปะทะอากาศ

แนวปะทะอากาศให้คำจำกัดความว่าเป็นเขตแดนด้านหน้า (boundary surface) ที่แบ่งแยกมวลอากาศที่มีความแตกต่างในความหนาแน่นออกจากกัน มวลอากาศชนิดหนึ่งจะอุ่นกว่า และมักจะมีความชื้นสูงกว่ามวลอากาศอีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นแนวปะทะอากาศสามารถก่อตัวระหว่างมวลอากาศสองชนิดใด ๆ ที่มีความผิดเพี้ยนกัน แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงในความหนาแน่นจะเกิดขึ้นภายในมวลอากาศเองก็ตามแต่จะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศ

เราสามารถหาพบผิวหน้าของแนวปะทะอากาศ (frontal surface) ได้เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแนวเขตแดนระหว่างมวลอากาศทั้งสอง ซึ่งจะมีเมฆและฝนที่เพิ่มขึ้นทั้งชนิดของแนวปะทะอากาศนั้น ๆ อากาศที่เย็นกว่าจะอยู่ในเบื้องล่างในขณะที่อากาศอุ่นจะลอยสูงขึ้น นักอุตุนิยมวิทยาจะแสดงระบบแนวปะทะอากาศบนแผนที่ด้วยแนวเส้นที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน (junction) ลักษณะอากาศของแนวปะทะอากาศจะเปลี่ยนแปลงต่างกันไป ซึ่งขึ้นกับชนิดของระบบแนวปะทะอากาศแต่ละชนิด (ดูรูป 13.4)


### FRONTAL SYSTEMS



รูป 13.4 สัญลักษณ์ของแนวปะทะอากาศต่าง ๆ

### 13.2.1 แนวปะทะอากาศอุ่น (warm front)

อากาศที่อุ่นและเบาจะแทนที่อากาศที่เย็นและหนาแน่นมากกว่าโดยการไหลขึ้นไปข้างบนตามลาดอากาศเย็น ดังรูป 13.5 ผลก็คือจะเกิดการยกขึ้นทีละน้อยเป็นบริเวณกว้างตามความชันที่เพิ่มขึ้นช้า ๆ ของแนวปะทะอากาศซึ่งมักจะยื่นออกล่วงหน้าหลายร้อยกิโลเมตรก่อนแนวปะทะอากาศอุ่น เมื่อแนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้ามา เมฆสูงจะก่อตัวขึ้นพร้อมกับฐานเมฆจะค่อย ๆ ต่ำลงและหนาขึ้นตามลำดับดังนี้ เซอร์วีส เซอร์วีสเตรตัส อัลโตสเตรตัส นิมโบสเตรตัส และสุดท้ายจะเป็นเมฆสเตรตัส



รูป 13.5 การเรียงลำดับของเมฆที่เกิดขึ้นในเส้นทางของอากาศอุ่นที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามา

เริ่มต้นจากเมฆเซอร์รัสที่ก่อตัวขึ้นมาด้วยลักษณะเป็นเส้น ๆ คล้ายขนนกซึ่งปรากฏ ล่วงหน้าไกลกว่าแนวปะทะอากาศที่พื้นผิวถึง 1000 กิโลเมตร เมฆจะแผ่กว้างออกข้าง ๆ (laterally) อย่างช้า ๆ ทำให้เกิดแผ่นบางของเมฆเซอร์โรสเตรตัสขึ้นซึ่งจะเปลี่ยนท้องฟ้าให้ กลายเป็นสีขมัวนํ้านม ผลึกน้ำแข็งเล็ก ๆ ที่ประกอบเป็นเมฆสูงนี้ (ฐานสูงกว่า 6 ก.ม) อาจจะมี สะท้อนและหักเหแสงทำให้เกิดเป็นวงแหวนขึ้น ปรากฏการณ์นี้อาจบอกถึงพายุที่กำลังจะเข้ามาใน อีกสองสามวัน

เหตุการณ์ต่อไป เมฆเซอร์โรสเตรตัสจะเปลี่ยนแปลงเป็นเมฆอัลโตสเตรตัส ซึ่งมี ฐานอยู่สูง 2 ถึง 6 กิโลเมตร ในไม่ช้าหลังจากเมฆอัลโตสเตรตัสหนาขึ้นมากก็จะปิดบังดวง อาทิตย์ไว้ ฝนที่ตกเบา ๆ (light rain) หรือหิมะก็จะเริ่มต้นขึ้น หยาดน้ำฟ้ามีตกสม่ำเสมอจะ ตกจากเมฆที่มีสีเทาแก่หรือเมฆนิมโบสเตรตัสและจะคงอยู่จนกระทั่งแนวปะทะอากาศอุ่น ได้ผ่าน ไป ช่วงเวลาที่ฝนตกอาจจะนานกว่า 24 ชั่วโมง


ถัดไปข้างหลังของแนวปะทะอากาศอุ่น ฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอจะเปลี่ยนเป็นฝนละ อองที่ตกจากเมฆสเตรตัส (ฐานต่ำกว่า 2 ก.ม) และแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหมอกที่มีลักษณะหนา หลังจากแนวปะทะอากาศอุ่น ได้ผ่าน ไปท้องฟ้าจะแจ่มใสและอากาศจะกลายเป็นอุ่นและอบอ้าว

ลำดับของการเกิดเมฆและฝนของแนวปะทะอากาศอุ่นที่กล่าว ไปแล้วจะเป็นแนวปะทะ อากาศอุ่นที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่การเรียงลำดับของเมฆจะเปลี่ยนแปลงบ้างเมื่ออากาศอุ่น ข้างไม่มีเสถียรภาพ ในกรณีที่ลอยสูงขึ้นมีความรุนแรงก็จะทำให้เกิดเมฆคิวมิฟโรนิมบัสล่วงหน้าผิ วหน้าของแนวปะทะอากาศอุ่น และทำให้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักเป็นระยะสั้น แนวปะทะอากาศอุ่นที่ กล่าวแล้วจะต้องร่วมด้วยในแพไซโคลนเสมอ ซึ่งจะกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

### 13.2.2 แนวปะทะอากาศเย็น

เมื่อลมจากทิศเหนืออากาศเย็นลงมาพบกับอากาศอุ่นก็จะแทนที่อากาศอุ่นทำให้เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็นขึ้น อากาศที่เย็นซึ่งจะหนักกว่าและหนาแน่นมากกว่าจะอยู่เบื้องล่าง อากาศอุ่นซึ่งเบากว่าจะถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้น เบี่ยงเบนอย่างรวดเร็วในลักษณะมุมที่ชัน (sharp angle) ดังนั้นทำให้แนวปะทะอากาศเย็นตัวก่อเป็นรูปลิ้นที่ชันกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น ในแนวปะทะอากาศเย็นนั้นอัตราส่วนระหว่างอากาศที่ลอยสูงขึ้นและพื้นที่ในแนวราบ จะมีค่าประมาณ 1 ต่อ 50 (ดูรูป 13.6)

แนวปะทะอากาศเย็นมักจะทำให้เกิดแถบของกาลอากาศ (band of weather) ที่แคบกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการพาในแนวตั้งที่ชัดเจนกว่า เราสามารถรู้ว่าแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาด้วยการก่อตัวของเมฆในแนวตั้งที่ใหญ่โต แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าง ๆ กัน บางครั้งอาจจะช้ากว่าแนวปะทะอากาศอุ่นเล็กน้อย แต่บางครั้งอาจเคลื่อนที่เร็วกว่าถึง 2 เท่า



รูป 13.6 เมฆพายุฟ้าคะนองที่ก่อตัว โดยการยกขึ้นของอากาศในแนวปะทะอากาศเย็น

ในระบบแนวปะทะอากาศเย็น เมฆส่วนใหญ่มักจะเป็นเมฆชนิดคิวมิวลัส ดังนั้นจึงทำให้เกิดพายุได้บ่อยครั้ง (ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวปะทะอากาศอุ่น) แบบของกาลอากาศมักจะมีเกิดขึ้นในแถบที่แคบ องศาของความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าอากาศอุ่นจะถูกผลักให้ขึ้นจากพื้นผิวช้าหรือเร็วถ้าเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวปะทะอากาศเย็นก็จะมี ความรุนแรงน้อยลง

เราสามารถบอกได้ว่ามีแนวปะทะอากาศเย็นกำลังเข้ามา โดยลมที่เริ่มต้นพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ และความกดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ลมจะพัดแรงขึ้นเมื่อพายุเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา หลังจากแนวปะทะอากาศได้ผ่านบริเวณที่ถูกกระทบกระเทือนไปแล้ว ความกดก็จะเพิ่มขึ้น ลมจะ

เวียน (veer) ไปเป็นพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ท้องฟ้ามักจะแจ่มใสภายใน 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากมีพายุ

คุณสมบัติของแนวปะทะอากาศเย็นแต่ละแนวจะแตกต่างกันไป ทั้งขึ้นกับองค์ประกอบหลายประการสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างก็คือความเร็วในการลอยตัวของอากาศอุ่น ความเร็วและความชันของแนวปะทะอากาศก็มีผลต่อระยะเวลาและจำนวนฝนที่ตกด้วย ในกรณีที่อากาศเย็นผลักให้อากาศอุ่นลอยขึ้นข้างบนอย่างรวดเร็วและสะดวกสควอไลน์ ของพายุฟ้าคะนอง (squall line of thunderstorm) อาจเกิดขึ้นเบื้องหน้าของเส้นแนวปะทะอากาศ (frontal line) ซึ่งอาจอยู่ไกลล่วงหน้า 80 ถึง 250 กิโลเมตร พายุแนวปะทะอากาศเย็นชนิดนี้จะวิ่งไปไกลและเร็วกว่าแนวปะทะอากาศและทำให้ระยะทางระหว่างตัวมันเองและระบบแนวปะทะอากาศที่ตามมาห่างกันออกไปอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เองอาจจะเป็นผลให้พายุสลายตัวเพราะจะเป็นการทำลาย (breakup) ระบบการพาความร้อนของอากาศที่อยู่ด้านหน้าของเส้นแนวปะทะอากาศโดยตรง

### 13.2.3 แนวปะทะอากาศที่ไม่เคลื่อนที่ (Stationary Front)


เมื่อระบบแนวปะทะอากาศหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเกิดแนวปะทะอากาศที่ไม่เคลื่อนที่ แนวปะทะอากาศชนิดนี้อาจเกิดจากการหยุดกลางคันของแนวปะทะอากาศเย็นหรือแนวปะทะอากาศอุ่นก็ได้ ซึ่งบางครั้งอาจอยู่นานเป็นเวลาหลายวันและเมื่อแนวปะทะอากาศที่ไม่เคลื่อนที่นี้ เริ่มต้นเคลื่อนที่อีกมันก็จะกลับเป็นแนวปะทะอากาศอุ่นหรือแนวปะทะอากาศเย็นอีกตามเดิม

### 13.2.4 แนวปะทะอากาศออกครูด (Occluded Fronts)


เมื่อแนวปะทะอากาศเย็นวิ่งมาทันแนวปะทะอากาศอุ่น ทั้งสองแนวปะทะอากาศจะกักอากาศอุ่นเอาไว้ระหว่างตรงกลางทำให้เกิดแนวปะทะอากาศออกครูดขึ้น การถูกกัก (occlusion) เกิดขึ้นเมื่อมวลของอากาศอุ่นถูกผลักและทำให้เคลื่อนที่ขึ้นบนโดยมวลอากาศเย็นที่มีความหนาแน่นสูงกว่า โดยที่มวลอากาศทั้งสองนี้พบกันและผลักให้มวลอากาศซึ่งอุ่นกว่าที่อยู่ในระหว่างมวลอากาศทั้งสองลอยสูงขึ้นจากพื้นดิน สำหรับโคลฟรอนท์ออกครูดขึ้น (cold front occlusion) แนวปะทะอากาศอุ่นจะถูกผลัก (push up) จากพื้นดินโดยอากาศเย็นซึ่งหนักกว่าที่เคลื่อนตัวเข้ามา (ดูรูป 13.7) สำหรับใน วอร์ม ฟรอนท์ ออกครูดขึ้น (warm front occlusion) แนวปะทะอากาศเย็นจะถูกผลักขึ้นจากพื้นดินเนื่องจากอากาศในแนวปะทะอากาศอุ่นมีความเย็นมากกว่าอากาศในแนวปะทะอากาศเย็น (ดูรูป 13.8) แนวปะทะอากาศออกครูดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวฟไซโคลนเจริญเติบโตจนถึงระยะออกครูด (occluded stage) ซึ่งจะหยุดในหัวข้อถัดไป

### 13.3 เวย์ไซโคลน (Wave Cyclone)

ทฤษฎีของเวย์ไซโคลนถูกสร้างในระหว่างต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวนอร์เวย์ และเรียกว่าหุ่นจำลองของชาวนอร์เวย์ (Norwegian Model) หุ่นจำลองในมิติละติจูดนั้นถูกสร้างขั้นครั้งแรกจากการสังเกตใกล้พื้นดิน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากโทรโปเฟียร์ชั้นกลางและ



รูป 13.7 ลักษณะของไซโคลนที่ออกครูดชั้น




รูป 13.8 ลักษณะของวอร์มฟรอนท์ที่ออกครูดชั้น

ชั้นบนรวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับก็จะมีส่วนช่วยให้การปรับปรุงดีขึ้น หุ่นจำลองนี้เป็นเครื่องมือที่ยอมรับในการใช้ตีความเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ มันสามารถทำให้เห็นภาพบรรยากาศที่เคลื่อนไหวในขณะที่เกิดพายุ และถ้าเราใช้หุ่นจำลองนี้เป็นหลักในการพิจารณาอากาศก็จะช่วยในการพยากรณ์ในเขตมิติละติจูดได้เป็นอย่างดี

13.3.1 วงจรชีวิตของเวฟไซโคลน (Life Cycle of Wave Cyclone)


ไซโคลนในมิติ เดลละติจูดเกิดขึ้นตามปะทะอากาศอันเกิดจากมวลอากาศ cP ใน  
 โพลาร์อีสเทอริลพัฒนามาพบกับมวลอากาศ mT ในลมเวสเทอริลซึ่งทำให้เกิดโพลาร์พรอนท์ขึ้น  
 (ดูรูป 13.9) ลมทั้งสองจะพัดชนกันแต่ส่วนทิศทางการัน ผลจากที่ลมทั้งสองส่วนกันันทำให้เกิด




รูป 13.9 มวลอากาศ cP ในโพลาร์อีสเทอริลพัฒนามาพบอากาศ mT ในลมเวสเทอริล ทำให้เกิดเป็นโพลาร์พรอนท์ขึ้น

แรงเฉือนชนิดไซคลอนิก (cyclonic shear) ขึ้นและทำให้เกิดเวฟไซโคลนก่อตัวขึ้นในลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดังรูป 13.10 จุดที่คลื่นเล็ก ๆ ก่อตัวนี้จะทำให้อากาศอุ่นบุคลิกเข้าไปในจุดอ่อนของแนวปะทะอากาศและขึ้นไปด้านทางซ้ายโลก ส่วนอากาศเย็นที่อยู่ล้อมรอบจะเคลื่อนที่มายังด้านศูนย์สูตร การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เกิดการปรับตัวของความกดใหม่ โดยมีเส้นไอโซบาร์ที่เกือบเป็นวงกลม และมีจุดศูนย์กลางของความกดต่ำอยู่ที่จุดยอดของสามเหลี่ยม (ดูรูป 13.11) เมื่อการหมุนแบบไซคลอนิกได้เกิดขึ้นก็จะทำให้ลมพัดสอเข้าหากันและเป็นผลให้อากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง โดยเฉพาะตรงจุดที่อากาศอุ่นวิ่งไปเหนืออากาศที่เย็นกว่า โดยที่เราสามารถเห็นจากรูป 13.11 อากาศในสามเหลี่ยมที่อุ่นจะพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ (southwest) ไปยังอากาศที่เย็นกว่า ซึ่งพัดมาจากตะวันออกเฉียงใต้ (southeast) (ดูรูป 13.12 ประกอบ) เนื่องจากอากาศอุ่นเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอากาศเย็นในทิศที่ตั้งฉากกับแนว






รูป 13.10 ระยะต่าง ๆ ในวงจรชีวิตของไซโคลนที่เกิดขึ้นในเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเสนอโดยนักอุตุนิยมวิทยาชาวอเมริกัน



รูป 13.11 การหมุนเวียนของอากาศในไซโคลนที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จากรูปจะทำให้พิจารณาเห็นกับการเปลี่ยนตำแหน่งทิศของลม จากตำแหน่ง A ไป B และตำแหน่ง B ไป C



รูป 13.12 อากาศในสามเหลี่ยมที่อุ่นจะพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ไปยังอากาศที่เย็นกว่าซึ่งพัดมาจากตะวันออกเฉียงใต้


ปะทะอากาศนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าอากาศอุ่นจะบุกรุกพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนครอบครองโดยอากาศเย็น ดังนั้นแนวปะทะอากาศจะเป็นแนวปะทะอากาศอุ่น ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันแสดงได้ว่าส่วนหลังของไซโคลอนที่ถูกรบกวนอากาศเย็นจะอยู่ใต้อากาศอุ่นในสามเหลี่ยมและทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นขึ้น โดยทั่วไปตำแหน่งของแนวปะทะอากาศเย็นจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วกว่าแนวปะทะอากาศอุ่นและเริ่มต้นทำให้สามเหลี่ยมที่อุ่นบิดลงอย่างทีแสดงไว้ในรูป 13.10 กระบวนการนี้ก็คือออกครูดขึ้นซึ่งเป็นผลให้เกิดแนวปะทะอากาศออกครูดขึ้น เมื่อถึงระยะนี้ไซโคลอนจะเข้าสู่การเจริญเติบโตเต็มที่ (maturity) และมีความรุนแรงมากที่สุด ความชันของความกดจะมากและลมจะพัดแรงในขณะที่การยกลอยสูงขึ้นยังคงมีติดต่อกันไป ในที่สุดสามเหลี่ยมอุ่นทั้งหมดจะถูกบังคับขึ้นข้างบนและอากาศเย็นจะล้อมรอบบริเวณไซโคลอนระดับเบื้องล่าง เมื่อนแนวปะทะอากาศระหว่างมวลอากาศสองมวลหมดไป ความชันของความกดจะอ่อนลง ที่จุดนี้ไซโคลอนจะหมดแหล่งของพลังงานและพายุก็จะสลายไป

### 13.3.2 ลักษณะกาลอากาศของเวฟไซโคลอน (Idealized Weather of a Wave Cyclone)


ดังที่กล่าวแล้วว่าหุ่นจำลองของไซโคลอนจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพิจารณาแบบแผนของกาลอากาศในเขตมิดเดิลแลตติจูด จากรูป 13.13 จะแสดงการกระจายของเมฆและบริเวณของฝนที่ตกซึ่งรวมในเวฟไซโคลอนที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว สำหรับรูป 13.14 เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของพายุไซโคลอนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเปรียบเทียบกับรูป 13.13 ที่เขียนขึ้น

โดยการนำ (guid) ของลมเวสเทอร์ลีในเบื้องบน ไซโคลอนโดยทั่วไปจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหรืออเมริกาโดยเราสามารถคาดหมายสัญญาณอันแรกของการเข้ามาในตะวันตกได้ ไซโคลอนตัวอย่างใช้เวลา 2 ถึง 4 วันในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณอันหนึ่ง ในระหว่างช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นนี้การเปลี่ยนแปลงในสภาวะบรรยากาศสามารถสังเกตได้ชัดโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีผลต่างของอุณหภูมิค่อนข้างมากในเขตมิดเดิลแลตติจูด

โดยการใช้รูป 13.13 เป็นหลักเราจะพิจารณาลักษณะอากาศของไซโคลอนในขณะที่มันผ่านพื้นที่บริเวณหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิของปี เพื่อให้การพิจารณาง่ายขึ้น ขอบเขตจะอยู่ในเส้น AE และ FG เริ่มต้นจากการพิจารณาลักษณะอากาศเมื่อเราเคลื่อนที่จากด้านขวา ไปด้านซ้ายตามเส้น AE ที่จุด A การมองเห็นเมฆเซอร์รัสที่อยู่สูงจะเป็นสัญญาณอันแรกของการเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ของพายุไซโคลอน เมฆที่อยู่สูงเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่มาล่วงหน้าแนวปะทะอากาศที่พื้นดินได้ก่อนถึง 1000 กิโลเมตรหรือมากกว่าและมักจะร่วมด้วยความกดที่ลดลง เมื่อนแนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนตัวเข้ามาความหนาของเมฆจะเพิ่มขึ้นและระดับความสูงของเมฆ (cloud deck) ที่ลดต่ำลงก็จะสังเกตเห็นได้ ภายใน 12 ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเห็นเมฆเซอร์รัสครั้งแรก ฝนที่ตกเบา ๆ มักจะเกิดขึ้นที่จุด B และเมื่อนแนวปะทะอากาศเข้ามาใกล้มากขึ้น อัตราของน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิ



รูป 13.13 แบบของเมฆที่มักเกิดในพายุไซโคลนที่เจริญเต็มที่แล้ว ส่วนของข้างบนสุดและล่างสุดจะเป็นรูปภาคตัดขวางในแนว FG และ AE ตามลำดับ



รูป 13.14 รูปภาพถ่ายดาวเทียมของพายุไซโคลนที่เกิดขึ้นจริง

ที่ชั้นสูงก็จะสังเกตเห็น ลมจะเริ่มต้นเปลี่ยนจากที่เคยพัดมาจากตะวันออก (easterly) ไปเป็นพัดมาจากทางใต้ (southerly) แทนสำหรับพื้นที่ในเส้นทางผ่านของแนวปะทะอากาศอุ่นจะตกอยู่ภายในอิทธิพลของมวลอากาศ mT ในสามเหลี่ยมที่อุ่น (ที่จุด C) (ดูรูป 13.13) โดยทั่วไปบริเวณซึ่งกระแทกกระเทือน โดยสามเหลี่ยมของไซโคลนนี้จะมีอุณหภูมิที่อุ่นลมนพัดจากทิศใต้และท้องฟ้ามักจะมีเมฆใสซึ่งแม้แต่เมฆคิวมิลัสที่มีลักษณะอากาศดีหรืออัลโตคิวมิลัสก็จะมีไม่ค่อยพบในที่นี้ อากาศที่ค่อนข้างสบายในสามเหลี่ยมที่อุ่นของฤดูใบไม้ผลิจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว และถูกแทนที่โดยลมที่พัดกรวโชก (gusty wind) และฝนที่ตกหนักอันเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็น การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแนวปะทะอากาศเย็นจะแสดงโดยกำแพงของเมฆที่มีม้วนดำ (rolling, black clouds) ที่จุด D กาลอากาศที่รุนแรงจะร่วมด้วยฝนที่ตกหนักและบางครั้งลูกเห็บหรือพายุทอร์นาโดก็จะพบได้ ในช่วงนี้ของปี นอกจากนั้นพายุฟ้าคะนองสควอลไลน์ที่รุนแรงซึ่งมีความหนาช่วงสั้นอาจเกิดขึ้นบ่อยหน้าแนวปะทะอากาศเย็น ในหลาย ๆ กรณีกิจกรรมของสควอล (squall activity) จะรุนแรงกว่าตัวแนวปะทะอากาศเย็นเองเสียอีก การผ่านเข้ามาของแนวปะทะอากาศเย็นสามารถตรวจจับ (detected) ได้ง่ายโดยลมที่เปลี่ยนตำแหน่ง (wind shift) ลมซึ่งพัดมาจากทางใต้จะถูกแทนที่โดยลมที่พัดมาจากตะวันตกหรือจากตะวันตกเฉียงเหนือ (northwest) และอุณหภูมิจะลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ความกดที่เพิ่มขึ้นก็จะชี้ถึงการจมลงมาของอากาศเย็นที่แห้งซึ่งอยู่เบื้องหลังแนวปะทะอากาศ เมื่อแนวปะทะได้ผ่านไปท้องฟ้าจะแจ่มใสอย่างรวดเร็วเมื่ออากาศที่เย็นกว่าได้บุกรุกบริเวณจุด E หลังจากนั้นประมาณหนึ่งหรือสองวันจะ

พบท้องฟ้าที่เกือบปราศจากเมฆที่มีสีน้ำเงินแก่ นอกจากว่าจะมีไซโคลนอื่นผ่านเข้ามาอีกเท่านั้น

สภาวะกาลอากาศที่แตกต่างกันมากจะเกิดขึ้นบนส่วนของไซโคลนที่ประกอบด้วยแนวปะทะอากาศออกครูดซึ่งแสดงไว้ตามเส้น FG ในที่นี้ลมหมุนยังคงเย็นในระหว่างที่เป็นทางผ่านของพายุ อย่างไรก็ตามความกดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มสภาวะความมืดครึ้ม (overcast) จะเป็นการชี้แนะที่สำคัญถึงการเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาของศูนย์กลางบริเวณความกดต่ำ

ส่วนนี้ของไซโคลนมักจะทำให้เกิดพายุหิมะในเดือนที่มีอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้แนวปะทะอากาศออกครูดมักจะเคลื่อนที่ช้ากว่าแนวปะทะอากาศอื่นดังนั้นทำให้ลักษณะโครงสร้างของแนวปะทะอากาศที่มีรูปร่างกระดูกสองง่ามหน้าอกนก (wishbone-shape) ดังแสดงในรูป 13.11 จะหมุนรอบตัวเอง (rotate) ในทิศทางเข็มนาฬิกาซึ่งจะทำให้แนวปะทะอากาศออกครูดปรากฏเป็นรูปโค้งไปทางด้านหลัง ผลอันนี้จะเพิ่มความรุนแรงต่อบริเวณที่อยู่ถัดไปจากแนวปะทะอากาศออกครูด เพราะมันจะอยู่เหนือบริเวณที่นานกว่าแนวปะทะอากาศอื่น ๆ เช่นเดียวกันพายุก็จะถึงจุดความรุนแรงที่สุดในระหว่างที่เกิดออกครูดขึ้น ผลก็คือพื้นที่ที่ถูกกระทบกระเทือนโดยแนวปะทะอากาศนี้สามารถคาดหมายว่าจะได้รับความรุนแรง (brunt) มากที่สุดจากพายุ

จากการสังเกตในสิ่งที่กล่าวมาแล้ว สามารถใช้เป็นประโยชน์ในความรู้เกี่ยวกับท่อนจำลองของไซโคลนได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของทิศทางลมจะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศที่ใกล้จะมาถึง ข้อสังเกตคือในเส้นทางของแนวปะทะอากาศอื่นและของแนวปะทะอากาศเย็น ลูกศรของลมจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในทิศตามเข็มนาฬิกาที่ตัวอย่างเช่น ในเส้นทางผ่านของแนวปะทะอากาศอื่นลมจะเปลี่ยนจากที่เคยพัดจากตะวันออกเป็นพัดจากฝ่ายใต้ ในทางนาวีคำว่าลมเวียน (veering) จะใช้กับลมที่เปลี่ยนทิศตามเข็มนาฬิกา เนื่องจากสภาวะนํ้าแข็งจะเกิดขึ้นในทางผ่านของทั้งสองแนวปะทะอากาศดังนั้นลมเวียนจะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าอากาศจะดีขึ้น (improve) ตรงกันข้ามบริเวณซึ่งมีตำแหน่งอยู่ในภาคเหนือ (northern portion) ของไซโคลนจะพบกับลมที่เปลี่ยนทิศในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา (ดูรูป 13.11) ลมซึ่งเปลี่ยนทิศทางในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะเรียกว่าลมวก (backing wind) ดังนั้นจากการเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาของเวปไซโคลนลมวกจะหมายถึงอุณหภูมิที่เย็นและอากาศที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง


ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นภาพสเก็ตช์สั้น ๆ ของกาลอากาศที่พบทั่วไปในทางผ่านของไซโคลนหลังจากเราพิจารณาแผนที่อากาศประจำวันอย่างละเอียดแล้วก็จะสามารถช่วยให้เข้าใจพายุไซโคลนจริง ๆ ได้ดีขึ้น (ดูแผนที่ท้ายบท)

### 13.3.3 การกำเนิดไซโคลน (Cyclogenesis)

เราเห็นในท่อนจำลองของซาวนอร์เวย์แล้วว่า การกำเนิดไซโคลน เกิดขึ้นเมื่อหน้าของแนวปะทะอากาศ (frontal surface) ถูกบิดให้เป็นรูปของคลื่นที่ไม่ต่อเนื่อง (wave-shape discontinuity) มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีส่วนช่วยสร้างคลื่นในไซโคลน


แนวปะทะอากาศ, ภูมิประเทศที่ไม่สม่ำเสมอเช่นภูเขา อุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างทะเลและพื้นดินหรืออิทธิพลของกระแสน้ำเป็นต้น และเป็นที่ยกอีกว่าการรบกวนของศูนย์กลางพายุหนึ่งอาจจะเริ่มต้นทำให้เกิดไซโคลนที่อื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นของระบบไซโคลนิกสามารถอ้างได้ว่าเกิดจากการไหลของอากาศเบื้องบนเป็นส่วนใหญ่

ในสมัยเริ่มต้นของการศึกษาไซโคลนข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของการไหลของอากาศในส่วนกลางและส่วนบนของโทรโปสเฟียร์มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการรบกวนที่พื้นผิวและการไหลในเบื้องบน ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อใดก็ตามที่การไหลในเบื้องบนค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงนั่นคือไหลจากตะวันตกไปตะวันออกก็จะมีกิจกรรมแบบไซโคลนิกที่พื้นผิวอย่างมาก แต่ในกรณีที่มีอากาศในเบื้องบนเริ่มต้นวกไปเวียนมาอย่างกว้างขวางในลักษณะจากเหนือสู่ใต้ก็จะสร้างคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงที่ประกอบด้วยทรอพ (trough) และริดจ์ (ridge) ซึ่งจะทำให้กิจกรรมของไซโคลนิกแรงขึ้น พร้อมกันนี้เมื่อไซโคลนที่พื้นผิวได้ก่อตัว ก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เบื้องล่างตรงกับแกนของลมกรดโดยมีตำแหน่งอยู่หลังทรอพในเบื้องบนเล็กน้อย (ดูรูป 13.15)



รูป 13.15 รูปภาพแสดงตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของลักษณะรูปคลื่นในเบื้องบน และไซโคลนกับแอนติไซโคลนที่พื้นผิว


ก่อนที่จะกล่าวถึงว่าการกำเนิดไซโคลนถูกช่วยให้เกิดขึ้นด้วยการไหลของอากาศเบื้องต้นอย่างไร เรามาดูการมาถึงธรรมชาติของลมไซโคลนและแอนติไซโคลนิก เราทราบแล้วว่าอากาศที่ไหลอยู่รอบบริเวณความกดต่ำจะพัดเข้าสู่ภายใน และนำไปสู่การพัดสอเข้าหากันของมวลอากาศ ผลของการสะสมของอากาศจะทำให้มีความกดเพิ่มขึ้นติดตามมา ดังนั้นเราอาจคาดหมายว่าระบบความกดต่ำที่พื้นผิวจะถูกเติมอย่างรวดเร็วและถูกขจัดหายไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่กล่าวนี้ไม่เกิดขึ้นแต่ตรงกันข้าม ไซโคลนจะคงอยู่เหมือนเดิมระยะเวลาหนึ่ง และเพื่อที่จะให้การคงอยู่นี้เกิดขึ้น การพัดสอเข้าหากันที่พื้นผิวจะต้องชดเชยโดยมวลที่พัดไหลออกในระดับเบื้องบน (ดูรูป 13.16) และทราบได้ว่าการพัดลู่ออกในเบื้องต้นยังมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าการพัดสอในเบื้องต้นที่พื้นผิวบริเวณความกดต่ำซึ่งประกอบด้วยการคอนเวอร์เจนท์ก็ยังคงอยู่ได้



**รูป 13.16** ลักษณะของอากาศที่ไหลในไซโคลนและแอนติไซโคลน (a) การพัดสอเข้าหากันและอากาศที่ไหลขึ้นซึ่งร่วมด้วยในบริเวณความกดต่ำ (ไซโคลน) (b) บริเวณความกดสูงหรือแอนติไซโคลนจะร่วมด้วยอากาศที่จมลงและลมซึ่งพัดลู่ออก



เนื่องจากไซโคลนเป็นผู้ทำให้เกิดอากาศที่เป็นพายุมันจึงได้รับความสนใจมากกว่า ส่วนที่คู่กันคือแอนติไซโคลนิก (หรือบริเวณความกดสูง) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เกิดขึ้นทำให้ระบบความกดอากาศทั้งสองแยกการกล่าวถึงใด ๆ ออกจากกัน ตัวอย่างเช่นอากาศที่พื้นผิวซึ่งเลี้ยงไซโคลนนั้น โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมจากการไหลออกของแอนติไซโคลนนั่นเอง ผลก็คือทั้งไซโคลนและแอนติไซโคลนจะพบอยู่ใกล้เคียงซึ่งกันและกัน (ดูรูป 13.17) เช่นเดียวกันแอนติไซโคลนก็ขึ้นกับการไหลในเบื้องบนเพื่อรักษาการพัดหมุนเวียนของตัวเอง ในการนี้การพัดลู่ออกที่พื้นผิวจะสมดุลโดยการพัดสอบเข้าหากันที่เกิดขึ้นในเบื้องบนและจะทำให้เกิดการจมลงของอากาศ (ดูรูป 13.17)




รูป 13.17 รูปแสดงการหมุนเวียนที่พื้นผิวที่ประกอบด้วยไซโคลนและแอนติไซโคลนที่อยู่ใกล้กัน

จะเห็นว่า การไหลในเบื้องบนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะรักษาให้เกิดการหมุนวนแบบไซโคลนิกและแอนติไซโคลนิก ในการเจริญเติบโตของไซโคลนนั้นนับได้ว่าเป็นบทบาทของการพัดลู่ออกในเบื้องบนซึ่งมีส่วนสำคัญมากที่สุด ในลมกรดการพัดลู่ออกในเบื้องบนจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพ

คล้ายกับสุญญากาศบางส่วน (partial vacuum) ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลขึ้นสู่ข้างบน ความกดที่ลดลงที่พื้นผิวอันเกิดจากการพัดลู่อกในข้างบนก็จะชักนำให้เกิดการไหลเข้าสู่ภายในที่พื้นผิว แรงโคริโอลิสก็จะมีบทบาทที่จะทำให้เกิดการพัดเป็นรูปวงกลมขึ้น

การพัดลู่อกในเบื้องบนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ออกของอากาศในทิศตามเข็มนาฬิกาอย่างที่เกิดในแอนติไซโคลนที่พื้นผิว แต่ตรงกันข้ามการไหลในเบื้องบนเกือบจะเป็นเจ็ทไอส์โตรฟิกทางเดินของมันจะพัดจากตะวันตกไปตะวันออกและมักจะมีรูปร่างคล้ายรูปพัด (sweeping curves) กลไกอันหนึ่งที่ได้รับผิดชอบต่อการขนถ่าย (transport) มวลของอากาศในเบื้องบนก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสปีดไดเวอร์เจนซ์ (speed divergence) เป็นที่ทราบกันว่าในบางครั้งอัตราเร็วของลมตามแนวแกนของลมกรดจะไม่คงที่ บางบริเวณจะพบอัตราเร็วสูงกว่าอีกบางบริเวณ ในการเข้าสู่โซนของลมที่มีความเร็วสูงสุด อากาศจะเพิ่มความเร่งยิ่งขึ้นดังนั้นทำให้เกิดการพัดลู่อก (ดูรูป 13.18) และตรงกันข้ามเมื่ออากาศออกจากโซนที่มีความเร็วลมสูงสุดก็จะสุ่มเป็นกองโตขึ้น (พัดสอบเข้าหากัน) สถานการณ์นี้คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนระหว่างด่านเก็บเงินสองด่าน ในการออกจากด่านอันหนึ่งและเข้าสู่บริเวณที่มีความเร็วลมสูงสุดเราจะพบว่ารถยนต์จะวิ่งลู่อก (แผ่กว้างออก) แต่เมื่อรถยนต์ช้าลงเพื่อจะจ่ายค่าผ่านด่านอีกด่านหนึ่งก็จะทำให้เกิดการพัดสอบเข้าหากัน




รูป 13.18 รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมในเบื้องบน และการไหลของอากาศในส่วนกลางและส่วนล่างของชั้นโทรโปสเฟียร์ โซนของมวลอากาศที่คอนเวอร์เจนซ์จะก่อตัวขึ้นที่ส่วนหลังของกระแสอากาศ (downs stream) และอยู่ถัดไปจากบริเวณข้างหน้าที่มีการไหลเร็วมากที่สุด ส่วนบริเวณที่มีการไดเวอร์เจนซ์จะเกิดขึ้นด้านหน้าของกระแสอากาศ (upstream) ซึ่งเป็นบริเวณที่ไหลเร็วมากที่สุด


บริเวณเบื้องบนที่มีทำให้เกิดการพัดลู่ออกจะมีตำแหน่งอยู่ข้างหน้าทอซเล็กน้อย ผลก็คือไซโคลนที่พื้นผิวมักเกิดขึ้นในเบื้องล่างตรงกับแกนของลมกรด ซึ่งเป็นลมในเบื้องบนที่ช่วยให้มันเจริญเติบโตขึ้น (ดูรูป 13.15) แต่ตรงกันข้ามไซโคลนในลมกรดที่มีการพัดลู่เข้าหากันมักจะมีตำแหน่งอยู่ที่ทวีป ซึ่งเป็นด้านหลังลม การกอบโตของอากาศในบริเวณของลมกรดส่วนนี้จะนำไปสู่การจมลงและเพิ่มความกดที่พื้นผิว ดังนั้นจึงเป็นตำแหน่งที่มีทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแอนติไซโคลนขึ้น

ในบางครั้งไซโคลนสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นก่อน พายุจะเริ่มต้นโดยการพัดลู่ออกซึ่งร่วมด้วยทอซที่อยู่เบื้องบนและจะเจริญลงมายังพื้นผิว เมื่อไซโคลนที่พื้นผิวได้เกิดขึ้น มันก็จะดึงให้มวลอากาศที่มีความแตกต่างมาอยู่ด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขึ้น และจากจุดนี้ไประบบทั้งหมดก็จะมัวจรวัดเหมือนกับเวฟไซโคลนที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามทอซในเบื้องบนก็ไม่ทั้งหมดที่จะทำให้เกิดไซโคลนที่พื้นผิว


รูปในท้ายบททั้งหมดเป็นแผนที่การก่อตัวของไซโคลนในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจริง




แผนที่ 1 เวฟไซโคลนก่อตัวขึ้นใกล้ ๆ กับแนวปะทะอากาศเย็นในรัฐเนวาดา (บริเวณที่มีเส้นไอโซบาร์อยู่ชิดกันบนแผนที่)




แผนที่ 2 ไชโคลนเคลื่อนที่ไปยังฝั่งตะวันออกในขณะที่บริเวณความกดสูงในภาคใต้มีการเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน




แผนที่ 3 ยอดครุฑชั้นเริ่มต้นก่อตัวขึ้น



แผนที่ 4 ลักษณะคลื่นที่ก่อตัว (wave form) เพิ่มความรุนแรงขึ้น หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความกดในทั้งสองด้านของคลื่นที่ก่อตัวและรวมทั้งที่จุดยอดของสามเหลี่ยม






**แผนที่ 5 และแผนที่ 6 (อยู่หน้าถัดไป)**


คลื่นที่ก่อตัวเพิ่มขึ้น มวลอากาศอุ่นถูกกักโดยการบุกรุกของอากาศเย็น บริเวณ  
ความกดสูงเริ่มต้นเคลื่อนออกจากชายฝั่งทางขวา






**แผนที่ 7 และแผนที่ 8 (อยู่หน้าถัดไป)**

เวฟไซโคลนมีรูปร่างอย่างที่คุ้นเคย (classic form) ออกจากรัฐนครอหุคหุคพื้นที่  
 เป็นบริเวณกว้างโดยครอบคลุมจากเกรทเลค (Great Lakes) ไปจนถึงฝั่งตะวันออก  
 ออก (East)





แผนที่ 9 และแผนที่ 10

อากาศเย็นบุกรุกครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างจนถึงทางด้านตะวันตกของออกครุดตัน  
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เกรทเลค

