

บทที่ 9 แสงสว่าง

ธรรมชาติของแสง

แสงสว่างนับเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก วิชาพิสิกส์ที่เกี่ยวกับแสงสว่างได้พัฒนามาจากการสังเกต ทดลอง ของนักวิทยาศาสตร์หลายคนแล้วสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา และได้นำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่างมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากmany เรื่องของแสงสว่างถ้ากล่าวโดยละเอียดต้องใช้เวลา many ดังนั้นสิ่งที่จะกล่าวถึงในบทนี้เป็นเรื่องของแสงโดยสังเขปเท่านั้น

เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isac Newton) เป็นนักพิสิกส์คนแรกที่ได้รับเกียรติว่าเป็นผู้ตั้งทฤษฎีของแสงขึ้น นิวตันแคลงไว้ว่า "แสงสว่างเกิดจากสิ่งที่ให้กำเนิดแสงทำให้เกิดอนุภาคเล็ก ๆ ที่เรียกว่า คอร์พัสเซลล์ (corpuscles) และส่งให้มันเคลื่อนที่ไปในอากาศเป็นเส้นตรง ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างขึ้น" ทฤษฎีนี้ต่อมาเมื่อว่า ทฤษฎีอนุภาคของแสง (corpuscular theory) มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่ง โดยการนำของ ไฮเกน (Huygen) เชื่อว่าแสงเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งสิ่งกำเนิดแสงทำให้เกิดขึ้นแล้วส่งแพร่กระจายไปทุกทิศทุกทาง โดยมีอีเทอร์ (ether) เป็นพาหนะพาไปมากกว่า ทฤษฎีนี้เรียกว่า "ทฤษฎีคลื่นแสง"

ถ้าทฤษฎีทางแสงของนิวตันเป็นจริง แสงจะเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าแสงเดินทางในอากาศ ถ้าทฤษฎีของไฮเกนเป็นจริง แสงจะเดินทางในอากาศได้เร็วกว่าแสงเดินทางในน้ำ อย่างไรก็ตาม มีใครที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์ ของนิวตันผิดตรงที่ว่าแสงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าแสงเดินทางในอากาศ เพราะฟูโคล์ (Foucault) ได้ทดลอง พิสูจน์ว่าแสงเดินทางในอากาศได้เร็วกว่าแสงเดินทางในน้ำ ทำให้ทฤษฎีของไฮเกนถูกต้องในแต่เดียว แต่ทฤษฎีของไฮเกนผิดที่บอกว่าแสงเดินทางโดยมีอีเทอร์ เป็นพาหนะนำไป เพราะจากการทดลองของมอร์ลีย์และไมเชลสัน (Morley - Michelson) แสดงว่าอีเทอร์ไม่มีจริง

จากทฤษฎีอนุภาคแสงของนิวตัน นำไปสู่วิชาทางแสงสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มจากการทดลองของคอมพ์ตัน (Compton) ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน (Compton's Effect) หรือ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ไฟโตอิเลกตริก (photoelectric effect) ของไอส์เต้น กรณีทดลองเหล่านี้แสดงว่าแสงเป็นเม็ดอนุภาค พิจารณาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไฟโตอิเลกตริก คำว่า "ไฟโต" แปลว่าแสง หรืออะไรที่เกี่ยวกับแสง อย่างเช่น ร้านถ่ายรูปก็มีคำว่า "ไฟโต" เพราะการ

ถ่ายรูปต้องใช้แสง หรือการสังเคราะห์แสงของใบไม้มาจากการคำว่า (photosynthesis) อิเล็กตริก หมายถึง ที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอน ไฟโตอิเล็กตริก ก็คือ แสงกับอิเล็กตรอน ปรากฏการณ์นี้เกิดจาก การขยายแสงไปยังแผ่นโลหะบาง ๆ ด้วยความถี่ของคลื่นที่พอดีมากจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก มากจากแผ่นโลหะนั้น ซึ่งไอ索ไตน์สามารถวัดปริมาณของอิเล็กตรอนทางด้านตรงข้ามกับที่ ขยายแสงเข้าไปได้ ปรากฏการณ์คอมพ์ตันคือการทดลองไฟโตอิเล็กตริก เพียงแต่แสงที่ฉาย เข้าไปมีพลังงานน้อยกว่าของไฟโตอิเล็กตริก โดยการวัดแสงที่กระเจิงออกมาจากแผ่นโลหะ ทำให้คอมพ์ตันรู้ว่าพลังงาน และโมเมนตัมที่แสงสูญเสียให้กับอนุภาคภายในอะตอม เช่น อิเล็กตรอน ซึ่งการที่แสงมีคุณสมบัติตั้งปรากฏการณ์คอมพ์ตัน และปรากฏการณ์ไฟโตอิเล็กตริกได้นั้น แสง ต้องมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคหรือก้อนพลังงานของแสง เรียกว่า โฟตอน (photon)


จากเหตุผลที่กล่าวมานี้เราจะเห็นแล้วว่า เราอาจความถูกต้องของนิวตันและของ ไฮเกนมารวมกันและสรุปว่า แสงเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประจำตัวสองอย่าง (dual properties) คือ เป็นทั้งคลื่นพลังงานขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในอากาศ และถ้าพิจารณาที่ชุดใดชุดหนึ่งในคลื่นแสง หรือเวลาที่แสงทำปฏิกิริยากับสิ่งอื่นแล้ว มันเป็นก้อนพลังงาน มีเชื่อว่าโฟตอน

แสงสว่างคืออะไร

ความเร็วของแสง มุนช์ย์ในบุคโบราณเชื่อว่าความเร็วของแสงต้องมีค่าอนันต์ เพราะใน ที่ที่มีแสง เมื่อลืมตา ก็เห็นแสงทันที ซึ่งความเชื่อนี้ก็ฝังอยู่ในความคิดของมุนช์ย์บุคโบราณนับพัน ๆ ปี จนกระทั่งถึงสมัยของกาลิเลโอ จึงมีการพยายามจะวัดความเร็วของแสง โดยตัวกาลิเลโอและ ผู้ช่วยของเข้า ถือตะเกียงกันคนละดวง ขึ้นไปบนยอดเขาสองลูกซึ่งหัวใจระยะห่างเข้าสองลูกนี้ และอยู่ไม่ไกลกันนัก ให้สัญญาณเปิด-ปิด ดวงไฟแล้วจับเวลาและคำนวนหาความเร็วของแสง กาลิเลโอพบว่า เวลาที่แสงใช้ในการเดินทางกินเวลาอย่างมากจนบอกอะไรไม่ได้ เขาจึงสรุปว่า ความเร็วของแสงต้องมีค่าอนันต์ หรือมีค่าสูงมาก ๆ จนเขาวัดไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ ประมาณค่าความเร็วของแสงได้ คือ นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ชื่อ โอลاف โรเมอร์ (Olaf Roemer) โดยการสังเกตการโคจรของดาวจันทร์ของดาวพฤหัส เมื่อตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ ใกล้โลกที่สุด กับตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ไกลโลกที่สุดในวงโคจรรอบดาวอาทิตย์ เขายกเว่ ตอนที่ ดาวพฤหัสอยู่ใกล้โลกที่สุด ปรากฏการณ์ที่เขายกกรณ์เอาไว้จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าดาวพฤหัสอยู่ ใกล้โลกที่สุด โรเมอร์สรุปว่า เวลาที่ข้าไป คือ เวลาที่แสงใช้ในการเดินทาง ดังนั้น โอลاف โรเมอร์ จึงประมาณค่าความเร็วของแสงอย่างหยาบ ๆ ได้

ต่อจากนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์พยายามวัดความเร็วของแสงโดยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค่า ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น จนมาถึงไมเคิลสันและมอร์เลย์ ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของไฮเกนที่บอก

ว่ามีอีเทอร์เป็นตัวกลางของแสง และเป็นการหาความเร็วของแสงด้วย การทดลองของไม่เคลลสัน คล้ายกับการทดลองของกาลิเลโอ คือ เขารี้ยอดเขาสองลูกทางตอนใต้ของคลิฟอร์เนีย ชื่อ เขาวิลสัน (Mount Wilson) กับ เขานานแอนโธนิโอ (Mount San Antonio) ลูกหลังนี้ตอนหลังได้ ชื่อใหม่ว่า เข้าหัวโล้นหรือแบลดดี (Mount Baldy) ระยะทางระหว่างสองยอดเขาเท่ากับ 22 ไมล์ (ประมาณ 35 กิโลเมตร) บนยอดเขาวิลสันติดตั้งเครื่องกำเนิดแสง ส่องไปยังทบกระจากรูป แปดเหลี่ยม ให้สะท้อนไปยังเขาแบลดดี ซึ่งติดตั้งกระจากรูปแบบบานใหญ่เพื่อให้แสงสะท้อนกลับ มาบังกระจากรูปแปดเหลี่ยมซึ่งหนุนได้อีกรั้งหนึ่ง แบบจำลองลักษณะการทดลองของไม่เคลลสัน ได้แสดงไว้ในรูป 9.1



รูป 9.1 แบบจำลองการทดลองของไม่เคลลสัน

ผลจากการทดลองไม่เคลลสันสรุปว่า อีเทอร์ไม่มีจริง และเขารสามารถวัดความเร็วของแสงได้ละเอียดมาก ความเร็วของแสงในสัญญาากาศและในอากาศมีค่าใกล้เคียงกัน คือ สามแสน กิโลเมตร/วินาที หรือหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันไมล์/วินาที การทดลองนี้ทำให้เขารับรางวัลโนเบล (Noble Prize)

เราได้รู้จักคลื่น ความถี่คลื่น และความยาวคลื่น มาแล้ว ค่าอัตราเร็วของคลื่นอาจเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$V = \lambda f$$

ในสัญญาการ ความเร็วของแสงนิยมแทนด้วย c ซึ่งมีค่าดังนี้

$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ คือ ความถี่ λ ความยาวคลื่น ความจริงแล้วมีค่าลึกลึกกว่า
หลักชนิดที่มีอัตราเร็วค่าเดียวกันนี้ ซึ่งเราเรียกคลื่นที่ความเร็วค่านี้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(electromagnetic wave) ซึ่งรวมไปถึง คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ เอกซเรย์ อินฟราเรด อุลตร้าไวโอลেต
เราเคยทราบว่าหูมนุษย์เรา มีความสามารถจำกัด คือ รับเสียงได้ ในช่วงความถี่
20-20,000 เฮิรตซ์เท่านั้น ตาของมนุษย์เรา ก็มีความสามารถจำกัดเช่นกัน คือ สามารถรับแสงได้
ในช่วงความถี่ 400×10^{12} เฮิรตซ์ ถึง 750×10^{12} เฮิรตซ์ ในกรณีของแสงเรา尼ยมพุดในท่อง
ของความยาวคลื่น คือ ตาสามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในช่วงความยาวคลื่น 4000-7500
แองสโตรม (1 แองสโตรม เท่ากับ 10^{-10} เมตร) ดังนั้นเราอาจนิยมความหมายของแสงสร่าว่า
แสงสร่าวงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ทำให้ประสาทตาเกิดการมองเห็น หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ
แสงสร่าวงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 4000-7500 แองสโตรม เนื่องจาก
แสงสร่าวงเป็นพลังงานจึงมีความสามารถในการทำงาน และแสงสร่าวงยังสามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานรูปอื่นได้

แหล่งกำเนิดของแสง

แหล่งกำเนิดของแสงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. แหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่

- ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุด โลกเราได้รับฟังแสง
สร่าวงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ และแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ และดาวเคราะห์
อื่น ๆ ในวิภาคกลางคืน
- ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ในเอกภพ เป็นจุดที่มีแสงสว่างมากที่สุดในจักรวาล ไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์
- โลกจึงได้รับแสงสว่างจากดาวฤกษ์เพียงส่วนน้อย

2. แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ทำขึ้น ได้แก่ เครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานรูปอื่น ๆ ให้เป็น
พลังงานแสงสว่างได้ เช่น

- เครื่องมือที่ทำให้เกิดแสงสว่างจากพลังงานความร้อน เช่น ไฟฟ้า ไฟฟ้าชาร์จและ
ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้น
- เครื่องมือที่ทำให้เกิดแสงสว่างจากพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าชาร์จและ
หลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
- เครื่องมือที่ทำให้เกิดแสงสว่างจากพลังงานเคมี โดยมากมักเป็นการสันดาปของ
ธาตุหรือสารประกอบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ไฟฟ้าชาร์จและหลอดไฟฟ้าชาร์จและ
หลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

โซดิเทนวัตถุและโซดิเทนวัตถุ

ถ้าเราพิจารณาวัตถุตามลักษณะการมีแสงสว่างในตัวเอง เราแบ่งวัตถุออกได้เป็น 2 ชนิดคือ

1. โซดิเทนวัตถุ คือ วัตถุใด ๆ ที่สามารถส่องแสงสว่างมาเข้าตาเราได้ด้วยตัวของมันเอง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หินห้อย เป็นต้น
2. อโซดิเทนวัตถุ คือ วัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวของมันเอง เราเห็นวัตถุนั้นได้ เพราะวัตถุนั้นสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดอื่น ตัวอย่างของวัตถุชนิดนี้มีมากมาย เช่น โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ใต้ดิน เก้าอี้ เป็นต้น

ตัวกลาง

ตัวกลาง คือ สิ่งที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไป แบ่งตามธรรมชาติของเนื้อสารที่เป็นตัวกลางออกได้เป็น 2 ชนิด คือ


1. ตัวกลางเอกพันธุ์ (homogeneous medium) คือ ตัวกลางที่มีเนื้อเดียวกันตลอด เช่น น้ำ แก้ว ถุงญาการ
2. ตัวกลางวิวิธพันธุ์ (heterogeneous medium) คือ ตัวกลางที่ไม่มีเนื้อเดียวกันตลอด อาจจะเกิดจากการเอาตัวกลางเอกพันธุ์หลายชนิดมาซ่อนกัน ตัวอย่างของตัวกลางชนิดนี้ เช่น อากาศบริโภณ์ที่ถูกแัดเผาอยู่ตลอดเวลา ทำให้มันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเกิดเป็นชั้นทำให้แสงหักเหผ่านไปเป็นจำนวนไม่เท่ากัน

จำแสงและผู้กันรังสี

เนื่องจากแสงเดินทางในตัวกลางเอกพันธุ์เป็นเส้นตรง เราจึงอาจแยกประเภทจำแสงออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. พูกันรังสีขานาน เกิดจากรังสีหด自身 รังสี ขานานกัน เช่น แสงสว่างมาจากดวงอาทิตย์
2. พูกันรังสีตีบเข้า (convergent pencil) เกิดจากรังสีหด自身 รังสีพุ่งเข้าหากันเดียวกัน เช่น รังสีที่เกิดจากการนำเลนส์มนไปรวมแสงอาทิตย์ รังสีเมื่อผ่านเลนส์มนจะพุ่งไปยังจุดโฟกัส
3. พูกันรังสีกระจายออก (divergent pencil) เกิดจากรังสีหด自身 รังสีพุ่งออกจากจุดเดียวกัน เช่น รังสีเมื่อผ่านเลนส์เว้า แสงจากไฟฉาย และไฟฉายนต์

ตัวอย่างของพูกันรังสีทั้ง 3 ชนิด แสดงได้ดังรูป 9.2




รูป 9.2 แสดงพูกันรังสีกับแสง

ความเข้มของการส่องสว่าง

ความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงสว่างจะเปรียบเทียบกับความสว่างของเทียนมาตรฐาน (standard candle) ซึ่ง 1 กำลังเทียนมาตรฐาน หมายถึง ความสว่างจากเทียนไขปลาภาพ ซึ่งเผาในหมัดเปลืองไปชั่วโมงละ 7.776 กรัม หรือ 120 กรัม ถ้าตัวกำเนิดแสงสว่างได้ส่องสว่าง เป็นห้าเท่าของเทียนมาตรฐาน ก็เรียกตัวกำเนิดแสงสว่างนั้นว่า มีกำลังห้าແรนเทียน ส่วนความเข้มของการส่องสว่างที่ระยะใด ๆ นั้น คือ กำลังส่องสว่าง หารด้วยระยะทางกำลังสอง อย่างเช่น หลอดไฟฟ้า 100 แรงเทียน จะให้ความเข้มของการส่องสว่างบนจุดซึ่งอยู่ห่าง 5 พุต เท่ากับ $100/(5)^2$ เท่ากับ 4 พุต-แคนเดิล เป็นต้น

ในการเปรียบเทียบความเข้มของการส่องสว่างนั้น ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไฟโตมิเตอร์ (photometer) ซึ่งมีรูปร่างดังรูป 9.3 จากที่อยู่กึ่งกลางจะทำด้วยกระดาษไข เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเข้มของแสงได้



รูป 9.3 ไฟโตมิเตอร์

การสะท้อน การดูดกลืน และการเดินทางผ่านเข้าไปในตัวกลางได้ของแสง


เราได้ทราบแล้วว่า ถ้าแสงเดินทางในตัวกลางเอกสารนี้นิดหนึ่ง แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง แต่ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่หนึ่งไปกระทบตัวกลางที่สอง ที่ผิวต่อระหว่างตัวกลางที่หนึ่งและที่สอง จะมีปรากฏการณ์ 3 อย่าง เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ คือ

1. การสะท้อนกลับ
2. การดูดกลืน
3. การทะลุผ่านไปแต่มีการหักเห

เพราะว่าแสงเป็นพลังงาน จึงต้องเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงาน กล่าวคือ พลังงานที่แสงสะท้อนกลับ บาง พลังงานที่ถูกดูดกลืน บาง พลังงานที่ทะลุผ่านไป ต้องเท่ากับพลังงานทั้งหมดของแสงที่ตกกระทบผิวดินนั้น คุณสมบัติการสะท้อน การดูดกลืน และการหักเห ขึ้นอยู่ กับลักษณะของตัวกลางที่สอง


แทนที่จะศึกษากฎเกณฑ์การสะท้อนและการหักเหของแสงโดยละเอียด เราจะดูผลของมันที่เราได้พบได้เห็นในชีวิตประจำวัน

การสะท้อนแสงนั้นเราพบเห็นเป็นประจำ เพราะว่าการส่องกระจกคือ การใช้กฎการสะท้อนแสง อย่าลืมว่าภาพที่เห็นในกระจกเงินนั้นจะกลับข้ามเป็นขวาริมขวาเรียกว่า ปรัศภากวิโลม หมายความว่า ถ้าคนหัวผึ่งแสงก็จะ ภาพตัวเองในกระจกจะหัวผึ่งแสงก็จะ กล้องเปอร์สโคป (periscope) ที่เราเรียกว่า กล้องดูเหငุ่ หรือ กล้องตาเรือ ที่ให้ในเรื่องด้านน้ำสมัยแรก กระจกในห้องผ่าตัด กระจกส่องดูของหันตแพทย์ พวกรู้สึกว่าแสงสะท้อนแสง การสะท้อนแสงจะได้ดี หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของรอยต่อ ถ้าผิวเป็นเงามันก็สะท้อนแสงได้มาก ผิวขรุขระจะสะท้อนแสงได้ไม่ดี นอกจากนั้น การสะท้อนแสงยังขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบ (angle of incidence) ด้วยมุมตกกระทบคือมุมที่วัดจากแนวตั้งจากกับผิวไปยังรังสีตกกระทบ (ดูรูป 9.4) ถ้ามุมตกกระทบน้อยการสะท้อนแสงจะน้อยกว่ามุมตกกระทบใหญ่ ถ้าอย่างเรียนรู้กฎการสะท้อนแสง หาไฟฉายสักกีบกหนน์ถือเข้าไปในห้องมีด ๆ ที่มีกระจกเงา แล้วส่องไฟไปที่กระจกเงาด้วยมุมต่าง ๆ กัน สังเกตว่ามุมสะท้อน (angle of reflection) มีความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบอย่างไร (เท่ากัน)



รูป 9.4 การสะท้อนแสง

จากความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องการสะท้อนแสง เราจะเห็นว่า ในการที่จะส่องกระจາเพื่อให้เห็นตัวเราทั้งตัวนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระจกขนาดเท่าตัวเรา เราต้องการเพียงครึ่งหนึ่งของความสูงของตัวเราเท่านั้น แต่ต้องวางแผนที่ถูกต้อง (ขอบบนกระจกต่ำกว่าระดับสูงของศีรษะประมาณ 5 เซนติเมตร) ดังรูป 9.5 (ก) รูป 9.5 (ข) แสดงการเห็นภาพของวัตถุอื่นในกระจกเงา นอกจากที่กล่าวมาแล้วการสะท้อนแสงยังให้ผลทางอารมณ์ ลองไปส่องกระจกที่ใช้สำหรับมองหลังรถยนต์ที่ติดอยู่ข้างรถ เอาจาน้ำไปโกรล ๆ กระจก แล้วจะพบว่าหน้าเปลี่ยนไป อารมณ์อาจเสียถ้าเห็นมันไม่สวย บางคราวอาจขับขัน กระจกมองหลังรถยนต์เป็นกระจกโค้งมนไว้เพื่อให้มองเห็นด้านหลังรถยนต์ได้กว้าง ๆ รูป 9.5 (ค) เป็นภาพที่เกิดจากกระจกโค้งมน รูป 9.5 (ง) เป็นภาพที่เกิดจากกระจกโค้งกว้าง



รูป 9.5 การสะท้อนของกระจกเงา

การดูดกลืน วัตถุสีดำดูดแสงได้ดีมาก คือ ได้เก็บหมด เปอร์เซ็นต์ในการดูดกลืนขึ้นอยู่กับมุมตากะทบด้วย อายุ่่น เช่น ถ้าแสงอาทิตย์ตกด้วยกับผิวหรือมุมตากะทบเท่ากับศูนย์ สมมติว่าผิวที่กล่าวถึง คือ ผิวน้ำ แสงเก็บทั้งหมดจะหักเหเข้าไปในน้ำ และบางส่วนจะถูกดูดกลืนเอาไว้ แต่ถ้าแสงตากะทบเป็นมุมเฉียง แสงส่วนมากจะสะท้อนกลับ ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ เองที่เราสามารถมองภาพดวงอาทิตย์ในน้ำด้วยตาเปล่าในเวลา ก่อนเที่ยง เที่ยง หรือบ่ายเล็กน้อย แต่ถ้าเป็น 9.00, 10.00, 14.00, 16.00 น. เมื่อมองดูภาพดวงอาทิตย์ในน้ำจะทำให้ภาพร้าวได้ ยิ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าด้วยแล้วเราแทบมองไม่ได้เลย


การเดินทางผ่านเข้าไปในตัวกลางของแสง ส่วนสุดท้ายของแสงเมื่อแสงตากะทบบนรอยต่อของตัวกลางคือ ทะลุผ่านไป แต่จะมีการหักเห เราจะแบ่งตัวกลางตามลักษณะการยอมให้แสงผ่านออกเป็น 3 ชนิดคือ

1. ตัวกลางทึบแสง (opaque) พวจนี้ยอมให้แสงผ่านน้อยมากหรือไม่ยอมให้ผ่านเลย แสงส่วนใหญ่เมื่อตากะทบอาจจะถูกสะท้อนกลับเก็บหมด เชนกระจากเงา หรืออาจจะถูกดูดกลืนเก็บหมด เช่น วัตถุสีดำทึบ หรือ ผ้าดำหนา ๆ โลกเราจะเป็นวัตถุทึบแสง

2. ตัวกลางโปร่งแสง (translucent) พวจนี้ยอมให้แสงผ่านได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด แสงที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางชนิดนี้จะเปลี่ยนไปในตัวกลางนั้นทำให้ทิศทางของแสงเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จนทำให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุในตัวกลางนั้นได้ชัดเจนนัก เห็นแต่เงาพรา ๆ เท่านั้น ตัวกลางชนิดนี้ได้แก่ พวงกระจกผ้าที่เราใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือกระจกประตูห้องทำงาน

3. ตัวกลางโปร่งใสหรือตัวกลางโปร่งตา (transparent) พวจนี้ยอมให้แสงผ่านได้เกือบหมด ตาเราสามารถมองเห็นวัตถุในตัวกลางชนิดนี้ได้ชัดเจน เช่น กระจกใส น้ำใส อากาศ


การหักเหของแสง (refraction) เนื่องจากแสงเดินทางในตัวกลางต่างชนิดกันด้วยความเร็วไม่เท่ากัน และแสงยังเปลี่ยนทิศทางด้วย เราเรียกว่าแสงเกิดการหักเหภาพดู ปลา หอย ที่เราเห็นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือตู้เลี้ยงปลาของเรางักษ์ดี คุณจะเห็นมันอยู่ใกล้กับความเป็นจริง ดินสอ หรือไม้บรรทัดที่แข็งอยู่ในแก้วน้ำ เราจะเห็นเสมือนมีรอยหักที่ผิวน้ำ ลองสังเกตคนที่ยืนในสระว่ายน้ำ หรือในน้ำทะเล จะเห็นเสมือนว่าช่วงที่แข็งอยู่ในน้ำด้านในเขินขึ้นมา ดังรูป 9.6 (ก) เราอาจจะทดลองเรื่องการหักเหของแสงโดยถ่ายภาพแฟหรือสามก้าวเดียว หรือสามgangมาใบหนึ่งเอาราชีญูบทว่างไว้ที่ก้นถ้วย มองในทิศทางเดียว ๆ เล็งที่ขอบถ้วยหรือขอบสาม ก้าวระยะนี้พอมองเห็นราชีญูได้พอตี แล้วเห็นได้ถ้วยหรือสามลงใบเบา ๆ เพื่อไม่ให้ราชีญูเคลื่อนที่ เราจะสังเกตเห็นราชีญูค่อย ๆ เลื่อนขึ้น ทั้ง ๆ ที่ราชีญูจริงยังอยู่ที่เดิม ดังรูป 9.6 (ข) คนที่ใช้มาก แหงปลาหรือพวงที่ใช้ปืนยิงปลา รูฟลิกส์ข้อนี้ดี คือเขาจะเล็งตามกาวหรือปืนให้ต่ำกว่าที่เขาเห็นเล็กน้อยเพื่อให้ถูกปลาตัวจริง



รูป 9.6 การหักเหของแสง


แสงกับการมองเห็น

มนุษย์ดีก์คำบรรพ์หรือแม่แต่เด็ก ๆ บางคนในสมัยนี้ อาจจะคิดว่าการที่เรามองเห็นวัตถุได้ เพราะมีแสงพุ่งออกจากตาไปถูกวัตถุนั้น คล้าย ๆ กับแสงที่พุ่งออกจากไฟ หรือตาสัตว์ประหลาดที่ดูในภาพพยนตร์หรือโทรทัศน์ แม่แต่เพลโตก็ยังเคยเขียนว่า การมองเห็นนั้นเกิดจากดวงตาส่งกระแสอะไรย่างหนึ่งไปสมผัสวัตถุนั้น เหล่านักปรัชญากรีบโนราณเขาว่า ดวงตาก็เหมือนธนู คือเป็นตัวรับคลื่น ไม่ใช่ตัวส่งคลื่น การที่จะเห็นวัตถุได้ก็ เพราะมีแสงจากวัตถุนั้นมาเข้าตาเรา ซึ่งแสงจากวัตถุอาจจะเป็นแสงของวัตถุเอง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงสะท้อนจากวัตถุนั้น เช่น ดวงจันทร์ก็ได้ ดูตัวอย่างในรูป 9.7



รูป 9.7 การมองเห็นเกิดจากการสะท้อนจากวัตถุเข้าตา

ในสมัยก่อนนิวตันมีความเชื่อว่า แสงสีขาวที่เรามองเห็นเป็นแบบบริสุทธิ์ คือ แยกไม่ได้ นิวตันได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แสงสีขาวที่เรามองเห็นประกอบด้วยแสงเจ็ดสี โดยใช้แท่งแก้ว สามเหลี่ยมที่เรียกว่า ปรีซึม แยกแสงสีขาวออกเป็นสเปกตรัม (spectrum) ของสี ภาษาอังกฤษ ให้ชื่อย่อ ๆ ว่า VIBGYOR V (Violet) สีม่วง I (indigo) สีคราม B (blue) สีน้ำเงิน G (green) สีเขียว Y (yellow) สีเหลือง O (orange) สีส้มหรือแดง และ R (red) สีแดง นิวตันยังได้แสดงให้เห็นอีกว่า แสงเจ็ดสีถ้ารวมกันอีก จะเป็นสีขาว โดยใช้ปรีซึมอันที่สองกลับข้างตรงข้ามกับปรีซึมอันแรก จะได้แสงรวมกันเป็นสีขาว ดังรูป ๙.๘ (ก) เราอาจจะใช้การเล่นของเด็กมาทดลองความจริงข้อนี้ได้ โดยทาสีบนฝาเบียร์หรือหัวลูกข่างแล้วทำให้มันหมุน สังเกตดูสีเวลาฝาเบียร์หรือลูกข่างหมุนเร็ว ๆ ดูรูป ๙.๘ (ข)



รูป ๙.๘ แสดงการทดลองเพื่อแยกและสมสีขาว

ในบทที่ ๘ เรายังได้กล่าวว่า หูของเรารับเสียงความถี่สูง แปลความหมายว่าเป็นเสียงสูง หรือเสียงแหลม คลื่นเสียงความถี่ต่ำ หูแปลความหมายว่าเป็น เสียงต่ำ หรือเสียงทุ่ม ตาของมนุษย์เรา ก็คล้าย ๆ กัน คือ ในช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามองเห็น ถ้าตัวรับคลื่นความถี่สูง (ความยาวคลื่นสั้น) ตาจะรับรู้ว่าเป็นสีม่วง สีน้ำเงิน ถ้าเป็นพากความถี่ต่ำ (ความยาวคลื่นยาว) ตาแปลความหมายว่าเป็นสีเหลือง สีแดง

การมองเห็นสีของวัตถุ

วัตถุที่บ่งแสง ถ้าวัตถุที่บ่งแสงจะท่อนแสงสีใด เราจะมองเห็นวัตถุมีสีนั้น อย่างเช่น เพื่อนที่ใส่เสื้อสีแดง ก็หมายถึงว่า วัสดุที่เข้าทำสีของเพื่อนจะท่อนแสงสีแดงได้ดีที่สุด ส่วนอีกหกสีจะถูกดูดกลืนเสียเป็นส่วนใหญ่

วัตถุไปร่วงแสง ถ้าวัตถุยอมให้แสงสีใดผ่าน เรายจะเห็นวัตถุเป็นสีนั้น อย่างเช่นแก้วสีแดง คือ แก้วที่ยอมให้แสงสีแดงผ่านทะลุไป แต่ดูดกลืนแสงสีอื่น ๆ ถ้าแก้วที่ยอมให้แสงผ่านทุกสี เรา ก็พูดว่าแก้วนั้นสีขาว หรือแก้วใส ซึ่งเป็นกรณีของวัตถุไปร่วงตา

ทั้งกรณีเสื้อแดงและแก้วแดง ถ้าเราสามารถหาแสงที่ไม่มีสีแดงรวมอยู่ในนั้นสองไปยังเสื้อและแก้วที่เราเคยเห็นเป็นสีแดงในแสงสีขาว เรายจะเห็นว่าทั้งแก้วและเสื้อเป็นสีดำหรือค่อนไปทางดำ การที่บอกว่าค่อนข้างดำ ก็ เพราะว่าคำว่าแดงของเสื้อหรือแดงของแก้ว อาจจะไม่ใช่สีแดงของสีรุ้งจริง ๆ ก็ได้ อาจมีสีอื่นเจือปนอยู่บ้าง

ประสบการณ์ของเราจะเคยเห็นคือ ตามทางรถไฟตัดกับถนนใหญ่ หรือไฮเวย์บางสาย จะมีคอมไฟสีเหลืองติดไว้ ลงสังเกตดูสีเสื้อที่สวม หรือสีชนบัตร ให้คอมไฟนี้สังเกตว่ามันเป็นสีเดียวกับที่คิดหรือไม่ ผู้โดยสาร往往แท็กซี่ อาจจ่ายค่าโดยสารแพงถ้าไปจ่ายให้คอมไฟสีเหลืองโดยลืมอ่านตัวเลขจากชนบัตร เพราะเขารู้ว่าชนบัตรใบละยี่สิบมันมีสีเหมือนกับชนบัตรใบละสิบก็ได้ หนุ่มสาวดิสโก้ อาจเรียนพิสิกส์ได้ในฟอร์ โดยการสังเกตสีเสื้อคู่เต้น เมื่อถูกแสงจากสปอร์ตไลท์ส่องต่าง ๆ

นักศิลปะบ้านน้ำแล้วว่า สีต่าง ๆ เกิดจากการผสมของแมสี ที่เราเรียกว่า primary colors ซึ่งบางทีก็เปล่าว สีปฐมภูมิ ซึ่งมีสีแดง เหลือง น้ำเงิน เม็ดสีของ primary colors เรียกว่า primary pigments ซึ่งบางคนเปล่าว รงค์วัตถุปฐมภูมิ


ดวงตา (Eyes)

อวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น คือ ตา ตามีลักษณะคล้ายกล้องถ่ายรูป ถ้ามีความผิดปกติทางตา อาศัยความรู้ทางพิสิกส์ช่วยได้อย่างไร

สายตาสั้น (myopia) เกิดจากภาพที่เลนส์แก้วตา ตกไม่ถึง retina เราต้องใช้เลนส์เว้าช่วยถ่างแสง เพื่อให้แสงที่ผ่านเลนส์เว้าและเลนส์แก้วตาแล้วไปเกิดภาพที่ retina พอดี

สายตายาว (hyperopia) เกิดจากภาพที่เกิดจากเลนส์แก้วตาไปตกเลย retina เราต้องใช้เลนส์ญี่ปุ่นช่วยรวมแสง เพื่อให้แสงที่ผ่านเลนส์ญี่ปุ่นและเลนส์แก้วตาแล้วเกิดภาพไปตกที่ retina พอดี

รูป 9.9 เป็นรูปส่วนประกอบของดวงตา และแสดงสายตาสั้น สายตายาว พัฒนาทั้งแgn ที่ให้หมายความากับแต่ละกรณี



รูป 9.9 ดวงตาและการแก้ไขตาที่ผิดปกติ

สายตาเอียง (astigmatic eye) แก้โดยใช้เลนส์รูปพิเศษ ที่เรียกว่า cylindrical surface lens นอกจากพิสิกส์จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสายตาดังกล่าวข้างบนนั้น อาศัยเทคนิคทางพิสิกส์ด้านอื่นก็เป็นทางช่วยได้อีก อย่างเช่นการผ่าตัดตาด้วยแสงเลเซอร์ (laser) ซึ่งเป็นเทคนิคที่กำลังกล่าวขวัญถึงในประเทศไทยของเรา นอกจากแปร่สายตา อาศัยความรู้ทางพิสิกส์รายรังมีแปร่กันเดด แปร่ขยาย เป็นต้น

แบบฝึกหัด

- 9.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแสงของนิวตัน (Sir Isaac Newton) กับของฮอยเกนส์ (Huygens) มีสาระสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร
- 9.2 ไมเคิลสัน และมอร์เลย์ (Michelson & Morley) ข้อด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับแสงของฮอยเกนส์ อย่างไร และเข้าได้รับรางวัลโนเบล จากการทดลองเชื่องอะไร
- 9.3 แสงสว่างคืออะไร และมีคุณสมบัติประจำตัวอย่างไร
- 9.4 แหล่งกำเนิดของแสงสว่างได้มาจากที่ใด การเพาส์นินเป็นแหล่งกำเนิดประเภทใด เกิดเป็นแสงสว่างได้อย่างไร
- 9.5 โซเดียมวัตถุ และอโซเดียมวัตถุ หมายถึงอะไร
- 9.6 ตัวกลางของแสงหมายถึงอะไร สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
- 9.7 จำแสงคืออะไร แบ่งออกได้เป็นกี่แบบอะไรบ้าง
- 9.8 ความเข้มของการส่องสว่าง คืออะไร 1 กำลังเทียนหรือ 1 แรงเทียน หมายถึงอะไร และคำว่าหลอดไฟฟ้า 100 แรงเทียน หมายความว่าอย่างไร
- 9.9 ถ้าแสงเดินทางในตัวกลางเอกพันธุ์จะเป็นอย่างไร และถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางชนิดหนึ่งไปยังตัวกลางอีกชนิดหนึ่ง จะเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างไร
- 9.10 การดูดกลืนของแสงเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับอะไร
- 9.11 เราสองเห็นสีของวัตถุได้อย่างไร อธิบายให้เข้าใจ
- 9.12 สายตาสั้น และสายตายาว เกิดขึ้นได้อย่างไร ความรู้ทางพิสิกส์ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
- 9.13 ความรู้เรื่องแสงที่เรียนมานี้ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง