

## บทที่ 9

### การสืบพันธุ์

(Reproduction)

การสืบพันธุ์หมายถึงการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ให้มากขึ้น โดยหน่วยที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีรูปร่างลักษณะและการดำเนินชีวิตเหมือนกับบรรพบุรุษ

โดยทั่ว ๆ ไป การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมักมี 2 แบบใหญ่ ๆ คือการสืบพันธุ์ชนิดไม่อաչայլ (ASEXUAL reproduction) และการสืบพันธุ์ชนิดօաչայլ (SEXUAL reproduction) การสืบพันธุ์ชนิดไม่อաչայլนี้เกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตเพียงหน่วยเดียวทำการทวีจำนวนโดยวิธี fission, budding, sporulation หรือ fragmentation วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วหน่วยใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับหน่วยเดิมทุกประการ ส่วนการสืบพันธุ์ชนิดօաչայլนี้เกิดจากการที่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศผู้ (sperm) มาผสมหรือปฏิสนธิ (fertilized) กับเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพศเมีย (egg) ได้เป็นไซโ哥ต (zygote) ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่มีครบตั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน (monoecious) ในกรณีนี้การสืบพันธุ์ชนิดօաչայլนี้หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นจะรวมเอาลักษณะของพ่อและแม่มาไว้ด้วยกัน

#### 9.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis)

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) เป็นการทวีจำนวนเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การแบ่งเซลล์แบบนี้พบในสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ (multicellular organism)

ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นี้ได้มีการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1841 โดยนักชีวิทยาชื่อ โรเบิร์ต รีมัค (Robert Remak) ได้เสนอความคิดเห็นว่าเซลล์ทั้งหล่ายเกิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่เดิม ในปี ค.ศ. 1844 นักชีวิทยาชื่อ คาร์ล เนเกล (Karl Nageli) ได้ทำการทดลองสนับสนุน ต่อมาอีกประมาณปี ค.ศ. 1865 ออสการ์ เฮิร์ทวิก (Oskar Hertwig) ได้ค้นพบกลุ่มเส้นใยภายในนิวเคลียสชื่อ วิลเชล์ม พอน วาลดเยอร์ (Wilhelm von Waldeyer)

ตั้งชื่อว่า โครโนโซม (chromosome) ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1888 ต่อมานีปี ค.ศ. 1910 มอร์แกน (T.H. Morgan) และผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครโนโซม และต่อมายกเว่อร์ โครโนโซมประกอบขึ้นด้วยหน่วยเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่า ยีนส์ (Genes) ซึ่งในปัจจุบันพบว่าคือสาร DNA

ในปี ค.ศ. 1953 เจมส์ วัตสัน (James Watson) กับ คริก (F.H.C. Crick) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA และในที่สุดสามารถสร้างหุ่นจำลองโครงสร้างของ DNA สำเร็จดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทต้น ๆ

ขบวนการแบ่งเซลล์นั้นประกอบด้วยขบวนการย่อย ๆ สองระยะคือ ระยะแรก โครโนโซมภายในนิวเคลียสจะทวีจำนวนขึ้นเป็นสองเท่า (duplication) ระยะนี้เรียกว่า ระยะไมโตซิส (mitosis) ส่วนระยะที่สองซึ่งเรียกว่าระยะไซโตไซติก (cytokinesis) นั้น เป็นระยะที่ไซโตพลาสม์จะแบ่งตัวออกเป็นสองส่วน แต่ละส่วนจะมีจำนวนโครโนโซมเท่ากัน เมื่อขบวนการทั้งสองระยะนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะได้เซลล์ใหม่เป็นสองเซลล์


ลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะมีรายละเอียดโดยสังเขปต่อไปนี้

#### ระยะในไมโตซิส (mitosis)

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะไมโตซิสจะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากนักแต่ก็อาจแยกออกเป็นขั้นต่าง ๆ ตามความแตกต่างได้เป็นสี่ขั้น คือ โปรเฟส (prophase) เมตาเฟส (metaphase) อนาเฟส (anaphase) และทีโลเฟส (telophase) แต่ก่อนที่นิวเคลียสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นทั้งสี่ขั้นนี้ จะอยู่ในระยะที่เรียกว่า อินเทอร์เฟส (interphase) หรือระยะเมตาโบลิก (metabolic stage) หรือที่นักศึกษาเคยเรียนมาในชั้นต้น ๆ ว่าระยะพัก (resting stage) นั่นเอง

#### ขั้น Interphase

ลักษณะของเซลล์ในระยะนี้ จะพบว่านิวเคลียสอยู่ในบริเวณกลางเซลล์ล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane) ซึ่งเป็นผนังสองขั้น ภายในบรรจุด้วยสารเหลวที่ใสແต่านิดข้น ซึ่งเรียกวานิวคลีโอพลาสม์ (nucleoplasm) หรือนิวเคลียร์ แซป (nuclear sap) และมีท่อนโครโนโซมลอยอยู่ทั่วไปในจำนวนที่เป็นลักษณะเฉพาะชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ โครโนโซมแต่ละท่อนภายในจะมีเส้นใยยาวชดเชยอยู่สองเส้น แต่ละเส้นเรียกว่า โครโนเนมา (chromonema) ดังแสดงในภาพ 9-1



ภาพ ๙-๑ โครโนโซม

โครโนโซมแต่ละท่อนในนิวเคลียส จะมีคู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอีกท่อนหนึ่ง โครโนโซมที่มาเป็นคู่กันได้นี้ แต่ละท่อนเรียกว่า ไซโนโลกัส โครโนโซม (homologous chromosome) เป็นโครโนโซมที่นำลักษณะของพ่อ (paternal chromosome) ท่อนหนึ่งและนำลักษณะของแม่ (maternal chromosome) อีกท่อนหนึ่ง เชลล์ที่มีจำนวนโครโนโซมครบถ้วน เรียกจำนวนโครโนโซมในเชลล์นั้นว่า จำนวนดิพloidiyต (diploid number- $2N$ ) สำหรับจำนวนโครโนโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม เรียกว่า โครโนโซมชุดนั้นมีจำนวนแฮปพลอยด์ (haploid number- $N$ ) ซึ่งจะพบได้ในเซลล์สืบพันธุ์ทั่ว ๆ ไป

### ขั้น Prophase

ในขั้นนี้ โครโนโซมแต่ละท่อนจะ duplicate ตัวเองเป็นสองท่อน แต่ละท่อนเรียกว่า โครมาติด (chromatid) ซึ่งจะยึดติดกันอยู่ที่บริเวณหนึ่งที่เรียกว่า เซนโตรเมียร์ (centromere) หรือ ไคเนต็อกออร์ (kinetochore) ต่อจากนั้น โครโนโซมจะหดตัวสั้นเข้าหากันให้เห็นเด่นชัดขึ้น ในขณะเดียวกัน เชนทริโอล (centriole) จะ duplicate ตัวเองออกเป็นสองอันแล้วเคลื่อนตัวแยกออกจากกันไปอยู่ฝากร่องกันข้างมุม พร้อมกันนั้น ไซโตพลาสม์ที่อยู่ล้อมรอบ เชนทริโอล จะขันขึ้น เราเรียกองค์ประกอบนี้ว่า เซนโตรโซม (centrosome) รอบ ๆ เซนโตรโซมนี้จะมีแนวของไซโตพลาสม์กระกระจายออกโดยรอบแนวที่โยงยึดอยู่ระหว่างเซนโตรโซมกับแนวกลาง เชลล์ เรียกว่า สปินเดล ไฟเบอร์ (spindle fiber) ส่วนแนวอื่น ๆ เรียกว่า แอสตรัล เรย์ (astral ray)

เมื่อถึงระยะนี้ เยื่อหุ้มนิวเคลียส นิวคลีโอลัสและนิวคลีโอพลาสม์จะสลายตัวไป ดังนั้นภายในเซลล์จะปรากฏให้เห็นเพียงโครโนโซมและไซโตพลาสม์เท่านั้น โดยที่โครโนโซมเริ่มเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณตอนกลางเซลล์ (equatorial plane)

#### ขั้น Metaphase

เป็นระยะที่โครโนโซมเคลื่อนเข้ามาอยู่บริเวณกลางเซลล์แล้ว พร้อมกันนั้นโครมาติดของโครโนโซมแต่ละท่อนจะแยกออกจากกันและเตรียมเคลื่อนห่างไปสู่ฝั่งเซลล์ของตนเอง ต่อไป

#### ขั้น Anaphase

ในระยะนี้โครมาติดซึ่งแยกออกจากกันแล้ว เรียกว่า daughter chromosome จะเคลื่อนห่างออกจากกันเข้าไปสู่เซนโตรโซม โดยบริเวณที่เป็นเซนโตรเมียร์จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้รูปร่างของโครโนโซมในระยะนี้จึงมีรูปคล้ายตัว V หรือ J การเคลื่อนที่ของโครโนโซมนี้เกิดจากการหดตัวของเส้นสปินเดล ไฟเบอร์ซึ่งจะนำเอาโครโนโซมเข้ามารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน

#### ขั้น Telophase


เมื่อโครโนโซมเข้ามารวมกันที่บริเวณเซนโตรโซมแล้วจะยึดขยายออกและเชื่อมประสานกัน พร้อมกันนั้น สปินเดล ไฟเบอร์ แอดสตรัล เรย์ และเซนโตรโซมจะสลายตัวไปด้วย และจะเกิดมีนิวคลีโอลัส นิวคลีโอพลาสม์ กับเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นล้อมรอบกลุ่มของโครโนโซมนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขณะนี้จะมีนิวเคลียสปรากฏอยู่ในเซลล์นั้น 2 อัน

#### ระยะไซโตไคโนซิส (Cytokinesis)

ระยะไซโตไคโนซิสเป็นระยะที่ไซโตพลาสม์แบ่งแยกออกจากกันเป็นสองส่วน การแบ่งนี้เกิดขึ้นในตอนปลายของขั้นอนาคต โดยถ้าเป็นเซลล์สัตว์ บริเวณกลางเซลล์จะคอดเข้ามาหากัน (furrowing) เรื่อยๆ จนในที่สุดจะขาดออกจากกันเมื่อถึงปลายขั้นที่โลเพส ได้เป็นสองเซลล์อิสระ แต่ถ้าเป็นเซลล์พืช การแบ่งจะเกิดขึ้นโดยที่จะมีสารประเกทเซลลูโลส (cellulose) มาสะสมกันอยู่ในบริเวณตอนกลางเซลล์แนวสะสมนี้เรียกว่า เชลเพลท (cell plate) จากนั้นแนวเซลล์เพลทนี้จะขยายตัวออกเรื่อยๆ จนไปบรรจบหน้าเซลล์เดิม และเรียกชื่อใหม่ว่า มิดเดล ลามมาล่า (middle lamella) ทำให้เกิดเซลล์ใหม่สองเซลล์โดยสมบูรณ์

ในเซลล์บางประเภท เช่น เซลล์ของกล้ามเนื้อ หรือเซลล์ของพิชชันต่ำกว่าเรือร่า เมื่อนิวเคลียสแบ่งออกจากกันแล้ว ไม่มีการแบ่งไซโตพลาสม์ตามมา จึงทำให้เห็นว่าภายในเซลล์นั้นมีนิวเคลียสอยู่รวมกันหลายนิวเคลียส เซลล์ในลักษณะเช่นนี้ถูกเป็นเซลล์สัตว์ เรียกว่า ชันไชเทียน (syncytium) ถ้าเป็นเซลล์พืชเรียกว่า ชีไนไซท์ (coenocyte)

แผนภาพแสดงการแบ่งเซลล์ในระดับและขั้นต่างๆ แสดงได้ดังนี้




ภาพ 9-2 แสดงระดับของการแบ่งเซลล์แบบไมโครสkop

## 9.2 การแบ่งเซลล์แบบไม้โอซิส (Meiosis)

การแบ่งเซลล์แบบไม้โอซิส (meiosis) เป็นการแบ่งของเซลล์เพื่อให้เซลล์นั้นไปทำหน้าที่เป็นเซลล์สีบพันธุ์ (gamete) ในสิ่งมีชีวิตขั้นสูงนั้นแגםมีทหรือเซลล์สีบพันธุ์มักมีลักษณะและขนาดแตกต่างกัน เรียกว่า เอกโทโรแგเมติก (heterogamete) เซลล์สีบพันธุ์ของเพศเมียซึ่งเรียกว่า ไข่ หรือ ออวัม (egg หรือ ovum) มักจะมีขนาดใหญ่ไม่เคลื่อนที่และมักมีอาหารสะสมอยู่ภายใน อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สีบพันธุ์เพศเมียนี้คือ รังไข่ (ovary) เซลล์สีบพันธุ์ของเพศผู้เรียกว่า สเปอร์ม (sperm) มักมีขนาดเล็ก และเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วว่องไว อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เพศชนิดนี้คือ อันทะ (testis) สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีความสามารถสร้างเซลล์สีบพันธุ์ได้เพียงชนิดเดียว (dioecious) แต่บางชนิดสามารถสร้างเซลล์สีบพันธุ์ได้ทั้งสองชนิด (monoecious หรือ hermaphrodite) เซลล์สีบพันธุ์แต่ละชนิดนั้น จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ในเซลล์ทั่วไป (haploid number) สิ่งนี้นับเป็นลักษณะสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไม้โอซิส ขบวนการไม้โอซิสที่เกิดขึ้นในรังไข่ เพื่อสร้างเซลล์สีบพันธุ์เพศเมียนั้น เรียกว่า โอโอะจินชิส (oogenesis) ส่วนขบวนการไม้โอซิสที่เกิดขึ้นในอันทะเพื่อสร้างเซลล์สีบพันธุ์เพศผู้นั้น เรียกว่า สเปอร์โนไซเนชัน (spermatogenesis)

ขบวนการไม้โอซิสประกอบด้วยระยะของความเปลี่ยนแปลง 2 ระยะคือ first meiotic division และ second meiotic division ผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบนี้จะทำให้ได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้น 4 เซลล์ จากเซลล์เดิม 1 เซลล์ และแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเป็น haploid ในการแบ่งเซลล์แต่ละระยะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นโปรเฟส เมตาเฟส อนาเฟส และทีโลเฟส เหมือนกันกับในการแบ่งเซลล์แบบไม้โടซิส

ในระยะ first meiotic division นั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและแตกต่างไปจาก การแบ่งไม้โടซิส คือ หลังจากที่โครโมโซมแต่ละท่อน duplicate ตัวเองแล้ว ท่อนที่เป็นคู่ของกัน (homologous chromosome) จะมาเข้าคู่ขานานกัน แล้วโครมาติดบางส่วนจะไขว้กัน (cross over) และแลกส่วนของโครมาติดจากโครโมโซมที่มาเข้าคู่กันนั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า synapsis จากนั้นโครโมโซมต่างจะหัดสั้นและหนาขึ้น ดังนั้น homologous chromosome แต่ละคู่จะเห็นเป็นสี่โครมาติดด้วยกัน เรียกว่า tetrad ความเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นในขั้นโปรเฟสของ first meiotic division ในขั้นต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงคล้าย ๆ กับของ




ภาพ ๙-๓ แสดงระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโครสิส

ไม่โตซิส เว้นแต่เพียงว่า ท่อนโครโนซมที่มาเข้าคู่กันนั้นจะแยกออกจากกันไปอยู่ฝากรเซลล์ ครองกันข้าม แล้วเกิดการแบ่งเซลล์ เซลล์ที่ได้ในขณะนี้จะมีโครโนซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเดิม แต่ว่าโครโนซมแต่ละท่อนจะประกอบด้วย 2 โครมาติด

ในระยะ second meiotic division ขั้นโปรเฟส โครโนซมจะไม่ duplicate ตัวเองอีก จะผ่านเข้าสู่ขั้นเมตาเฟสและอนาเฟสอย่างรวดเร็ว ในขั้นอนาเฟสนี้ โครมาติดของโครโนซม แต่ละท่อนจะแยกออกจากกันไปอยู่ฝากรเซลล์ตรงกันข้าม แล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันเป็นโครโนซม ชุดใหม่และแปรสภาพเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสต่อไปในระยะที่โลเฟส


เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวผู้ (spermatozoa) นั้นสร้างมาจากเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ซึ่งบุอยู่ ตามผนังของท่อผลิตเซลล์เพศ ส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียสร้างมาจากเนื้อเยื่อฟอลลิคูล (follicle) ของรังไข่ เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในระยะ first meiotic division ซึ่งได้สองเซลล์นั้น เซลล์หนึ่งจะมีขนาดใหญ่ และอีกเซลล์หนึ่งมีขนาดเล็ก เซลล์ขนาดใหญ่ เรียกว่า primary oocyte ส่วนเซลล์เล็กเรียกว่า first polar body เมื่อเซลล์ทั้งสองแบ่งตัวอีกครั้งหนึ่ง จะได้ เซลล์ขนาดใหญ่ 1 เซลล์เรียก secondary oocyte หรือ ovum ส่วนอีก 3 เซลล์จะมีขนาดเล็ก เรียก second polar body ในเวลาต่อมา polar body เหล่านี้จะถลายตัวไป เหลือแต่เพียง ovum เท่านั้น

โครโนซมที่ปรากฏอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไปนั้น จะมีอยู่คู่หนึ่งซึ่งทำหน้าที่ เป็นตัวควบคุมลักษณะเพศ โครโนซมคู่นี้เรียกว่า โครโนโซมเพศ (sex chromosome) โครโนซมที่กำหนดเพศชายจะมีลักษณะแตกต่างจากโครโนซมที่กำหนดเพศหญิงบ้างเล็กน้อย โดยที่โครโนซมเพศชาย (ซึ่งนิยมสมมติเรียกว่า Y chromosome) จะสั้นกว่าโครโนซมเพศ หญิง (ซึ่งนิยมสมมติเรียกว่า X chromosome) อยู่เล็กน้อย ในเพศหญิงโครโนซมเพศจะ ปรากฏเป็น XX ส่วนในเพศชายโครโนซมเพศจะปรากฏเป็น XY โครโนซมคู่อื่น ๆ ซึ่ง ไม่ใช่โครโนซมเพศ แต่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป รวมเรียกว่า ออโตโซม (autosome) ดังนั้นถ้าเรายกตัวอย่างมนุษย์ ซึ่งปกติมีจำนวนโครโนซม 46 ท่อน หรือ 23 คู่ จะเป็นออโตโซมเสีย 44 ท่อนหรือ 22 คู่ เป็นโครโนซมเพศ 2 ท่อน หรือ 1 คู่ ด้วยเหตุนี้จึง เป็นที่แน่นอนว่าหากจากออโตโซม 22 ท่อนแล้ว ไม่จะต้องมี X chromosome ส่วนสเปอร์ม จะมี X chromosome หรือ Y chromosome ก็ได้ และเมื่อไข่กับสเปอร์มผสมกัน (fertilize) แล้วจะได้ลูกเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย แล้วแต่โอกาสการเข้าผสมดังภาพ



ภาพ ๑-๔ แสดงโอกาสการผสมกันของเชื้อเพศ

ในพืชและสัตว์บางชนิด แม้ว่าจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แต่ในบางกรณี เชลล์สืบพันธุ์เพศเมียสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องได้รับการผสมจากเชลล์เพศตัวผู้ ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า parthenogenesis นับได้ว่าเป็นการผสมพันธุ์แบบไม่อ่อนคายเพศอีกแบบหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์มีหลายอย่าง ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ตัวอย่างที่พบเห็นเป็นประจำ ได้แก่ มะดัน กล้วย องุ่น กล้วย เป็นต้น สิ่งมีชีวิตจำพวกพืช แม้ว่าจะมีอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่ในการดำรงชีวิตก็ยังอาจแบ่งช่วงชีวิต ออกได้เป็นสองช่วง คือช่วงที่ทำหน้าที่สร้างสปอร์ ซึ่งเรียกว่าช่วงสปอร์โไฟต์ (sporophyte) เป็นช่วงที่เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น diploid number (2N) กับช่วงกามีໂடไฟต์ (gametophyte) เป็นช่วงที่เซลล์มีจำนวนโครโมโซมเป็น haploid number (N) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์เพศ ช่วงชีวิตทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นสลับกันไปเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า การสืบพันธุ์แบบสลับ (alternation of generation) ถ้าเกิดในสัตว์ เรียกว่า เมตาเจเนชีส (metagenesis) สำหรับในพืชนั้นยังเป็นพืชที่มีความเจริญมากขึ้นแต่ได้ก็จะมีช่วงสปอร์โไฟต์ยาวกว่าช่วงกามีໂটไฟต์มากขึ้น



ภาพ 9-6 แสดงการสืบพันธุ์แบบสับ


### 9.3 การสืบพันธุ์ในมนุษย์ (Reproduction in Man)

การสืบพันธุ์ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั้น เป็นการรวมกันของเซลล์เพศ หญิงหรือไม่กับเซลล์เพศชายหรือสเปอร์ม ทำให้ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมา

#### 9.3.1 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (The Male Reproductive System)

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วยอัณฑะ (testis) 1 คู่ซึ่งเดิมเจริญอยู่ภายในช่องท้องแล้วเคลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะ (scrotal sac) ที่ด้านหน้าตอนล่างภายหลังช่องท้อง

ภายในต่อมอัณฑะแต่ละข้างจะมีท่อ เชมินิเพอร์ส ทิวบูล (seminiferous tubules) ขนาดรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น ระหว่างกัมของท่อชนิดนี้เป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายชนิดเทสโถสเตอโรน (testosterone) กับกลุ่มเซลล์ซึ่งทำหน้าที่สร้างเซลล์เพศชาย ปลายด้านหนึ่งของท่อเชมินิเพอร์สเป็นหลอดขนาดเล็กเรียกว่า วาส เอฟเฟอเรนส์ (vas efferens) ซึ่งจะเข้าไปรวมกันอยู่ในท่อที่เรียกว่า เอพิดิไดมิส (epididymis) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักชั่วคราวของเชื้อเพศชาย ถัดจากเอพิดิไดมิสไปเป็นท่อน้ำเชื้อเพศ (sperm duct หรือ vas deferens) ซึ่งจะผ่านเข้าช่องท้องไปบรรจบกับท่อปัสสาวะ





เชื้อเพศชาย (spermatozoa หรือ sperm) ซึ่งเกิดจากการแบ่งแบบไม้ออซิสจะว่ายอยู่ในของเหลวซึ่งเป็นน้ำเลี้ยง ของเหลวนี้เรียกว่าซีเมน (semen) สร้างโดยต่อมในระบบสืบพันธุ์ 3 คู่ คือเชมินัล เวสสิเคิล (seminal vesicle) ต่อมໂປຣສເດຖ (prostate) และต่อมคาวເປົວ (Cowper's gland) น้ำเลี้ยงเชื้อเพศนี้จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อเพศได้รับอันตรายจากฤทธิ์ความเป็นกรดในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสะสมอาหารประเภทน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุคโตสให้แก่เชื้อเพศ ทั้งยังเป็นตัวนำที่จะให้เชื้อเพศชายว่ายเข้าไปผสมกับเชื้อเพศหญิงได้สะดวกยิ่งขึ้น

เชื้อเพศชายจะออกจากร่างกายโดยทางท่อปัสสาวะ (urethra) ซึ่งฝังอยู่ในองคชาต (penis) การหลั่งเซลล์เพศเกิดขึ้นเมื่อจิตใจได้รับการกระตุ้นทางอารมณ์เพศจนถึงจุดสูงสุด ทำให้ระบบประสาಥ้อตโนมัติบังคับให้ท่อน้ำเชื้อเพศ ท่อปัสสาวะ และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง หดตัวไปฉีดเชื้อเพศออก เรียกกระบวนการนี้ว่า ejaculation

ภาพ 9-7 ภาพแสดงภาคตัดขวางของ


- (a) อันดับ
- (b) เชื้อเพศผู้



### 9.3.2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (The Female Reproductive System)

อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วยรังไข่ (Ovary) อよู่ 2 ข้างในช่องท้อง ทำหน้าที่ผลิตไข่ และขอร์โมนเพศหญิง pragtidicula รังไข่จะสร้างไข่ขึ้นมาเดือนละ 1 ใบโดยแต่

ละข้างทำหน้าที่สัลบกัน ในระหว่างช่วงระยะเวลาของการตกไข่ (ovulation) “ไข่จะหลุดออกจากรังไข่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อน้ำไข่ (oviduct หรือ Fallopian tube) เข้าไปสู่มดลูก (uterus) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายผล Chapman กว่า ไปรับการผสมกับเชื้อเพศชาย madluk นี้จะอยู่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของห้องท้อง ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ใหญ่ ประกอบด้วยผนังกล้ามเนื้อเรียบภายในมีเยื่อเมือกบุอยู่ มีเส้นเลือดฝอยมากหล่อเลี้ยงอยู่มาก many ปากมดลูกจะเป็นช่องแคบ (cervix) ติดต่อกับช่องคลอด (vagina) จากนั้นจะเป็นอวัยวะสีบพันธุ์ส่วนนอก ซึ่งรวมเรียกว่าวัวลัว (vulva) ประกอบไปด้วยกลีบเนื้อชั้นนอก (labia major) และกลีบเนื้อชั้นใน (labia minor) อยู่ติดกันและคลุมห้องคลอดอยู่ ที่จุดพบติดบนของกลีบเนื้อห้องชั้นนี้จะมีอวัยวะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับองคชาตในเพศชาย เรียกว่า คลิตอริส (clitoris) ถัดจากนั้นขึ้นไปจะเป็นห้องปัสสาวะ ซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายปัสสาวะโดยเฉพาะ



### วงจรการสีบพันธุ์ในเพศหญิง (The Female Reproductive Cycle)

ในสัตว์ตัวเมียโดยทั่วไป ความสามารถในการสีบพันธุ์ได้แสดงออกโดยการแสดงความต้องการทางเพศ ความต้องการนี้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาตกไข่ พฤติกรรมเช่นนี้ในสัตว์เรียกว่า “เป็นสัต” หรือ “ติดสัต” (estrus) สัตว์บางชนิด เช่น สัตว์ป่า จะมีพฤติกรรม

นี้เพียงปีละครั้ง (monestrus) บางชนิดมีปีละหลายครั้ง (polyestrus) สุนัข และแมว มีปีละ 2 ครั้ง แต่หนูมีในทุก 3-4 วัน


พฤติกรรมการเป็นสัดนี้เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่มีอยู่ในช่องคลอดและมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมดลูกจะหลังฮอร์โมนออกมากในปริมาณสูงสุดหลังจากการตกไข่แล้ว เล็กน้อย

ในมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงนั้น ความสามารถที่จะให้กำเนิดลูกแสดงโดยมีเลือดประจำเดือน (menstruation) ซึ่งมักมีมาในทุกรอบ 28 วัน และจะมีอยู่ประมาณ 4-5 วัน เลือดประจำเดือนเกิดจากการหลุดลอกของผนังด้านมดลูกทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นขาด ภายหลังจากการมีเลือดประจำเดือนแล้ว เนื้อเยื่อฟอลลิเคิลในรังไข่ซึ่งภายในมีเซลล์ไปอยู่ จะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมน follicle stimulating hormone (FSH) ที่สร้างโดยต่อมใต้สมอง ให้เจริญเติบโต ในขณะที่ฟอลลิเคิลเติบโตนั้นจะสร้างฮอร์โมนเอสตราดิโอล (estradiol) ไปกระตุ้นให้ผนังมดลูกเพิ่มความหนาและสะสมเลือดและอาหารไว้เตรียมรับไข่

ในซึ่งหลุดจากฟอลลิเคิลโดยการกระตุ้นของฮอร์โมนชื่อ luteinizing hormone (LH) จากต่อมใต้สมอง จะเคลื่อนออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ประจำวันที่ 14-15 ของรอบประจำเดือนแล้วมารอการผสมที่มดลูก ส่วนฟอลลิเคิลจะแปรสภาพไปเป็นกลุ่มนื้อเยื่อสีเหลืองอ่อนเรียกว่า คอร์ปัสลิวเตียม (corpus luteum) และสร้างฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอโรน (progesterone) ไปช่วยควบคุมการเตรียมตัวของผนังมดลูกให้รับการตั้งท้องและไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เจริญเติบโต


ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมจากเชื้อเพศชาย เยื่อคอร์ปัสลิวเตียม จะฝ่อลายไปประมาณวันที่ 27 ของรอบประจำเดือน ทำให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหมดไป ผนังมดลูกจะหลุดออกและทำให้เกิดเลือดประจำเดือน

ถ้าไข่ได้รับการผสม ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ เยื่อคอร์ปัสลิวเตียมจะยังคงอยู่และสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่อไปตลอดระยะเวลาการมีครรภ์ ฮอร์โมนนี้จะช่วยป้องกันการตกไข่ เพื่อมิให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้อน



ภาพ ๙-๙ ลำดับขั้นของการเจริญของไข่ภายในรังไข่

#### ภาพ 9-10 วงศ์รอบประจำเดือนในสตรี



### 9.3.3 การปฏิสนธิ (Fertilization)

ในการกเพศหญิงที่มีอายุได้ 4 - 5 เดือนจะมีเซลล์ไข่อยู่ในรังไข่นับเป็นจำนวนหมื่น เซลล์ แต่เซลล์ที่เจริญเติบโตต่อมาหนึ่งมีจำนวนประมาณ 400 - 500 เซลล์เท่านั้น การตกไข่จะเริ่มมีเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยรุ่น (puberty) และจะไปสิ้นสุดเมื่อวัยหมดประจำเดือน (menopause) ช่วงระยะเวลาจะนานประมาณ 30 ปี

ในการร่วมเพศครั้งหนึ่ง ๆ ฝ่ายชายจะปล่อยเชื้อเพศเข้าสู่ช่องคลอดนับเป็นล้าน ๆ ตัว (จะมีเชื้อเพศชายประมาณ 300,000,000 ตัวในน้ำเชื้อ 3 - 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร) เชื้อเพศชายหรือสเปอร์มเหล่านี้จะแหวกว่ายเคลื่อนที่เข้าไปสู่มดลูกโดยกำลังตัวเองและกำลังหดตัวและการดูดของมดลูก สเปอร์มบางตัวที่มีกำลังมากจะว่ายไปจนเข้าสู่ท่อนำไข่ แต่ปกติแล้วการผสมมักเกิดในบริเวณปีกมดลูก สเปอร์มจะมีอายุอยู่ในช่องคลอดหรือมดลูกได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไข่ที่รอรับการผสมจะมีเยื่อบาง ๆ หุ้มล้อมอยู่โดยรอบเยื่อบาง ๆ นี้เรียกว่าโคลโนราเรติอาตา (corona radiata) จะมีสารอินทรีย์ประเทกกรด ชื่อกรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) ประกอบอยู่ สารนี้จะถูกทำลายโดยเอ็นไซม์ ไฮยาลูโรนิดase ซึ่งมีอยู่ในสเปอร์มเพียงเล็กน้อย เมื่อสเปอร์มจำนวนมากไปรุ่มล้อมไข่อยู่จะทำให้เยื่อบางนั้นบางมากขึ้นอีกจนเกิดช่องทางให้สเปอร์มที่แข็งแรงที่สุดตัวหนึ่งว่ายทะลุทะลวงเข้าไปผสมกับไข่ได้ เมื่อผสมแล้วจะเกิดเยื่อบางเรียก fertilization membrane มาหุ้มไข่ที่ถูกผสมแล้วนั้นเพื่อป้องกันมิให้สเปอร์มตัวอื่นเข้ามาผสมซ้อนอีก สเปอร์มตัวอื่นที่เข้าผสมไม่ได้จะตายในเวลาต่อมากและถูกทำลายหรือกินโดยเม็ดโลหิตขาว ส่วนไข่ที่ถูกผสมแล้วจะกล่าวเป็นไข่โภต และเจริญเติบโตต่อไป

### การเกิดแฝด (Twinning)


มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดสามารถมีลูกได้ครั้งละหลายตัว แต่บางชนิดก็มีได้ครั้งละตัวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่สัตว์ประเภทนี้มีลูกได้ครั้งละเกินหนึ่งตัวซึ่งเรียกว่า ฝาแฝด (twinning) สำหรับในมนุษย์นั้นพบว่าประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของฝาแฝดเป็นแบบที่เรียกว่า fraternal twins ซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่ก็ได้ สักขณะหน้าตาและอุปนิสัยอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้ ฝาแฝดอีกชนิดหนึ่งเกิดจากไข่ที่ได้รับการ

ผสมในเดียว แต่มีการแบ่งตัวในระยะแรกออกจากกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่ละส่วนก็เจริญเติบโตต่อไป ฝาแฝดแบบนี้เรียกว่า identical twins จะต้องมีเพียง รูปปั้งสักชุดและนิสัยคล้ายคลึงกันมาก ในบางครั้งการแยกตัวของฝาแฝดแบบนี้เกิดไม่สมบูรณ์ ทำให้ร่างกายติดกันตลอด เรียกฝาแฝดแบบนี้ว่าฝาแฝดไทย (Siamese twins) ตัวอย่างเช่น ฝาแฝด อิน-จัน หรือฝาแฝด นิกิต-ปริศนา

#### 9.3.4 พัฒนาการของทารกในครรภ์ (Fetal Development)

หลังจากการปฏิสนธิได้ใช้โถตแล้วไซโโกรัตน์จะเจริญเป็นตัวอ่อนหรือ คัพภะ (embryo) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 ตัวอ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เริ่มเกิดสมองและไขสันหลัง เมื่ออายุได้ 1 เดือน จะมีขนาดยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 5 เริ่มเกิดระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และอวัยวะระยางค์ (appendage) เช่น แขน ขา ในสัปดาห์ที่ 8 เริ่มแยกเพศได้ชัดเจนขึ้น ขณะนี้ตัวอ่อนมีขนาดประมาณ 25 มิลลิเมตร และเกิด ตา หู จมูก ในปลายเดือนที่ 3 ทารกจะมีขนาดประมาณ 75 มิลลิเมตร เดือนที่ 5 มีขนาดยาว 250 มิลลิเมตร ระยะนี้จะมีรูปปั้งเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว ในเดือนที่ 9 จะมีขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร และเริ่มมีขามันสะสมใต้ผิวนังพร้อมกันนั้นเริ่มรับแรงด้านท่านซึ่งถ่ายทอดไปจากแม่

การจะอยู่ในครรภ์มาตราปีกาน 280 วัน ในระยะที่ทารกจะคลอด ผนังมดลูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเรียบจะเริ่มหดตัว ถุงน้ำคร่ำซึ่งหุ้มล้อมรอบทารกเพื่อกันการกระเทือนนั้นจะแตกออกหากถูกบังคับให้เคลื่อนลงมาก็ช่องคลอด โดยจะคร่ำหน้าลง เมื่อทารกคลอดออกมานั้นสักครู่ก็จะยื่นหัวและยื่นหัวจะถูกบีบตามออกมานั่น เมื่อถึงระยะนี้ระบบต่างๆ ในร่างกายของเด็กจะเริ่มทำงานเอง



ภาพ ๙-๑๑ แสดงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์