

wader	เวเดอร์ นกชายน้ำ เป็นกลุ่มนกหลายขนาดหลายวงศ์โดยทั่วไปชายาวจะงอยปากใหญ่ เหมาะสำหรับเดินหากินตามชายน้ำ อาจกินแมลง ปลา หรือไซร้หาอาหารจากโคลนตม เช่น นกกระสา นกแซก นกชายเลน
waggle dance	ววกเกิล แคนรี่ การบินร่อนไปมาก่อนกลับเข้ารังของผึ้งงานที่ไปหาน้ำหวาน เพื่อสื่อให้ผึ้งงานตัวอื่นทราบทิศทางและระยะทางของอาหาร อีกชื่อหนึ่งคือ wagging dance
wagtail	ววกเทล นกในวงศ์ Motacillidae วงศ์เดียวกับกับนกเด้าดิน นกเด้าลม เนื่องจากท่วงท่าเดินหรือกำลังหากิน จะกระดกหางขึ้นลงและส่ายไปมา เช่น นกอุ้มบาตร (white wagtail - <i>Motacella alba</i> ) นกเด้าลมหลังเทา (grey wagtail - <i>Motacella cinerea</i> )
walkingstick	วอล์คิงสติก ต๊กแตนกิ่งไม้ รูปร่างยาว ชายาว ไม่มีปีก ลักษณะคล้ายกิ่งไม้ อยู่ในวงศ์ Phasmidae
wall	วอล (AS. weall) ชั้นผิว หรือชั้นที่มีหลายแผ่นอัดกันแน่น ทำหน้าที่หุ้มเซลล์ อวัยวะ หรือลำตัวของสิ่งมีชีวิต
wallaby	วัลลาบี สัตว์มีถุงหน้าท้องพวกแก๊งการูขนาดเล็กวงศ์ Macropodidae เช่น rock wallaby ( <i>Petrogale</i> )
wallaroo	วัลลารู แก๊งการูขนาดกลาง อยู่ระหว่างขนาดของวัลลาบีและแก๊งการู
walleye	วัลลีย์ 1. walleyed perch หรือ pike perch ( <i>Stizostedion vitreum</i> ) ปลาน้ำจืดที่ตกเพื่อการกีฬาและเป็นอาหาร มีราคา 2. ดวงต้าม่านตามีสีจางหรือสีขาว 3. cornea ของลูกตาขาวขุ่นหรือ leukoma (ต้อกระจกตา) 4. สายตาเอียง คือ แนวแกนของการมองเห็นเบนไปจากแนวปกติ - ตาเอียงถ่าง
walrus	วอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ สกุล <i>Odobenus</i> ลักษณะเด่นคือ หน้าจุกปากสั้น มีหนวดแบบหนวดเสือ ฟันแทะจากซากกระดูกบนสองซี่ยาวลงมาข้างล่างคล้ายงาช้าง ใช้ประโยชน์ในการแกะเปลือกหอยกินเนื้อเป็นอาหาร ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หากินในทะเลและชายฝั่ง อยู่เป็นฝูงทางแถบน้ำขั้วโลกเหนือ
waltzer	วอลท์เซอร์ หนูสายพันธุ์พิเศษที่เดินคล้ายเสฟของมินเมา เป็นผลมาจากได้รับยีนด้อย ทำให้การทรงตัวผิดปกติ
wandering	วอนเดอริง (AS wandrian) เคลื่อนที่ไปโดยปราศจากจุดหมาย

- wandering abscess ฝี หรือโพรงหนองที่อยู่ลึก แล้วเลื่อนตัวขึ้นมาอยู่ที่ผิว ห่างจากจุดกำเนิดเดิม
- wandering cell เซลล์ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ หรือร่างกาย คือ เซลล์ macrophage บางชนิด
- wapiti วาพิติ กวางเอลค์อเมริกา (*Cervus canadensis*)
- warble วอร์เบิล 1. อาการบวมบนหลังของสัตว์เลี้ยง (ปศุสัตว์ ม้า) ซึ่งภายในมีตัวอ่อนของแมลง warble อาศัยอยู่ 2. ตัวอ่อนของ warble fly
- warble fly วอร์เบิล ฟลาย แมลงในวงศ์ Oestridae ตัวอ่อนเจริญอยู่ใต้หนังของสัตว์หลายชนิด ทำให้เกิดปุ่มบวม - warble เช่น ox warble (*Hypoderma bovis*)
- warbler วอร์เบเลอร์ 1. นกที่ส่งเสียงร้อง สั้นแหลม 2. นกร้องเพลงโลก เก่าวงศ์ Sylvididae เช่น นกกระจอกคอขาว (yellow-bellied warbler - *Abroscopus superciliosus*), นกกระจัดธรรมดา (inornate warbler - *Phylloscopus inornatus*), นกพงใหญ่ญี่ปุ่น (oriental great reed-warbler - *Acrocephalus orientalis*) 3. นกขนาดเล็ก สีสวยสด กินแมลง อยู่ในวงศ์ Parulidae ไม่พบในไทย
- warm-blooded วอร์ม-บลัดเดด ร่างกายมีอุณหภูมิพอดีและคงที่ เช่น ของพวกสัตว์เลือดอุ่นที่อุณหภูมิของร่างกาย ประมาณ 37-39 องศาเซลเซียส  
syn: homiothermous
- warmouth วอร์เม้าท์ ปลา sunfish (*Chaenobryttus coronarius*) อีกชื่อหนึ่งคือ warmouth bass
- warning coloration วอร์นิง คัลเลอร์เซชัน รอย หรือสีเด่นที่มีอยู่บนตัวของสัตว์ เพื่อเป็นเครื่องบ่งบอก อันตราย มีพิษ หรือเป็นกลไกข่มขู่ป้องกันศัตรู  
syn: aposematic coloration
- wart วาร์ท (AS. wearte) 1. ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ หูด ผิวหนังเป็นตุ่มแข็งคล้ายเขาสัตว์ 2. ในสัตว์พวกปลิงทะเล คือ tube feet ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มแข็ง 3. ในคางคก คือ มวลแน่นของต่อมพิษ  
fig wart หูดที่บริเวณโคนปลายองคชาติ ลักษณะเป็นกระจุกเส้นขาวและมักถูกคลุมด้วยขี้เปือก syn: condyloma acuminatum, venereal wart, verruca acuminata

	venereal wart	หูดที่ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่าง หนังกับชั้นใต้หนังใกล้ทางเปิดของท่อปัสสาวะ ทำให้ขี้ขี้ถ่ายปัสสาวะไม่ สะดวก
warthog	วาร์ทฮอก	หมูป่าแอฟริกา ( <i>Phacochoerus aethiopicus</i> ) ขนาด ใหญ่ ลักษณะประหลาดกว่าหมูป่าอื่น ที่สองข้างของหัว มีปุ่มยื่นออกมา คล้ายหูด อีกชื่อหนึ่ง คือ vlakvark
wasp	แวมพ์	แวมพ์ (AS. waesp) แมลงปีกบาง (อันดับ Hymenoptera) ที่รวมอยู่ ในอนุอันดับ Apocrita ยกเว้นวงศ์ Formicidae (พวกมด) ลักษณะ ทั่วไป รูปร่างผอม ส่วนท้องต่อกับส่วนอกด้วยปล้องที่เป็นก้านเล็กๆ เพศ เมียส่วนใหญ่มีโครงสร้างสำหรับต่อย (sting) ลักษณะต้นแบบ คือ พวก ต่อกระดาษ (paper wasp) เช่น yellow jacket, hornet ซึ่งอยู่ ในวงศ์ Vespidae ต่อที่อยู่เดี่ยวไม่ทำรังร่วมกับตัวอื่น อยู่ในวงศ์ Sphecidae
waste	เวสต์	(L. vastus - ว่างเปล่า) 1. การถดถอยของร่างกายและเป็น ผลเนื่องมาจากการเป็นโรค syn: cachexia 2. ผอมแห้ง เป็น ผลมาจากการเสียเนื้อเยื่อ 3. สิ่งปฏิกล ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่ใช้แล้วและขับ ออก เช่น อาหารส่วนที่ไม่ได้ย่อย ผลผลิตจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้ สารคัดหลั่งจากต่อม และสารที่เป็นส่วนเกินของ ร่างกาย
water	วอเตอร์	(AS. waeter) 1. H <sub>2</sub> O น้ำ เป็นของเหลวใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น 2. น้ำที่อยู่ในสภาวะของสารละลายและสามารถระเหยออกไป ได้ 3. น้ำที่เป็นส่วนประกอบของโปรโทพลาซึม ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต มีความสำคัญต่อกลไก การดำรงชีวิตมาก เช่น เป็นตัวละลาย ตัวกลางของไอออน คงไว้ซึ่ง ระบบทำความร้อนของร่างกาย มีความเสถียรทางเคมีและความตึงผิว ช่วยให้ระบบสรีรของสิ่งมีชีวิตดำเนินไปด้วยดี และยังมีบทบาทสำคัญใน กระบวนการย่อยสลายด้วยน้ำของกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ของ ร่างกายด้วย
	water balance	ความสมดุลของน้ำ หมายถึง การดูดน้ำเข้า เท่ากับการนำน้ำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

- water bound น้ำที่มีพันธะกับสารอินทรีย์ในโพททอลาซิม ไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม
- deionized water น้ำกลั่นชนิดที่ให้น้ำไหลผ่านเครื่องมือที่มีสารสำหรับดักจับประจุบวกและลบ ที่เป็นต้นเหตุของการปนเปื้อน
- distilled water น้ำกลั่นชนิดที่ทำให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่นจริง ใช้ประโยชน์ทางยา syn: aqua destillata, aqua des
- water for injection น้ำกลั่นที่กลั่นจริงแล้วทำให้ปราศจากเชื้อด้วยกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วเล็ก ๆ ผนึกป้องกันการปนเปื้อนจากจุลชีพ เหมาะสำหรับการผสมยาฉีด ใช้เพียงครั้งเดียว
- water itch อาการคันเมื่อลงน้ำ เกิดจากการที่ผิวหนังถูกเจาะไชด้วยตัวอ่อนระยะ metacercaria ของปรสิต *Schistosoma* ของปลาคาร์พ syn: schistosome dermatitis
- water bear วอลเทอร์ แบร์ ดู tardigrade
- water beetle วอลเทอร์ บีเทิล แมลงปีกแข็ง ซึ่งหากินอยู่ในน้ำ หรือมีตัวอ่อนอาศัยหากินอยู่ในน้ำ
- water buck วอลเทอร์ บัค สัตว์คล้ายกวางขนาดใหญ่ (*Kobus ellipsiprymnus*) เป็นสัตว์ประจำถิ่นของแอฟริกาใต้
- water buffalo วอลเทอร์ บัฟฟาโล ควายอินเดีย (*Bubalus bubalis*) เป็นควายที่นำมาเลี้ยงใช้งานและเป็นอาหาร ถือเป็นสัตว์เลี้ยงหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่ออื่น คือ arna, carabao
- waterbug วอลเทอร์ บั๊ก ดู croton bug, cockroach
- water bug วอลเทอร์ บั๊ก แมลงปีกครึ่งอ่อนครึ่งแข็ง (hemipteran) ซึ่งหากินอยู่ในน้ำ เช่น แมลงดานา (*Bonacus griseus*)
- water cells วอลเทอร์ เซลล์ส ถุง diverticula คล้ายถุงของกระเพาะอาหารส่วน rumen และ reticulum ของอูฐ
- watercock วอลเทอร์ คอค นกชายน้ำขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ Rallidae ปีกสั้น ขาค่อนข้างยาว เช่น นกอิลัม (*Gallicrex cinerea*)
- water dog วอลเทอร์ ด็อก salamander ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น (1) newt แถบชายฝั่งแปซิฟิก (*Taricha torosa*) (2) hellbender (*Cryptobranchus*) (3) mud puppy (*Necturus*)

- water flea วอเทอร์ ฟลี สัตว์พวกกุ้งขนาดเล็ก อยู่ในอันดับ Cladocera เช่น *Daphnia*, *Alona*, *Leptodora*
- water fowl วอเทอร์ ฟาวล์ 1. นกที่หากินตามแหล่งน้ำโดยเฉพาะนกที่ว่ายน้ำได้ เช่น นกน้ำ 2. นกน้ำที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา เช่น เป็ด ห่าน ต่างจาก นกที่หากินชายฝั่ง หรือนกบนที่ราบและเนิน
- water hen วอเทอร์ เฮน นกชายน้ำ ในวงศ์ Rallidae เช่น Florida gallinule (*Gallinula chloropus*) ในยุโรปเรียก moorhen ในไทย เช่น นกกวัก (white-breasted waterhen - *Amaurornis phaeniculus*)
- water mite วอเทอร์ ไมท์ ไรวงศ์ Hydrachnidae ตัวโตเต็มวัยสีแดงและเป็นผู้ล่าเหยื่อ ตัวอ่อนเป็นปรสิตอยู่บนแมลงและหอยสองฝา เช่น สกุล *Hydrachna*
- water moccasin วอเทอร์ มอคคาสิน ดู moccasin
- water ring วอเทอร์ ริง ก้อนน้ำรูปวงกลม ในสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนของน้ำ เช่น พวก echinoderm
- water scorpion วอเทอร์ สคอร์ดเปียน แมลงปีกครึ่งอ่อนครึ่งแข็งพวกแมลงคานา อยู่ในวงศ์ Nepidae เช่น สกุล *Nepa* และ *Ranatra* เป็นแมลงล่าเหยื่อที่ขาหน้าดัดแปลงสำหรับจับเหยื่อ ขาหลังมี cerci ดัดแปลงเป็นโครงสร้างทรงท่อสำหรับอากาศหายใจ
- water snake วอเทอร์ สเนค งูไม่มีพิษและไม่มีอันตราย สกุล *Natrix*
- water strider วอเทอร์ สไตรเดอร์ แมลงปีกครึ่งอ่อนครึ่งแข็ง วงศ์ Gerridae และวงศ์ Vellidae เช่น สกุล *Gerris* และ *Rhagovelia* (จิ้งจิกน้ำ) ขาพอมยาวมาก ใช้โกลไปบนผิวน้ำได้อย่างรวดเร็ว
- water tiger วอเทอร์ ไทเกอร์ ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งที่ดำน้ำได้มากชนิด ดำรงชีพแบบผู้ล่า เช่น *Dytiscus*
- water tube วอเทอร์ ทิวบ์ ท่อเป็นจำนวนมากอยู่ในเหงือกของหอยสองฝา เปิดออกสู่ห้องเหนือเหงือก
- water turkey วอเทอร์ เทอร์คีย์ คือ darter หรือ snakebird (*Anhinga anhinga*) คอยาวคล้ายงู อยู่ในวงศ์ Anhingidae วงศ์เดียวกับ นกอายงั่ว (*Anhinga melanogaster*)

- water-vascular system** วอเทอร์ วาสคิวลาร์ ซิสเทม มีในสัตว์พวก echinoderm เป็นระบบคลองส่งน้ำและโครงสร้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่และนำอาหาร ในปลาดาว ประกอบด้วย madreporite, stone canal, ring canal (water ring) และ radial canal ซึ่งมี lateral canal ไปต่อกับ tube feet ปลายด้านในสุด คือ ampullae
- water witch** วอเทอร์ วิทซ์ คือ นก horn grebe หรือ pied-billed grebe เป็นพวกนกน้ำพวกเดียวกันกับนกเป็ดผี
- wattle** นวทเทิล 1. เหนียง เนื้อที่ห้อยลงมาจากส่วนใต้ จะงอยปากและคอกนก มีลักษณะเป็นคู่ พบได้ในพวกไก่เลี้ยง และนกในอันดับเดียวกันกับพวกนกยูง ไก่ฟ้า นกกระทา (Galliformes) 2. ในสัตว์เลื้อยคลาน เนื้อที่ห้อยลงมาจากกลางใต้คางและคอ มีเพียงอันเดียว
- wattle bird** นวทเทิล เบิร์ด นกกินน้ำผึ้งแห่งนิวซีแลนด์ หรือ huia (*Neomorpha acutirostris*) เหนียงที่ห้อยลงมาขนาดใหญ่ สีส้มและสีน้ำเงิน
- wave** เวฟ (ME. wave) 1. คลื่นที่ทำให้เกิดในตัวกลาง เช่น อากาศ หรือน้ำและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วตามคุณสมบัติของตัวกลาง เช่น คลื่นเสียง 2. สันคลื่นของน้ำ 3. การสั่นสะเทือนที่ตรวจสอบได้ด้วย การบันทึกของ stylus
- wax** นวทซ์ (AS. weax) ไช เป็นสารประกอบเอสเทอร์ของกรดไขมันและแอลกอฮอล์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเพียงหมู่เดียว และทั้งคู่ต้องมีโมเลกุลใหญ่ มีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ไม่ละลายน้ำ จึงมีประโยชน์ต่อเซลล์พืชและสัตว์ในด้านป้องกันการระเหยของน้ำ และยังใช้ประโยชน์อื่นทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เช่น ทำเทียนไข ทำยาขี้ผึ้ง ยาทาผิว ตัวกลางสำหรับการฝังเนื้อเยื่อในวิชาไมโครเทคนิค คุณสมบัติทางฟิสิกส์ต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับที่มาของไข อาจได้จากพืช เช่น carnauba wax, myrtle wax ได้จากสัตว์ เช่น bee wax, sperm whale oil, lanolin, ear wax หรือได้จากแหล่งปิโตรเลียม เช่น paraffin, ceresin
- wax bill** นวทซ์ บิล นก weaver finch โลกเก่าโดยเฉพาะสกุล *Estrilda* คล้ายนกจาบ ไม่พบในไทย

wax gland	แวกซ์ แกลนด์ ต่อมขี้ผึ้ง ทำหน้าที่ผลิตขี้ผึ้ง เช่น ในแมลงพวกผึ้ง และ ไก่เลียง
wax insect	แวกซ์ อินเซกต์ แมลงในอันดับ Homoptera หลายชนิดซึ่งผลิตขี้ผึ้งได้ และนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดู wax scale
wax moth	แวกซ์ มอท <i>Galleria mellonella</i> เป็นผีเสื้อกลางคืนที่ตัวอ่อน (wax worm) อาศัยอยู่ในรังผึ้งและกินขี้ผึ้งเป็นอาหาร อีกชื่อหนึ่ง คือ bee moth
wax myrtle	แวกซ์ เมอร์เทิล ขี้ผึ้งที่ได้มาจากพืช <i>Myrica cerifera</i> หรือ bay-berry ( <i>M. carolinensis</i> ) เป็นพวกไม้พุ่มใบเขียวเข้มเป็นมัน สารที่สกัดได้นำมาทำน้ำหอมและเทียนไข
wax scale	แวกซ์ สเกล แมลงในอันดับ Homoptera ชนิดหนึ่ง อยู่ในกลุ่มของ wax insect ผลิตขี้ผึ้งและสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น แมลงแวกซ์สเกลจีน ( <i>Ericerus pe-la</i> )
wax wing	แวกซ์ วิง นกพวกนกกระจอก วงศ์ Bombycillidae เช่น cedar waxwing ( <i>Bombycilla cedrorum</i> ) ไม้พบในไทย
wax worm	แวกซ์ เวิร์ม ตัวอ่อนของแมลง wax moth
weakfish	วีค ฟิช ปลาทะเลที่ใช้เป็นอาหาร สกุล <i>Cynoscion</i> เช่น <i>C. regalis</i> แถบฝั่งตะวันออกและอ่าวเม็กซิโก
wean	วีน (AS. wean) หย่านม คือ งดให้ทารกดูดนมจากแม่แล้วกินอาหารอื่นแทน
weasel	วีเซล สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนอ่อนนุ่ม ใช้ทำเสื้อขนสัตว์ได้ อยู่ในสกุล <i>Mustela</i> ดู ermine
weaverbird	วีเวอร์เบิร์ด นกขนาดเล็กคล้ายนก finch ในเอเชีย และแอฟริกา อยู่ในวงศ์ Ploceidae มีความสามารถนำหญ้า และวัสดุอื่นมาทำรังได้อย่างประณีต บางชนิดเป็นปรสิตร ในไทยพบ 3 ชนิดในสกุลเดียวกัน เช่น กระจาบอกลาย (streaked weaver - <i>Ploceus manyar</i> )
weaver finch	วีเวอร์ ฟินช์ นกขนาดเล็กในกลุ่มนกกระจอกโลกเก่า อยู่ในวงศ์ Passeridae เช่น นกกระจอกใหญ่ ( <i>Passer domesticus</i> )
web	เวบ โครงสร้างบางคล้ายเชื้อ เช่น 1. แผ่นบางที่ยึดนิ้วของสัตว์น้ำ 2. ใยแมงมุม 3. ใยแมงมุมที่ชักใยเป็นแผง 4. ส่วนที่แผ่ออกไปจากแกนขนนกที่มีลักษณะคล้ายส่วนเนื้อใบไม้ ดู patagium

Weberian ossicles	เวเบอร์เวียน ออสซิเคิล กลุ่มกระดูกชั้นเล็ก ๆ 4 ชั้น คือ scaphium, claustrum, intercalarium และ tripus อยู่ระหว่างกระดูกสำหรับลอยตัว และช่อง perilymphatic ของหู พบในพวกปลากระดูกแข็งบางชนิด
webfoot	เวบฟุต นิ้วเท้าถูกเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นบางของหนัง เช่น ดินนงน้ำพวกเบ็ด ห่าน
web spinner	เวบ สปินเนอร์ แมลงในอันดับ Embioptera ซึ่งสร้างและอาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่เป็นใยไหม เช่น <i>Anisembia texana</i> อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐ
weep	วีป (AS. wepan-คร่ำครวญ) 1. สรีระ: หลังน้ำตา 2. พฤษภ: น้ำเยิ้มออกมา
weever	วีเวอร์ ปลาทะเลสกุล <i>Trachinus</i> ครีบหลังมีเงี่ยงพิษ แต่เนื้อใช้เป็นอาหารได้
weevil	วีวิล 1. แมลงปีกแข็งที่ส่วนหัวมีโครงสร้างยื่นคล้ายจุก เช่น แมลงเจาะสมอฝ้าย (cotton boll weevil) 2. แมลงปีกแข็งหลายชนิดที่ตัวอ่อนเจาะกิน ผัก และเมล็ดพืช เช่น bean weevil, pea weevil ดู snout beetle, curculio
wether	เวเทอร์ แพะเพศผู้ที่ถูกตอน
whale	เวล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำอันดับ Cetacea ถือเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งเป็นสองอันดับคือ Mysticeti พวกปลาวาฬที่มี whalebone และ Odontoceti พวกปลาวาฬที่มีฟัน
whalebone	เวลโบน ดู baleen
whale louse	เวล เลาส์ <i>Cyamus ceti</i> สัตว์พวกกุ้งในกลุ่มของพวก amphipod ที่มีการปรับตัวเกาะพวกปลาวาฬ เป็นปรสิตภายนอก
whale shark	เวล ชาร์ค <i>Rhyncodon typus</i> ปลาฉลามขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายปลาวาฬ อาศัยอยู่ในน้ำตื้นเขตร้อนชื้น อาจมีความยาวถึง 50 ฟุต
wheal	วีล (AS. hwele) เม็ดลมพิษบนผิวหนัง เป็นตุ่มสีแดง จุดกลางขาว
wheat ear	วีเทียร์ <i>Oenanthe oenanthe</i> พวกนกเดินดงขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารของซีกโลกเหนือ ไม่พบในไทย
wheat worm	วิกเวิร์ม <i>Anguina tritic</i> หนอนเนมาโทดศัตรูพืชพวกข้าวสาลี
wheel animacule	วีล แอนิมาคูล คือ rotifer



wheel bug	วีล บัก คือ assassin bug ( <i>Arius cristatus</i> ) เป็นแมลงปีก ครึ่งอ่อนครึ่งแข็งที่ส่วนหัวมีหงอนคล้ายกงล้อ กัดเจ็บ
wheeze	วีซ (ME. whesen) เสียงหายใจติดขัด เนื่องจากมีการตีบของหลอด ลม ตรวจพบได้โดยใช้เครื่องหูฟัง พบในผู้ที่มีอาการหอบหืด และอา- การข้างเคียงอื่น อาจเนื่องมาจากเนื้องอก วัณโรค หรือมีสิ่งแปลก ปลอมพลัดหลงเข้าไปในหลอดลม
whelk	เวลค์ (AS. hwylca) 1. เม็ดลมพิษ โดยเฉพาะบริเวณหน้า syn.: wheal 2. หอยฝาเดี่ยวทะเลขนาดใหญ่ อยู่ในอันดับ Prosobran- chiata เช่น หอยสังข์ยักษ์ ( <i>Busycon</i> ), หอยสังข์สกุล <i>Buccinum</i> เนื้อใช้เป็นอาหารได้
whelp	เวลป์ 1. ลูกสัตว์กินเนื้อที่วัยยังไม่ถึงขั้นเจริญพันธุ์ เช่น สุนัข สุนัขป่า 2. การคลอดลูกของสัตว์กินเนื้อ
wey	เวย์ (AS. hwaeg) น้านมใส คือ ส่วนที่เหลือจากการจับก้อนของนม แยกเอาไขมันและโปรตีนส่วนใหญ่ออกไป
whiff	วิฟฟ์ 1. ลมหายใจออกสั้น ๆ โดยเฉพาะที่มีกลิ่นเหม็น 2. การสูด ลมเข้าออกอย่างรวดเร็ว เช่น กรณีของการสูบบุหรี่
whimbrel	วิมเบรล นกชายน้ำขนาดเล็ก วงศ์ Scolopacidae อนุวงศ์ Trin- ginae เช่น นกอีโก้ยัดสั้นหรือนกอีโก้ยเล็ก (Hudsonian curlew - <i>Numenius phaeopus</i> ) นกอีโก้ยใหญ่ (Eurasian curlew - <i>Numenius arquata</i> )
whip coral	วิป คอรัล คู sea whip
whiplash flagellum	วิปแลช แพลเจลลัม แพลเจลลัมผิวเรียบที่ไม่มี mastigo- neme คู mastigoneme
whippoorwill	วิปพัววิลล์ <i>Caprimulgus vociferus</i> นกบินหากินกลางคืน อยู่ใน วงศ์นก goatsucker คือวงศ์ Caprimulgidae
whip scorpion	วิป สคอร์พิออน สัตว์พวกแมงมุมอยู่ในอันดับ Uropygi คู vine- garoon
whip snake	วิป สเนค งูบก ลำตัวพอมยาว โดยเฉพาะหางยาวมาก อยู่ในสกุล <i>Masticophis</i> เช่น coach whip ( <i>M. flagellum</i> )
whiptail	วิปเทล สัตว์พวกกิ้งก่า สกุล <i>Cnemidophorus</i> ส่วนหางพอมยาวกว่า ส่วนหางของสกุลอื่น

- whip worm วิปเวียร์ม *Trichuris trichiura* พยาธิเข็มหมุด เป็นเนมาโทดปรสิต อยู่ในลำไส้คนและสัตว์ใกล้เคียง พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- whirligig beetle เวิร์ลิกิก บีเทิล แมลงปีกแข็ง ซึ่งขณะว่ายน้ำจะมีลักษณะคล้ายใบพัดหมุนตัว อยู่ในวงศ์ Gyrrinidae เช่น *Dineutes americanus*
- whisker วิสเคอร์ 1. จอน คือ ผมตั้งแต่บริเวณขมับลงมาถึงคาง 2. หนวดสัตว์ ขนยาวบริเวณเหนือริมฝีปากบนและริมฝีปากล่าง มักใช้กับสัตว์กินเนื้อ เช่น แมว น้ำ นาก สุนัข แมว เสือ
- whistler วิสทเลอร์ 1. เป็ด goldeneye (*Bucephala clangula*) เป็นพวกที่ดำน้ำ ตั้งชื่อตามเสียงที่เกิดจากการกระพือปีกคล้ายเสียงนกหวีด ในไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ นกชายเลนหัวโต หรือนกโกกงกางหัวโต (mangrove whistler - *Fachycephalus grisola*) อยู่ในวงศ์ Pachycephalidae 2. hoary marmot (*Marmota caligata*) สัตว์ฟันแทะคล้ายกระรอก ขนสีเทา หุดรูอยู่ในดินแถบตะวันตกของอเมริกาเหนือ
- whistling duck วิสทลิง ดัค เป็นในอนุวงศ์ Dendrocygninae ทำรังและหากินชายน้ำเช่น เป็ดแดง (lesser whistling duck - *Dendrocygna javanica*)
- white ant ไวก์แอนท์ ปลวก ดู termite
- white blood cell ไวก์บลัด เซลล์ เซลล์เม็ดเลือดขาว syn: white blood corpuscle
- white-eye ไวก์-อาย นกวงศ์ Zosteropidae ขนาดเล็กมาก ชอบตามีสีขาว ทั้งสองเพศมีสีและลักษณะเหมือนกัน กินแมลง อยู่ในพุ่มไม้ เช่น นกแว่นตาขาวสีทอง (oriental white-eye - *Zosterops palpebrosus*)
- white fish ไวก์ ฟิช ปลาขาว อยู่ในวงศ์ Coregonidae โดยเฉพาะสกุล *Prosopium* และ *Coregonus* เช่น ปลาขาวทะเลสาบ (*C. clupeiformis*) เป็นปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
- whitefly ไวก์ฟลาย แมลง homopteran วงศ์ Aleyrodidae เป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวปกคลุมด้วยผงสีขาว เช่น สกุล *Aleurocanthus* ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะพวกส้ม
- white matter ไวก์ มัทเทอร์ กายวิภาค: เนื้อเยื่อประสาทของสมองและไขสันหลัง ประกอบด้วย แอกลอนที่มีปลอกหุ้มเป็นส่วนใหญ่

- whiting** วิทิง 1. ปลาทะเลในแถบยุโรปชนิดหนึ่ง (*Merlangus merlangus*)  
2. ปลา hake แถบนิวอิงแลนด์ของอเมริกา (*Merluccius bilinearis*) ดู hake 3. ปลาทะเลที่ใช้เป็นอาหาร สกุล *Menticirrhus* อยู่ในน้ำน้าแถบแอตแลนติกเหนือ
- whooping cough** วูพิง คัฟ ไอกรน เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันชนิดหนึ่ง syn: pertussis
- whooping crane** วูพิง เครน นกชายน้ำประจำถิ่นของอเมริกาเหนือ (*Grus americana*) เสียงร้องคล้ายเสียงไอกรน ถือเป็นนกกระเรียนที่เกือบจะสูญพันธุ์ ดู crane
- whorl** เวิร์ล (ME. whorle) 1. กายวิภาค: (1) ลายกันหอยบนนิ้วมือ (2) ขวัญ คือ จุดศูนย์กลางบริเวณที่เส้นผมหมุนวนเป็นเกลียว syn: vortex 2. สัตว: วงเปลือกหอยแต่ละวงที่หมุนเป็นเกลียวของพวกหอยฝาเดียว 3. พฤษ: วง หรือชั้นของโครงสร้าง ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปที่อยู่รวมกัน เช่น วงของใบประกอบกลับเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย
- widgeon** วิดเจียน เป็ดไม้ค้ำน้ำ อยู่ในสกุล *Mareca* (*Anas*) ของอนุวงศ์ Anatinae อยู่ในอเมริกาเหนือ ดู baldpate
- wiggler** วิกเกลอร์ สัตว์ที่เคลื่อนที่ด้วยลักษณะกระตุก เช่น ตัวอ่อนระยะลูกน้ำ หรือระยะอ้ายโม่งของยุง หรือตัวอ่อนที่เรียกว่า nymph ของแมลงชีปะขาว
- wild** ไวลด์ ตามธรรมชาติ ไม่อยู่ในสภาวะเลี้ยงดูโดยมนุษย์ ป่าเถื่อน
- wildcat** ไวลด์แคท 1. แมวป่าอเมริกาเหนือ (*Lynx rufus*) หรือ bob cat, bay lynx 2. แมวป่ายุโรป (*Felis sylvestris*)
- wildebeest** วิลเดบีสท์ ดู gnu
- wildlife** ไวลด์ไลฟ์ สัตว์ป่า คือ สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมนุษย์ ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ำ ตลอดจนจุนไซ้และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย
- wildtype** ไวลด์ไทป์ พันธุ์ป่า สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวที่มีลักษณะเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ไม่มีการนำมาคัดเลือกพันธุ์ หรือเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการ

willet	วิลเลท <i>Catoptrophorus semipalmatus</i> นกชายฝั่งอเมริกาเหนือ เป็นนกขนาดใหญ่ ไม่พบในไทย
wilt	วิลท์ 1. เชื้ออิมมูโนแอ็บสซีส ไม่กระปรี่กระเปร่า 2. โรคใบเหี่ยวของพืช
wind dispersal	วินด์ ดิสเพอร์ซัล การแพร่กระจายโดยลม เป็นกลไกตามธรรมชาติในการช่วยให้สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชสามารถผสมพันธุ์และแพร่กระจายพันธุ์ไกลออกไปจากถิ่นที่อยู่เดิม โดยใช้ลมเป็นปัจจัยเสริม เช่น สปอร์ ละอองเรณู เมล็ด หรือผล ถูกลมพัดพาไป เพื่อผสมพันธุ์กับต้นอื่น หรือ ไปงอกเป็นต้นใหม่ทีอื่น
windpipe	วินด์ไพป์ หลอดลม syn: trachea
wing	วิง (Old Norse. vaeng) 1. สัตว์: โครงสร้างเพื่อใช้สำหรับบิน เช่น (1) ปีกแมลง นก ค้างคาว (2) โครงสร้างคล้ายปีก เช่น ครีบแขนของปลาที่บินขึ้นมาเหนือน้ำ หรือ เชื้อฟังไจระหว่างขาคู่หน้าและข้างลำตัวที่แผ่เพื่อการร่อนกลางอากาศของกระรอกบิน หรือ ค้างบิน 2. กายวิภาค: โครงสร้างคล้ายปีกของอวัยวะ เช่น ala 3. พฤษศาสตร์ที่เป็นแผ่นยาวแผ่ออกไปจากลำต้น ผล หรือ เมล็ด เช่น ผลขาง
wing cover	วิง คัฟเวอร์ ดู elytron
wing covert	วิง คอเวอร์ท ขนอ่อนสั้น ๆ ที่ไม่ใช่สำหรับการบินอยู่ที่บริเวณปีกและหางของนก syn: tectrix
wingless	วิงเลส 1. ไม่มีปีก หรือโครงสร้างคล้ายปีก 2. มีปีกที่เป็นอวัยวะหลงเหลือหรืออวัยวะตกค้าง เช่น ปีกคู่หลังของพวกแมลงสองปีก
wing pad	วิง แพด ปีกกุดของตัวอ่อนแมลงระยะ nymph หรือ pupa
wing shell	วิง เชลล์ 1. หอยสองฝา ( <i>Pholas campechiensis</i> ) ที่เจาะรูเข้าไปในซีปัสเตรทเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย 2. หอยสองฝาสกุล <i>Pteria</i>
winkle	วิงเคิล 1. ดู periwinkle 2. หอยฝาเดี่ยวทะเลที่มีลักษณะคล้ายหอยทาก โดยเฉพาะสกุล <i>Busycon</i>
winter egg	วินเทอร์ อีจ 1. ไข่ที่ผลิตเพื่อรับการปฏิสนธิในช่วงปลายฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วง แต่มีการเจริญแบบ parthenogenesis เช่น ในสัตว์พวกโรติเฟอร์ เพลี้ย 2. เปลือกไข่ที่หนาและภายในมีไข่แดงมาก พบในหนอนตัวแบนบางชนิด

- winter kill วินเทอร์ คิลล์ สิ่งมีชีวิตที่ตายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เช่น พวกปลา มักเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำตื้นที่มีสารอินทรีย์มากและพื้นผิวน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง เป็นเวลานาน
- wireworm ไวร์เวิร์ม 1. ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งพวก click beetle ลำตัวพอมยาว แห้งและเป็นมันวาว กินรากพืชพวก ข้าวโพด ข้าวสาลี ฝ้าย และพืชอื่นเป็นอาหาร 2. กิ่งก้อที่ลำตัวพอมยาว
- wisdom tooth วิสคอม ทูท ฟันบดซี่สุดท้ายของขากรรไกรบนและล่าง รวมเป็น 4 ซี่ ฟันเหล่านี้จะเริ่มงอกเมื่ออายุเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ บางรายอาจขึ้นช้าจนอายุถึง 25 ปี
- wisent วิเซนท์ ดู auroch
- wishbone วิชบอน ดู furcula
- witches' milk วิทเชส มิลค์ น้่านมที่คัดหลังออกมาจากต่อมน้่านมของทารกแรกเกิด เป็นผลเนื่องมาจาก lactating hormone ของแม่ที่ทารกได้รับเข้าไปพร้อมกับน้่านม
- withers วิเทอร์ส สันที่เกิดจากง่ามของกระดูกสันหลัง อยู่ระหว่างกระดูกสะบักซ้ายและขวา พบในพวกม้า
- wolf(pl.wolves) วูลฟ์ สุนัขป่า ลักษณะทั่วไปคล้ายสุนัขเลี้ยง เช่น สุนัขป่าสีเทา หรือ timber wolf (*Canis lupus*), coyote หรือ prairie wolf (*C. latrans*) ดู tasmanian wolf
- wobble effect วอบเบิล เอฟเฟคต์ สภาวะอันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนลำดับของเบสที่เป็นโคดอนและแอนติโคดอนในกระบวนการสร้างโปรตีน
- Wohlfahrtia วอลฟาร์ทีเชีย ชื่อสกุลของแมลงสองปีกที่เป็นปรสิตอยู่ในเนื้อเยื่อสัตว์ อยู่ในวงศ์ Sarcophagidae เช่น *W. magnifica* พบทางตอนใต้ของยุโรป ตัวอ่อนอยู่ในแผลสัตว์และคน
- wolffian body วิลเฟียน บอดี้ (Kasper Friedrich Wolff นักกายวิภาคชาวเยอรมัน 1733-94) ไตชนิดหนึ่งขณะยังเป็นตัวอ่อน ขนาดอยู่สองข้างของกระดูกสันหลัง syn: mesonephros
- wolffian duct วิลเฟียน ดักต์ หลอดไตของไตชุดที่สอง ในระยะที่ยังเป็นตัวอ่อน ถ้าเป็นสัตว์พวกไม่มีถุงน้ำคร่ำ จะทำหน้าที่รวมทั้งขับถ่ายปัสสาวะ และเซลล์สืบพันธุ์ ถ้าเป็นสัตว์พวกมีถุงน้ำคร่ำ จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเฉพาะของระบบสืบพันธุ์เพศชาย เช่น epididymis, ductus defe-

- rens, seminal vesicle
- wolf spider วูล์ฟ สไปเดอร์ แมงมุม สกุล *Lycosa* ขนาดใหญ่ ล่าเหยื่อได้ว่องไว
- wolverine วูลเวอรีน สัตว์กินเนื้อ วงศ์ Mustelidae ลักษณะทั่วไป คล้ายหมี แต่ตัวเล็ก ยาวประมาณ 3 ฟุต ขนสีดาบนน้ำตาล หางเป็นพวง นิยย ฉลาดแกมโกง พบทางซีกโลกตอนเหนือ เช่น วูลเวอรีนอเมริกา (*Gulo luscus*) อีกชื่อหนึ่งคือ carcajou
- womb วอมบ์ มดลูก syn: uterus
- wombat วอมแบท สัตว์มีถุงหน้าท้อง ลักษณะคล้ายหมาหริ่ง ขุดรูทำเป็นที่อาศัย เป็นสัตว์ประจำถิ่นของออสเตรเลีย เช่น *Vombatus hirsutus*
- wood alcohol วูด แอลกอฮอล์  $\text{CH}_3\text{OH}$  เป็นแอลกอฮอล์ที่กลั่นมาจากไม้ มีพิษมาก ทำลายประสาทตา ระบบหายใจ ถ้ากินจะเป็นอันตรายถึงชีวิต syn: methanol, methyl alcohol
- wood chuck วูด ชัค สัตว์ฟันแทะ รูปร่างอ้วน ขุดรูอยู่ เช่น *Marmota monax* หรือ ground hog
- wood cock วูด คอค 1. นกชายทะเล วงศ์ Scolopacidae เป็นนกที่นิยมล่า เป็นเกมกีฬา เช่น วูดคอคอเมริกา (*Philohela minor*) 2. ในโลกเก่าคือนกที่อยู่ในวงศ์ Scolopacinae เช่น นกปากซ่อมดง (eurasian woodcock - *Scolopax rusticola*)
- wood duck วูด ดัค เป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำ เช่น *Aix sponsa*
- wood frog วูด ฟรอก กบขนาดเล็ก อยู่ในเขตป่าชื้น เช่น *Rana sylvatica*
- wood louse วูด เลาช์ สัตว์พวกกุ้งที่อยู่บนบก อยู่ในอันดับ Isopoda มีชื่อสามัญว่า pill bug เช่น สกุล *Armadillidium*, *Oniscus* ดู sow bug
- woodpecker วูดเพคเคอร์ นกวงศ์ Picidae จะงอยปากแข็งตรงคล้ายสิ่ว เจาะเนื้อไม้ได้ ขนหางแข็งเป็นพิเศษ ช่วยให้สามารถไต่ตามต้นไม้ได้ มีหลายสกุลหลายชนิด เช่น นกหัวขวานสีน้ำตาล (rufous woodpecker - *Celeus brachyurus*) นกหัวขวานเขี้ยวหัวดำ (grey-headed woodpecker - *Ficus canus*)
- wood rat วูด แรท หนูที่พบตามป่า มีหลายชนิด เช่น pack rat หรือ trade rat (*Neotoma floridans*) พบในรัฐฟลอริดา และแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ *N. fuscipes* และ *N. cinerea* พบแถบตะวันตกของสหรัฐ

wood shrike	วูด ไชร์ค นกวงศ์ Campephagidae เป็นนกขนาดเล็ก ทำรังรูปถ้วย ตามง่ามกิ่งไม้ กินแมลง เช่น นกเฉียงคางหางสีน้ำตาล (large wood shrike - <i>Trephodornis virgatus</i> )
wood star	วูด สตาร์ นกสกุล <i>Eulidia</i> คล้ายนกฮัมมิงเบิร์ด ขนาดเล็ก ดุดัน-หวานจากดอกไม้ เช่น <i>E. yarrellii</i> พบในชิลีและเปรู
wood tick	วูด ทิก เห็บชนิดหนึ่ง เช่น <i>Dermacenter andersoni</i> เป็นเห็บที่ทำให้เกิดอาการอัมพาต และยังเป็นพาหะนำโรคไข้จุดเทือกเขารอคคี และ tularemia
wool	วูล 1. สัตว์: (1) ขนอ่อนนุ่มและม้วนงอของสัตว์เลี้ยงพวกแกะและสัตว์อื่น (2) ขนสั้นแข็งแต่ม้วนงอ (3) ขนเส้นเล็ก ๆ ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นปกคลุมลำตัวขนอนของแมลงพวกผีเสื้อ 2. พืช: ขนยาวนุ่ม เรียงอัดแน่น คล้ายขนสัตว์
wool fat	วูล แฟท ไขมันที่ปกคลุมขนสัตว์ ใช้เป็นสารพื้นฐานสำหรับทำยา หรือ เครื่องสำอางประเภทครีม ดู lanolin
woolly apple aphid	วูลี่ แอปเปิล เอพิด แมลงพวก homopteran (เพลี้ย) ชนิดหนึ่ง ( <i>Eriosoma lanigerum</i> ) สามารถกัดหลังเส้นใยไซลีขาวคล้ายขนสัตว์ไว้บนกิ่งไม้ เป็นแมลงศัตรูพืชร้ายแรงชนิดหนึ่ง
woolly bear	วูลี่ แบร์ คือ woolly worm
woolly worm	วูลี่ เวิร์ม 1. ตัวอ่อนของแมลงผีเสื้อกลางคืน ที่สามารถผลิตเส้นใยคล้ายขนสัตว์ โดยเฉพาะ tiger moth ซึ่งอยู่ในวงศ์ Arctiidae 2. woolly bear หรือ woolly bear caterpillar
wool maggot	วูล แมกกอท ตัวอ่อนของแมลงสองปีกซึ่งเจาะไซเข้าตัวสัตว์ เช่น สกุน <i>Phaenicia</i> ในออสเตรเลีย สกุน <i>Phormia</i> และ <i>Sarcophaga</i> ในสหรัฐ
wool sponge	วูล สปีนจ์ ฟองน้ำ ( <i>Hippospongia lachne</i> ) เส้นใยอ่อนนุ่ม ใช้ถูตัวได้ พบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโก
worker	เวิร์คเออร์ แมลงเพศเมียที่เจริญไม่เต็มที่พองจะทำหน้าที่สืบพันธุ์ จึงปรับเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแมลงทำงาน พบในพวกแมลงสังคม เช่น มด ผึ้ง ต่อ ปลวก
worm	เวิร์ม (AS. worm) 1. สัตว์ขนาดเล็ก ลำตัว พอมยาว เคลื่อนที่โดยการคืบคลาน โดยเฉพาะในไฟลัม Annelida, Platyhelminthes,

Aschelminthes, และ Acanthocephata คือพวกหนอน helminth  
 2. สัตว์ในไฟลัมอื่นที่ล่าตัวยาว เคลื่อนที่โดยการคืบคลาน เช่น rhy-  
 nchocoelan, sipunculid, echiurid, onchophoran, pen-  
 tastomidan, หรือ hemichordate 3. ตัวอ่อนของแมลงหลาย  
 ชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนของแมลงปีกแข็ง (ตัวด้วง)

- worm disease เวิร์ม ดิซีส โรคของหอยนางรม เกิดจากการมีหนอนทะเล สกุล  
*Polydora* ไซเข้าไปอยู่ในตัว
- worm lizard เวิร์ม ลิซาร์ด สัตว์เลื้อยคลานพวกกิ้งก่า วงศ์ Amphisbaenidae  
 ไม่มีขา เช่น *Rhineura floridans* พบในรัฐฟลอริดา อีกชื่อหนึ่ง  
 คือ thunder worm
- worm salamander เวิร์ม ซาลาแมนเดอร์ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกซาลาแมนเดอร์  
 สกุล *Batrachoseps* ลำตัวพอมยาว ขาสั้นเล็กและจำนวนนิ้วลดลง
- worm shell เวิร์ม เชลล์ หอยฝาเดี่ยวที่มีเปลือกขดเป็นเกลียวยาวคล้ายหนอน  
 เช่น สกุล *Vermicularia*
- worm snake เวิร์ม สเนค ดู blind snake
- wound วุนด์ (AS. wund) บาดแผล คือ การทำให้เนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม ฉีกขาด  
 หรือ ฟกช้ำ
- wrasse เวสเส ปลาสี่สวายสด วงศ์ Labridae ใช้เป็นอาหาร
- wren เรน นกในกลุ่มนกกกระจอก ขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Troglodytidae  
 เช่น house wren (*Troglodytes aedon*)
- wiggler วิกเกเลอร์ คือ wiggler
- Wright's stain ไรท์'ส สเทน (Jame H. Wright นักพยาธิวิทยาชาวอเมริกัน  
 1871-1928) สีย้อมที่ได้จากการผสมสีย้อม eosin กับ methylene  
 blue ใช้ประโยชน์ในการย้อมสีเม็ดเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อโรค  
 ใช้จับสี และใช้ย้อมสีแบคทีเรีย
- wrist ริสท์ ข้อมือ syn: carpus
- wryneck ไวเนค 1. อาการคอแข็ง เนื่องมาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อคอ  
 มากกว่าหนึ่งมัด ทำให้ศีรษะไม่อยู่ในท่าปกติ 2. นกโลกแก้ว สกุล  
*Jynx* ของวงศ์นกหัวขวาน (Picidae) ซึ่งมักจะชุกอยู่ในท่านปลกเมื่อถูก  
 ครอบงวน เช่น นกคอพับ (eurasian wryneck - *Jynx torquilla*)